

Long range chemical shifts in aceto-acetic ester and acetylacetone

Autor(en): **Ranft, J.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Archives des sciences [1948-1980]**

Band (Jahr): **13 (1960)**

Heft 9: **Colloque Ampère**

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-738631>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

Long range chemical shifts in aceto-acetic ester and acetylacetone

by J. RANFT

Physikalisches Institut der Universität, Leipzig

Because of the small electron density near the protons in molecules one must consider the possibility, that large numbers of electrons in groups relatively far from the proton will produce significant shielding effects. McConnell [1] showed, that these long range shielding effects may be estimated in terms of the diamagnetic anisotropies of these distant electron groups. He gives the following formula for the part of the shielding tensor due to this group

$$\delta_d = \frac{1}{L_0} \left[\frac{\chi}{R^3} - \frac{3\chi \cdot \mathfrak{R} \mathfrak{R}}{R^5} \right].$$


This gives for axial symmetry of the group

$$\delta_d = \frac{\Delta\chi}{3L_0 R^3} (1 - 3 \cos^2 \theta_z).$$

θ_z is the angle between \mathfrak{R} , the vector from the induced dipole to the regarded proton, and the symmetry axis of the distant group.

Guy and Tillieu [3] and Baudet, Tillieu and Guy [4] gave the theoretical values for the molar diamagnetic susceptibilities of some bonds. Narasimhan and Rogers [2] have calculated the diamagnetic anisotropy of the C = O bond with the aid of the chemical shifts in formamide and dimethylformamide.

It is possible with the above formulas to calculate the relative chemical shifts of the CH₃ lines in substances with keto enol tautomerism. The two groups have the forms



The screening constant of the CH_3 protons must be averaged over the possible spatial arrangements. The location of the induced magnetic dipole has been taken at the middle of the bonds for $\text{C} = \text{C}$ and $\text{C} - \text{C}$ and at the oxygen atom for $\text{C} = \text{O}$ and $\text{C} - \text{O}$ [2].

TABLE 1.

<i>Diamagnetic susceptibilities . 10⁶</i>			
$\Delta\chi$ ($\text{C} - \text{C}$) = 1,16	[3]	$\Delta\chi$ ($\text{C} - \text{O}$) = 0,97	[4]
χ_{xx} ($\text{C} = \text{O}$) = — 6.77	[2]	χ_{xx} ($\text{C} = \text{C}$) = — 6.90	[3]
χ_{yy} ($\text{C} = \text{O}$) = 2.64	[2]	χ_{yy} ($\text{C} = \text{C}$) = — 5.03	[3]
χ_{zz} ($\text{C} = \text{O}$) = 1.09	[2]	χ_{zz} ($\text{C} = \text{C}$) = — 4.13	[3]

In table 1 are given the values of the diamagnetic susceptibilities. The evaluation gives

$$\delta_d (\text{CH}_3 \text{ keto}) = -0.17 \cdot 10^{-6}, \quad \delta\alpha (\text{CH}_3 \text{ enol}) = -0.06 \cdot 10^{-6}, \\ \Delta\delta = 0.11 \cdot 10^{-6} = 2.75 \text{ c/s at } 25 \text{ Mc/s}.$$

The experimental values are

- Aceto-acetic ester: $\Delta\delta = 6.8 \text{ c/s}$
 $\Delta\delta = 6.0 \text{ c/s at } \infty \text{ dilution in isotropic solv.}$
- Acetylaceton: $\Delta\delta = 4.3 \text{ c/s}$
 $\Delta\delta = 3.5 \text{ c/s at } \infty \text{ dilution in isotropic solv.}$

In view of the crude susceptibility values and the approximative method the results seems to be good.

I am greatly indebted to Dr Weissenfels for preparation of the substances.

-
1. McCONNELL, H. M., *J. Chem. Phys.*, **27**, 226, 1957.
 2. NARASIMHAN, P. T., M. T. ROGERS, *J. Phys. Chem.*, **63**, 1388, 1959.
 3. GUY, J., J. TILLIEU, *J. Chem. Phys.*, **24**, 1117, 1956.
 4. BAUDET, J., J. TILLIEU, J. GUY, *C. R.*, **244**, 2920, 1957.