Zeitschrift: Berichte des Geobotanischen Institutes der Eidg. Techn. Hochschule,

Stiftung Rübel

Herausgeber: Geobotanisches Institut der Eidg. Techn. Hochschule, Stiftung Rübel

Band: 36 (1964)

Artikel: Ordination ans classification of Swiss and Canadian coniferous forests

by various biometric and other methods

Autor: Groenewoud, H. van

Kapitel: 1: Zusammenfassung / Abstract

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-377646

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

6.2	Swiss	sample plots	58
	6.2.1	Classification of sample plots (Zürich-Montpellier method) 5	58
	6.2.2		59
	6.2.3	Principal component analysis (R-method) of the covariance matrix 5	59
	6.2.4	Habitat factors in relation to the principal axes 6	32
	6.2.5	Analysis of the D ² matrix	33
	6.2.6	Habitat factors in relation to the main axis (D2 matrix)	63
	6.2.7	Principal component analysis (Q-method) of the transformed D ²	
			35
	6.2.8	Habitat features in relation to principal axes (Q-method) 6	66
	6.2.9		66
	6.2.1	Habitat factors in relation to the clustering of sample plots 6	66
6.3	Canad	dian sample plots	68
0.0			86
	6.3.2		68
	6.3.3		70
	6.3.4		71
	6.3.5	1 1	75
	6.3.6		75
	6.3.7	Principal component analysis (Q-method) of the transformed D ²	
	0.0		76
	6.3.8		77
	6.3.9		77
	0.0.0	- 1	
7. D	iscussio	on	79
8. C	onclusio	ons	86
9. A	cknowl	edgements	91
10. R	eferenc	es	92
Appe	ndix I	Vegetation table, Swiss data after page	94
	ndix II	Vegetation table, Canadian data after page	94
	ndix II		95
	ndix IV		96
	ndix V		97

1. Zusammenfassung/Abstract

Mehrere Methoden wurden angewendet, um Vegetationsaufnahmen von Abies-Wäldern in der Schweiz und Picea-Wäldern in Saskatchewan, Kanada, zu "ordinieren" (d.h. nach bestimmten Gradienten zu ordnen) und zu klassifizieren. Verwendet wurden: 1. "Principal component analysis of the covariance" (zwischen Arten) Matrix; 2. eine Ordinierungsmethode, die auf dem "verallgemeinerten Abstand" von Mahalanobis (D²) basiert; 3. "Principal component analysis" von der transformierten D² Matrix; 4. die Zürich-Montpellier-Methode der Differentialarten-Gruppen und 5. eine Gruppenanalyse, die auf der Ordination beruht. Die ersten drei sind reine Ordinierungsmethoden; die vierte erstrebt vor allem eine Typisierung und Klassifizierung; auch die fünfte arbeitet gruppierend.

Die Beziehungen zwischen Standortsfaktoren und den Achsen der Ordinationen sind sehr ähnlich bei allen Ordinierungsmethoden. Alle Achsen vertreten bestimmte ökologische Faktoren oder Faktorenkomplexe. Die Achsen der Ordinationen, die aus der "Principal component analysis of the covariance" Matrix resultieren, repräsentieren

jedoch einen grösseren Anteil der Variation und sind näher korreliert mit Standortsfaktoren als die Achsen der anderen Ordinationen.

Die Gruppenanalyse (cluster analysis) beruht auf dem "verallgemeinerten Abstand" (D²). Sie erlaubte zwar eine Klassifizierung der schweizerischen, nicht aber der kanadischen Vegetationsaufnahmen. Unterschiede der Mittelwerte von Licht- und pH-Verhältnissen in diesen Gruppen sind in den meisten Fällen statistisch gesichert.

Die Methode der Differentialarten-Gruppen ergab eine Klassifizierung sowohl der schweizerischen als auch der kanadischen Aufnahmen. Die Gruppen der schweizerischen Aufnahmen waren (statistisch gesichert) verschieden in bezug auf ihr pH, aber nicht auf die Lichtverhältnisse. Die Gruppen der kanadischen Aufnahmen unterschieden sich in keinem der untersuchten Standortsfaktoren (statistisch gesichert).

Die Kombination zweier Methoden, einer ordinierenden mit einer klassifizierenden oder einer Gruppenanalysemethode, die auf der Ordination beruht, erwies sich als wirksamste objektive Arbeitsweise für die Ordnung der Vegetationsaufnahmen.

Vegetation data collected in *Abies* forests in Switzerland and *Picea* forests in Saskatchewan, Canada, were organized by three ordinating methods, 1. principal component analysis of the covariance matrix, 2. an ordinating method based on the D² statistic, and 3. principal component analysis of the transformed D² matrix, and by two grouping methods, 1. the Zürich-Montpellier method of differential species-groups, and 2. a cluster analysis based on an ordination.

The relationships found to exist between habitat features and the axes of the ordinations follow the same pattern for all ordinations. All axes were ecologically significant. The axes of the ordination resulting from the principal component analysis of the covariance matrix, however, account for a larger portion of the variation and show a closer relationship with the habitat factors and other site features than the axes of the other ordinations.

Cluster analysis, based on the D² statistic, produced grouping of the Swiss vegetation samples but not of the Canadian samples. Differences between mean levels of light and soil pH in those groups were in most instances statistically significant.

The Zürich-Montpellier method distinguished groups of sample plots in both the Swiss and Canadian data. In the case of the Swiss data, the groups of plots were significantly different with reference to soil pH, but not with reference to light conditions. The groups of Canadian sample plots were ecologically not significantly different.

The combination of an ordinating technique with a classification technique or a cluster analysis, based on the ordination, was shown to be a powerful, objective method for vegetation analysis.

2. Introduction

In an earlier study (VAN GROENEWOUD 1965) of the ecological conditions associated with the occurrence of a root-rotting disease complex in white spruce (*Picea glauca*) stands in Saskatchewan, Canada (VAN GROENEWOUD 1956), an attempt was made to design a classification of plant communities containing white spruce, which would show a significant correlation with certain habitat factors and other site features.

The classification of these communities was considered of extraordinary importance as it would aid in the study of the conditions prevailing in the different community-types and it would help to define the habitat conditions at the time the trees become infected. The disease is usually discovered only