F. Nomenklatorische Bemerkungen

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **51 (1996)**

PDF erstellt am: **27.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

F. NOMENKLATORISCHE BEMERKUNGEN

I. Typisierung der Gattung Atractylodes und A. lancea (Thunb.) DC.

Als De CANDOLLE (1838) die Gattung *Atractylodes* aufstellte, stützte er sich auf THUNBERG's (1784) japanische *Atractylis*-Arten, *Atractylis lancea* Thunb. und *A. ovata* Thunb. Im Thunberg-Herbar liegen die beiden Taxa unter den Namen *Acarna lancea* (n° 18551) und *Acarna ovata* (n° 18552). De CANDOLLE übernimmt die beiden Arten für seine neue Gattung, ohne jedoch einen Typus-Beleg zu bestimmen. Auch in neueren Bearbeitungen (z.B. KITAMURA, 1937; SHIH CHU, 1987) wurde für die Gattung kein Typ ausgewählt. Das soll hier nachgeholt werden. **Typus**: *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC.

Atractylodes lancea (Thunb.) DC., Prodr. 7: 48. 1838 .

≡ *Atractylis lancea* Thunb., Fl. Japon. 306. 1784. **Typus:** Iaponicae: Sofits, it. Okera; *Holotypus*: "*Acarna lancea*", s. loc., s. d. (UPS, n° 18551, v. microfiche!).

= *Atractylodes ovata* (Thunb.) DC., Prodr. 7: 48. 1838.

≡ *Atractylis ovata* Thunb., Fl. Japon. 306. 1784. **Typus:** Crescit cum priori in Nagasaki; *Holotypus:* "*Acarna ovata*", (UPS, n° 18552, v. microfiche!).

Da *Atractylis ovata* Thunb. und *A. lancea* Thunb. völlig identisch sind, der Name *A. ovata* von mehreren Autoren aber verschieden angewendet wird, hat der Name *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. die Priorität (vgl. auch SHIH CHU, 1987).

II. Neukombinationen in der Gattung Chamaeleon

Chamaeleon speciosus (DC.) Dittrich, **comb. nova**

≡ *Atractylis speciosa* DC., Prodr. 6: 549. 1838. **Typus:** in Oriente leger. cl. Olivier et Bruguière; *Holotypus:* Cnicus, "Grèce ou Syrie", herb. Olivier 1822 (G-DC!).

= *Atractylis comosa* Sieber ex Cass. nom. illeg., Dict. Sci. Nat. 50: 58. 1827.

≡ *Atractylodes comosa* (Sieber ex Cass.) Petit, Bull. Soc. Bot. France 134, Lettres Bot. 2: 179. 1987. **Typus:** Palestine, auprès de Bethléem, *Atractylis comosa* Sieber (nomen), in herb. M. GAY, n.v. (P).

Bei *A. comosa* Sieber ex Cass. nom. illeg. handelt es sich nach Artikel 34 (b) des ICBN (1989) um einen provisorischen Namen, da sich CASSINI (1827) über die Rangstufe von *Acarna* (Gattung oder Untergattung), der er das Taxon zuordnen wollte, nicht im klaren war; außerdem weist er am Schluß seiner Beschreibung darauf hin, daß seine dieses Taxon betreffenden Untersuchungen unvollständig und noch nicht abgeschlossen seinen.

Chamaeleon cuneatus (Boiss.) Dittrich, **comb. nova**

≡ *Atractylis cuneata* Boiss., Fl. Orient. 3: 454. 1875.

≡ *Atractylodes cuneata* (Boiss.) Petit, Bull. Soc. Bot. France 134, Lettres Bot. 2: 179. 1987. **Typus:** In Affghanià (Griffith exs. 3320); *Holotypus:* Affghanistan. Herbarium of the late East India Company, N° *3320,* Herb. Griffith (G-BOIS!; iso: K, W, n.v.)

III. Die Wiedereinführung der Gattung Hirtellina (Cass.) Cass. und die erforderlichen Neukombinationen.

Hirtellina (Cass.) Cass., Dict. Sci. Nat. 60: 570. 1830.

≡ *Staehelina* L. subgen. *Hirtellina* Cass., Dict. Sci. Nat. 47: 499, 511. 1827. **Typus:** *Hirtellina fruticosa* (L.) Dittrich.

Hirtellina fruticosa (L.) Dittrich, **comb. nova**

≡ *Centaurea fruticosa* L., Syst. Nat. ed. 10: 1229. 1759.

≡ *Hirtellina lanceolata* Cass. nom. illeg., Dict. Sci. Nat. 50: 441. 1827. **Typus:** Hab. in Creta, Oriente, Gérard. *Lectotypus* (in hoc loco designato): *Staehelina fruticosa*, N° *11* (SAVAGE-Cat. 981/4), (LINN!).

Hirtellina kurdica (Merxmüller & Rech. f.) Dittrich, **comb. nova**

≡ *Staehelina kurdica* Merxmüller & Rech. f. in Rech. f., Ber. Deutsch. Bot. Ges. 72: 282. 1959. **Typus:** Iraq, Kurdistan, between Hora and Baibu in Raikan, near Wazi, Turkish frontier, 9.8.1951, Thesiger *1237. Holotypus:* Flora of Iraqi Kurdistan, between Hora and Baibu in Raikan, near Wazi Turkish frontier, 9.8.1951, Thesiger *1237* (BM!).

Hirtellina lobelii (DC.) Dittrich, **comb. nova**

≡ *Staehelina lobelii* DC., Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 16: 194. 1810.

≡ *Staehelina apiculata* Labill., Ic. Pl. Syr. Dec. 4: 3, t. 1. 1812. **Typus:** Hab. in Syria, Labillardière. *Holotypus:* Syrie (G-DC!; iso: G!).