

# Noronhia aminae

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **70 (2016)**

PDF erstellt am: **06.06.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**2. *Noronhia aminae*** Hong-Wa, *spec. nova* (Fig. 2B, 4).

**Typus:** MADAGASCAR. **Prov. Antsiranana:** DIANA, Diégo II, Anivorano-Nord, Tsarakibany, village d'Analabevato, 12°46'44"S 49°11'18"E, 428 m, 4.I.2009, Hong-Wa *et al.* 555 (holo-: MO-6615551!; iso-: G [G00341614]!, K!, P!, TAN!).


**Diagnosis** *Noronhia aminae* Hong-Wa can be distinguished from other members of the genus by its distinctly veined leaf blades, often with domatia, its cream-white, rotate flowers and its large, ellipsoid to ovoid fruits, terminated by a rostrum.

**Description** Trees to 16 m tall, trunk to 25 cm diameter; young twigs cylindrical, 0.7-2.1 mm diameter, glabrous; bark medium gray, smooth. Leaves opposite, semi-deciduous; bud scales rarely persistent; blades medium green above, lighter below, oblong, 4.5-14 × 1.5-4.5 cm, subcoriaceous, glabrous, domatia common, base acute to attenuate, margin flat, apex acute to acuminate, the acumen 1-8 mm long, midrib slightly sunken above, distinctly raised below, secondary veins conspicuous, 8-13 per side, 6-15 mm apart, looping 1-3.7 mm from the margin; petiole medium gray, 4-12 × 1-2.5 mm, partially to entirely woody, glabrous. Thyrses geminate to fasciculate, pauciflorous, diffuse; peduncle 15-30 mm long, glabrescent; pedicel 1.5-13 mm long, glabrescent; calyx sparsely pubescent outside, glabrous inside, lobes triangular, 1 × 1-1.7 mm; corolla cream-white, rotate, 3-4.5 mm long, glabrous on both sides, the tube 0.8-1.5 mm long, lobes lanceolate, apex acute; corona present, 1.3-2 mm long, undivided to slightly lobed; stamens 1.4-2.2 mm long, anthers obovate, 0.9-1.4 mm long; pistil 1.7-2.3 mm long, stigma capitate. Fruiting pedicel 3-15 × 1-2.5 mm; young fruits greenish, orange-yellow when mature, ellipsoid to ovoid, 15-33.5 × 10.5-24 mm, surface slightly rugose, apex rostrate, the rostrum slightly flattened, truncate, with the persistent style; dry pericarp 0.7-1.7 mm thick; endocarp woody; seed 12-25.5 × 7-14.5 mm.

**Etymology** This species is dedicated to a sweet matriarch, Amina, who was very helpful in the field and in finding the flowering material that serves as the type specimen.

**Distribution, ecology and phenology** *Noronhia aminae* occurs in low- to mid-elevation semi-deciduous forests in the north, from Montagne des Français to Daraina (Fig. 3). It produces flowers and fruits throughout the year except in April and May, with a peak between November and January.

**Conservation status** The assessment was based on 20 collections representing 19 localities and yielded an EOO of 3,393 km<sup>2</sup>, an AOO of 64 km<sup>2</sup>, and 15 subpopulations representing 13 locations, of which four occur within the network of protected areas (Ankarana, Loky-



Manambato, Montagne d'Ambre, and Montagne des Français). Consequently, *N. aminae* is assigned a preliminary status of "Near Threatened" [NT] due to continuing decline in habitat quality in non-protected areas.

**Notes** *Noronhia aminae* most closely resembles *N. sambiranensis* H. Perrier, from which it differs by its cream-white (vs. red), rotate (vs. cupuliform) flowers, rostrate (vs. flat) fruit apex, and woody (vs. crustaceous) endocarp. The new species can be recognized by its distinctly veined leaf blades, often with domatia, its cream-white flowers and its large, ellipsoid to ovoid fruits.

**Paratypes** **MADAGASCAR. Prov. Antsiranana:** Mosorolava, Mahagaga, 12°46'36"S 49°01'37"E, 102 m, 22.IX.2007, *Andriamihajarivo et al.* 1366 (MO, P, TAN); Montagne d'Ambre PN, à 8 km de Bobakilandy, 12°37'37"S 49°06'40"E, 533 m, 11.VII.1995, *Andrianantoanina & Bezara* 851 (G, K, MO, P, TAN); *ibid. loc.*, 18-21.VI.1996, *Andrianantoanina & Bezara* 983 (K, MO, P); Matsaborimanga, Ankarana RS, 12°56'14"S 49°03'16"E, 50 m, 3.XI.1997, *Bardot-Vaucoulon* 943 (K, MO, P, TAN); Mahamasina, Massif de l'Ankarana, 12°57'S 49°09'E, 110 m, 26.I.2003, *Bardot-Vaucoulon et al.* 1339 (K, MO, P, TAN); Mahatsara, forêt d'Analamanga, près d'Andrafiatokana, 12°45'37"S 49°07'35"E, 446 m, 3.I.2009, *Hong-Wa et al.* 554 (MO, P, TAN); Marotaolana, forêt d'Analamahitsy, 12°50'10"S 49°13'42"E, 370 m, 30.I.2009, *Hong-Wa* 591 (MO, P, TAN); Sakaramy, Montagne d'Ambre PN, 12°26'28"S 49°13'58"E, 331 m, 1.VI.2010, *Hong-Wa* 702 (MO, P, TAN); Ampitiliantsambo, Montagne des Français, 12°21'34"S 49°21'30"E, 168 m, 5.X.2004, *Randriambololomamonjy* 25 (MO, P, TAN); Andranonankomba, Montagne des Français, 12°21'00"S 49°21'34"E, 112 m, 8.IX.2004, *Randrianaivo et al.* 1082 (CNARP, G, MO, P, TAN); Ampitiliantsambo, Montagne des Français, 12°23'15"S 49°23'04"E, 224 m, 24.VII.2004, *Randrianarivelo & Rasolofson* 114 (G, MO, P, TAN); *ibid. loc.*, 12°21'39"S 49°21'34"E, 281 m, 24.IX.2004, *Randrianarivelo et al.* 140 (MO, P, TAN); Daraina, forêt de Binara, 13°14'22"S 49°36'26"E, 700 m, 28.III.2004, *Ranirison* 519 (Daraina, G, K, MO, P, TEF); Mosorolava, Ampombiantambo, forêt d'Antsoroby, 12°40'29"S 48°58'52"E, 23.IX.2007, *Razafitsalama et al.* 1224 (CNARP, G, MO, P, TAN); Montagne d'Ambre PN, [13°36'S 49°09'E], 27.VIII.1954, *Service Forestier* 10788 (P, TEF); Ambodimanga, 7.X.1955, *Service Forestier* 13033 (MO, P); Montagne des Français, [12°22'05"S 49°21'00"E], 1000 m, 24.III.1955, *Service Forestier* 13134 (P, TEF); Jardin botanique 19, [12°31'30"S 49°10'20"E], 1000-1100 m, 21.VII.1955, *Service Forestier* 14248 (P, TEF).