

# Abrahamia ellipticarpa

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **71 (2017)**

PDF erstellt am: **27.05.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**9. *Abrahamia ellipticarpa*** Randrian. & Lowry, **spec. nova** (Fig. 8).

**Typus:** MADAGASCAR. **Prov. Toliara:** Rég. Anosy, Vinanibe, à l'W de Fort-Dauphin, [25°03'S 46°56'E], 7.XII.1968, fr., *Service Forestier 28611* (P [P00722641]!; iso-: G [G00341714]!, K!, MO-6684134!, P [P00722642]!, TEF [TEF000884]!).

**Diagnosis** *Abrahamia ellipticarpa* Randrian. & Lowry can be distinguished from other member of the genus by its large, glabrous, ellipsoid fruits measuring 3-3.5 × 1.5-1.8 cm.

**Description** Trees c. 10-12 tall, bark with white latex; young twigs with appressed indument. Leaves alternate, subopposite or opposite; blade oblanceolate to narrowly elliptic, 3-9.5 × 1.3-3 cm, subcoriaceous, apex acute or sometimes retuse or rarely emarginate, margin entire, base cuneate, adaxial surface glabrous, abaxial surface with appressed indument, more so along the midvein and margin, venation craspedodromous, midvein prominent abaxially, secondary veins 18-30 pairs, more or less parallel, 2-3 mm apart, slightly raised adaxially and prominent abaxially, tertiary veins very few, impressed and barely visible; petiole 5-10 mm long, c. 1 mm in diam., canaliculate on adaxial surface, pubescent. Inflorescences and flowers unknown. Fruits 3-3.5 × 1.5-1.8 cm, ellipsoid, glabrous, with longitudinal striations.


**Distribution, ecology and phenology** *Abrahamia ellipticarpa* has been recorded from sublittoral forest on sand at several sites in the Fort-Dauphin area, including Mandena, Vinanibe, and Petriky (Map 1). It has been collected in flower in September and in fruit in December.

**Conservation status** With an EOO of 28 km<sup>2</sup>, an AOO of 12 km<sup>2</sup>, and three known locations, 2 of which are situated within protected areas (Mandena and Petriky) whereas the third one is highly degraded and subjected to continued degradation from uncontrolled harvesting and possibly also fire leading to a projected decline in all 5 sub-criteria, *A. ellipticarpa* is assigned a preliminary conservation status of “Endangered” [EN B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)] using the IUCN Red List Categories and Criteria (IUCN, 2012).

**Notes** *Abrahamia ellipticarpa* is vegetatively similar to *A. oblongifolia* but can be distinguished by its fewer secondary veins (18-30 vs 35-40), impressed and barely visible (vs slightly raised and very visible) tertiary venation, and large fruits (3-3.5 × 1.5-1.8 vs 2 × 1 cm) with evident (vs obscure) longitudinal striations.

**Paratypes** MADAGASCAR. **Prov. Toliara:** Petriky, N shore of Lake Andranany, 25°03'S 46°53'E, 0-10 m, 14.IV.1989, ster., *Gereau 3376* (MO, P, TAN); env. de Fort-Dauphin, entre le Pic St. Louis et la mer, 1-25 m, 20.IX.-6.X.1928, fl., *Humbert 5984* (G, P [2 sheets]); Man-

dena forestry station, 24°57'S 47°00'E, 0-10 m, 20.XI.1996, ster., A. Randrianasolo 578 (MO, P, TAN); *ibid. loco*, 3.IX.1953, bud, Service Forestier 8171 (MO, P, TEF); *ibid. loco*, 12.XII.1952, ster., Service Forestier 207-R-16 (P).



**Fig. 8.**

*Abrahamia ellipticarpa* Randrian. & Lowry.

**A.** Branch with leaves; **B.** Infructescence showing detail of pedicel; **C.** Fruit.

[A: A. Randrianasolo 578, MO; B-C: Service Forestier 28611, MO] Drawings: R.L. Andriamiarisoa