

# **Recherches sur le calcul des forces perturbatrices dans la théorie des perturbations séculaires**

Autor(en): **Arndt, Louis**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel**

Band (Jahr): **24 (1895-1896)**

PDF erstellt am: **28.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-88374>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

Séance du 21 novembre 1895

---

# RECHERCHES

## sur le calcul des forces perturbatrices dans la théorie des perturbations séculaires

PAR LE Dr LOUIS ARNDT

---

Dans ses recherches intitulées : *Determinatio attractionis quam in punctum*, etc., Gauss a établi un théorème qui permet de déterminer les perturbations séculaires des éléments de l'orbite d'un corps céleste, si l'on ne considère que la première puissance des masses. Il suppose que la masse du corps produisant la perturbation est distribuée sur son orbite de telle manière que chaque élément d'arc reçoit une partie de la masse proportionnelle au temps pendant lequel la planète reste dans cet élément. L'expression de l'attraction de cette masse, exercée sur un autre corps céleste, représente la partie séculaire des perturbations.

Si  $ds$  désigne un élément d'arc,  $m_1$  la masse du corps perturbateur,  $U_1$  la durée de révolution,  $r_1$  le rayon vecteur et  $v_1$  la vitesse instantanée, le potentiel de cette distribution de masse peut être représenté par l'expression suivante :

$$\int \frac{ds}{r_1} \cdot \frac{m_1}{U_1 v_1},$$

dans laquelle l'intégrale doit être étendue à tout le tour de l'ellipse. Les dérivées partielles de ce potentiel représentent les composantes de l'attraction. En remplaçant l'anomalie excentrique par une autre variable d'intégration, on peut donner à ces composantes une forme complètement intégrable. Pour obtenir ces expressions, on a besoin chaque fois de résoudre une équation du troisième degré. La résolution n'est pas difficile, mais devient très incommoder si l'on doit calculer les composantes un grand nombre de fois pour les différentes parties de l'orbite. Les recherches suivantes montrent qu'on peut éviter la résolution de cette équation et représenter les composantes de la force perturbatrice par l'expression :

$$A\omega + B\eta,$$

où  $A$  et  $B$  sont des fonctions rationnelles des coefficients de l'équation du troisième degré, et où  $\omega$  et  $\eta$  sont les périodes des fonctions elliptiques de la première et de la deuxième espèce. Les périodes peuvent être exprimées par des séries hypergéométriques, dans lesquelles la variable est l'invariant absolu des fonctions elliptiques. Pour faciliter le calcul numérique des forces perturbatrices, j'ai ajouté à ces recherches une table assez étendue qui donne ces séries hypergéométriques pour toutes les valeurs de variables entre 0,000 et 1,000.

Soient  $R$ ,  $U$ ,  $Z$  les composantes de la force perturbatrice;  $R$  agissant dans la direction du rayon vecteur  $r$  du corps perturbateur, positive si  $r$  est augmenté;  $U$  perpendiculaire au rayon vecteur, positive dans la direction du mouvement;  $Z$  perpendiculaire au plan de l'orbite.  $\Omega$  désigne la longueur du noeud,  $i$  l'inclina-

naison de l'orbite sur une écliptique fixe,  $a$  le demi-grand axe,  $e$  l'excentricité,  $\mu$  le mouvement moyen diurne,  $\omega$  la distance angulaire du périhélie du nœud ascendant et  $u = \omega + v$ ;  $v$ ,  $E$ ,  $M$  l'anomalie vraie, excentrique et moyenne.

D'après la méthode de la variation des constantes, on trouve les équations suivantes :

$$\begin{aligned}\sin i \cdot (\delta \circlearrowleft)' &= \frac{a\mu \sec \varphi}{1+m} r \sin u \cdot Z \\ (\delta i)' &= \frac{a\mu \sec \varphi}{1+m} r \cos u \cdot Z \\ (\delta e)' &= \frac{a^2 \mu \cos \varphi}{1+m} \left\{ \sin v \cdot R + (\cos v + \cos E) U \right\} \\ e(\delta \omega_1)' &= \frac{a^2 \mu \cos \varphi}{1+m} \left\{ -\cos v \cdot R + \left(1 + \frac{r}{p}\right) \sin v U \right\} \\ (\delta \omega)' &= (\delta \omega_1)' - \cos i (\delta \circlearrowleft)' \\ (\delta \mu)' &= -\frac{3a^2 \mu^2}{(1+m) \cos \varphi} \left\{ e \sin v \cdot R + \frac{p}{r} U \right\} \\ (\delta M)' &= -\frac{2a\mu}{1+m} r \cdot R + \int (\delta \mu)' dt\end{aligned}$$

Dans ces formules, les composantes de la force perturbatrice contiennent la masse  $m_1$  du corps perturbateur, mais non multipliée par  $k^2$  (constante du système solaire).

On voit que ces équations différentielles sont de la forme :

$$(\delta c_i)' = \Phi_1 R + \Phi_2 U + \Phi_3 Z,$$

où les quantités  $\Phi$  ne dépendent pas des éléments du corps perturbateur.

Les trois composantes  $R$ ,  $U$ ,  $Z$  sont fonctions de l'anomalie moyenne et peuvent être développées, d'après la théorie des séries de Fourier, en séries des *sinus* et *cosinus* des multiples de  $M$  et  $M_1$ . Les termes de ces séries, qui sont indépendants de  $M$  et  $M_1$ , donnent la partie séculaire des perturbations, de sorte qu'on a pour la variation séculaire de chaque élément :

$$\delta e_i = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} (\Phi_1 R + \Phi_2 U + \Phi_3 Z) dM \cdot dM_1.$$

Si l'on désigne par  $J$  l'inclinaison des deux orbites et par  $K$  et  $K_1$  la distance entre leur point d'intersection et l'écliptique, on a les équations :

$$\sin \frac{1}{2} J \cdot \sin \frac{1}{2} (K + K_1) = \sin \frac{1}{2} (\Omega_1 - \Omega) \cdot \sin \frac{1}{2} (i_1 + i)$$

$$\sin \frac{1}{2} J \cdot \cos \frac{1}{2} (K + K_1) = \cos \frac{1}{2} (\Omega_1 - \Omega) \cdot \sin \frac{1}{2} (i_1 - i)$$

$$\cos \frac{1}{2} J \cdot \sin \frac{1}{2} (K - K_1) = \sin \frac{1}{2} (\Omega_1 - \Omega) \cdot \cos \frac{1}{2} (i_1 + i)$$

$$\cos \frac{1}{2} J \cdot \cos \frac{1}{2} (K - K_1) = \cos \frac{1}{2} (\Omega_1 - \Omega) \cdot \cos \frac{1}{2} (i_1 - i)$$

Soient  $L_1$  et  $B_1$  la longitude et la latitude du corps perturbateur par rapport au plan de l'orbite de l'autre corps, on a, en posant  $\Pi + v = l$ :

$$\xi_1 = r_1 B_1 \cos(L_1 - l), \quad \eta_1 = r_1 \cos B_1 \sin(L_1 - l), \quad \zeta_1 = r_1 \sin B_1.$$

puis :

$$\cos B_1 \cdot \cos L_1 = \cos(\Pi_1 + v_1)$$

$$\cos B_1 \cdot \sin L_1 = \sin(\Pi_1 + v_1) \cos J$$

$$\sin B_1 = \sin(\Pi_1 + v_1) \sin J$$

Pour simplifier les formules, nous poserons :

$$\begin{aligned} -\sin \Pi_1 \cdot \cos J &= A \cdot \sin A'; & -\sin \Pi_1 &= B \sin B' \\ \cos \Pi_1 &= A \cos A'; & \cos \Pi_1 \cdot \cos J &= B \cos B' \\ A a_1 \cos (A' + \Pi + v) &= A_c; & Ba_1 \cos \varphi_1 \sin (B' + \Pi + v) &= A_s \\ -A a_1 \sin (A' + \Pi + v) &= B_c; & Ba_1 \cos \varphi_1 \cos (B' + \Pi + v) &= B_s \\ a_1 \sin \Pi_1 \sin J &= C_c; & a_1 \cos \varphi_1 \cos \Pi_1 \sin J &= C_s \end{aligned}$$

Ensuite des équations :

$$r_1 \cos v_1 = a_1 (\cos E_1 - e_1), \quad r_1 \sin v_1 = a_1 \cos \varphi_1 \sin E_1$$

les trois coordonnées peuvent être représentées par les expressions suivantes :

$$\begin{aligned} \xi_1 &= A_c (\cos E_1 - e_1) + A_s \sin E_1 \\ \eta_1 &= B_c (\cos E_1 - e_1) + B_s \sin E_1 \\ \zeta_1 &= C_c (\cos E_1 - e_1) + C_s \sin E_1 \end{aligned}$$

et le carré de la distance des deux corps célestes :

$$\Delta^2 = (\xi_1 - r)^2 + \eta_1^2 + \zeta_1^2$$

prend la forme :

$$\Delta^2 = A_o - 2 B_o \cos (\varepsilon - E_1) + C_o \cos^2 E_1$$

où l'on a posé :

$$\begin{aligned} a_1^2 + r^2 + 2e_1 r A_c &= A_o, & e_1 a_1^2 + r A_c &= B_o \cos \varepsilon \\ r \cdot A_s &= B_o \sin \varepsilon, & a_1^2 e_1^2 &= C_o. \end{aligned}$$

Après avoir remplacé l'anomalie moyenne par l'anomalie excentrique, les composantes de la force perturbatrice sont de la forme :

$$R, U, Z = \frac{f(E_1)}{\Delta^3}.$$

Comme on l'a déjà mentionné plus haut, l'intégration par rapport à l'anomalie excentrique du corps perturbateur peut être exécutée. Après l'avoir effectuée, c'est-à-dire après avoir formé les expressions :

$$R_0 = \frac{1}{2\pi m_1} \int_0^{2\pi} R(1 - e_1 \cos E_1) dE_1$$

$$U_0 = \frac{1}{2\pi m_1} \int_0^{2\pi} U(1 - e_1 \cos E_1) dE_1$$

$$Z_0 = \frac{1}{2\pi m_1} \int_0^{2\pi} Z(1 - e_1 \cos E_1) dE_1$$

les variations des éléments :

$$\delta c_i = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\Phi_1 R_0 + \Phi_2 U_0 + \Phi_3 Z_0) dE$$

s'obtiennent par la quadrature mécanique.

Il s'agit maintenant de former les expressions des quantités  $R_0$ ,  $U_0$ ,  $Z_0$ . D'après Gauss, nous introduisons  $T$  comme nouvelle variable d'intégration par les équations :

$$N \cos E_1 = \alpha + \alpha_1 \sin T + \alpha_2 \cos T$$

$$N \sin E_1 = \beta + \beta_1 \sin T + \beta_2 \cos T$$

$$N = \gamma + \gamma_1 \sin T + \gamma_2 \cos T$$

Les neuf quantités  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  doivent être des coefficients réels, si l'on donne à la variable  $T$  des valeurs réelles; on a donc l'équation suivante :

$$(\alpha + \alpha_1 \sin T + \alpha_2 \cos T)^2 + (\beta + \beta_1 \sin T + \beta_2 \cos T)^2 - (\gamma + \gamma_1 \sin T + \gamma_2 \cos T)^2 = 0$$

Comme cette expression doit être indépendante de la valeur de  $T$ , il faut qu'elle soit identique avec l'expression :

$$k(\cos^2 T + \sin^2 T - 1).$$

Cette condition sera remplie si les coefficients  $\alpha, \beta, \gamma$  satisfont aux relations suivantes, en posant  $k=1$  :

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2 &= 1; & \alpha\alpha_1 + \beta\beta_1 - \gamma\gamma_1 &= 0 \\ \alpha_1^2 + \beta_1^2 - \gamma_1^2 &= 1; & \alpha\alpha_2 + \beta\beta_2 - \gamma\gamma_2 &= 0 \quad \dots \quad 1 \\ \alpha_2^2 + \beta_2^2 - \gamma_2^2 &= 1; & \alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2 - \gamma_1\gamma_2 &= 0 \end{aligned}$$

D'autre part, il faut que l'expression :

$$(\alpha \cos E_1 + \beta \sin E_1 - \gamma)^2 - (\alpha_1 \cos E_1 + \beta_1 \sin E_1 - \gamma_1)^2 - (\alpha_2 \cos E_1 + \beta_2 \sin E_1 - \gamma_2)^2 = 0$$

soit identique avec l'expression :

$$k(\cos^2 E_1 + \sin^2 E_1 - 1),$$

de sorte qu'on trouve les relations :

$$\begin{aligned} \alpha^2 - \alpha_1^2 - \alpha_2^2 &= -1; & \alpha\beta - \alpha_1\beta_1 - \alpha_2\beta_2 &= 0 \\ \beta^2 - \beta_1^2 - \beta_2^2 &= -1; & \alpha\gamma - \alpha_1\gamma_1 - \alpha_2\gamma_2 &= 0 \quad \dots \quad 2 \\ \gamma^2 - \gamma_1^2 - \gamma_2^2 &= +1; & \beta\gamma - \beta_1\gamma_1 - \beta_2\gamma_2 &= 0 \end{aligned}$$

Pour obtenir encore d'autres relations, on dispose des neuf coefficients de telle manière que le carré de la distance entre les deux corps célestes soit donné par l'expression suivante :

$$N^2 \Delta^2 = G - G_1 \sin^2 T + G_2 \cos^2 T.$$

Par suite de cette équation,

$$\begin{aligned} G\alpha^2 - G_1\alpha_1^2 + G_2\alpha_2^2 &= C_0; \quad G\alpha\beta - G_1\alpha_1\beta_1 + G_2\alpha_2\beta_2 = 0 \\ G\beta^2 - G_1\beta_1^2 + G_2\beta_2^2 &= 0; \quad G\alpha\gamma - G_1\alpha_1\gamma_1 + G_2\alpha_2\gamma_2 = B_0 \cos \varepsilon \quad 3 \\ G\gamma^2 - G_1\gamma_1^2 + G_2\gamma_2^2 &= A_0; \quad G\beta\gamma - G_1\beta_1\gamma_1 + G_2\beta_2\gamma_2 = B_0 \sin \varepsilon \end{aligned}$$

Si l'on ordonne ces six équations en trois groupes de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \alpha \cdot G\alpha - \alpha_1 \cdot G_1\alpha_1 + \alpha_2 \cdot G_2\alpha_2 &= C_0 \\ \beta \cdot G\alpha - \beta_1 \cdot G_1\alpha_1 + \beta_2 \cdot G_2\alpha_2 &= 0 \quad \dots \dots \quad 4 \\ \gamma \cdot G\alpha - \gamma_1 \cdot G_1\alpha_1 + \gamma_2 \cdot G_2\alpha_2 &= B_0 \cos \varepsilon \\ \alpha \cdot G\beta - \alpha_1 \cdot G_1\beta_1 + \alpha_2 \cdot G_2\beta_2 &= 0 \\ \beta \cdot G\beta - \beta_1 \cdot G_1\beta_1 + \beta_2 \cdot G_2\beta_2 &= 0 \quad \dots \dots \quad 5 \\ \gamma \cdot G\beta - \gamma_1 \cdot G_1\beta_1 + \gamma_2 \cdot G_2\beta_2 &= B_0 \sin \varepsilon \\ \alpha \cdot G\gamma - \alpha_1 \cdot G_1\gamma_1 + \alpha_2 \cdot G_2\gamma_2 &= B_0 \cos \varepsilon \\ \beta \cdot G\gamma - \beta_1 \cdot G_1\gamma_1 + \beta_2 \cdot G_2\gamma_2 &= B_0 \sin \varepsilon \quad \dots \dots \quad 6 \\ \gamma \cdot G\gamma - \gamma_1 \cdot G_1\gamma_1 + \gamma_2 \cdot G_2\gamma_2 &= A_0 \end{aligned}$$

et si l'on multiplie les équations de chaque groupe respectivement par  $+\alpha$ ,  $+\beta$ ,  $+\gamma$ , on tire de chaque groupe les équations :

$$\begin{aligned} G\alpha &= -C_0\alpha + \gamma B_0 \cos \varepsilon \\ G\beta &= \gamma B_0 \sin \varepsilon \quad \dots \dots \quad 7 \\ G\gamma &= -\alpha B_0 \cos \varepsilon - \beta B_0 \sin \varepsilon + \gamma A_0 \end{aligned}$$

de même :

$$\begin{aligned} G_1\alpha_1 &= -\alpha_1 C_0 + \gamma_1 B_0 \cos \varepsilon \\ G_1\beta_1 &= \gamma_1 B_0 \sin \varepsilon \quad \dots \dots \quad 8 \\ G_1\gamma_1 &= -\alpha_1 B_0 \cos \varepsilon - \beta_1 B_0 \sin \varepsilon + \gamma_1 A_0 \end{aligned}$$

et :

$$\begin{aligned} -G_2\alpha_2 &= -\alpha_2 C_0 + \gamma_2 B_0 \cos \varepsilon \\ -G_2\beta_2 &= \gamma_2 B_0 \sin \varepsilon \quad \dots \dots \quad 9 \\ -G_2\gamma_2 &= -\alpha_2 B_0 \cos \varepsilon - \beta_2 B_0 \sin \varepsilon + \gamma_2 A_0 \end{aligned}$$

En combinant ces trois systèmes d'équations, on obtient une équation du troisième degré, savoir :

$$x \{ (x - A_0)(x + C_0) + B_0^2 \} + B_0^2 C_0 \sin^2 E = 0$$

ou :

$$x^3 - P_1 x + P_2 x - P_3 = 0,$$

en posant :

$$P_1 = A_0 - C_0, \quad P_2 = B_0^2 - A_0 C_0, \quad -P_3 = C_0 B_0^2 \sin^2 E.$$

Les racines  $G$ ,  $G_1$ ,  $G_2$  de cette équation sont réelles ( $G$  et  $G_1$  positives, et  $G_2$  négative).

Pour les composantes de la force perturbatrice, nous avions trouvé les expressions :

$$\begin{aligned} m_1 \cdot R_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left\{ A_c (\cos E_1 - e_1) + A_s \sin E_1 - r \right\} (1 - e_1 \cos E_1) \frac{dE_1}{\Delta^3} \\ m_1 \cdot U_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left\{ B_c (\cos E_1 - e_1) + B_s \sin E_1 - r \right\} (1 - e_1 \cos E_1) \frac{dE_1}{\Delta^3} \\ m_1 \cdot Z_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left\{ C_c (\cos E_1 - e_1) + C_s \sin E_1 - r \right\} (1 - e_1 \cos E_1) \frac{dE_1}{\Delta^3} \end{aligned}$$

En remplaçant la variable  $E_1$  par la nouvelle variable  $T$ , chacune de ces expressions se présente sous la forme :

$$V = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\Gamma + \Gamma_1 \sin^2 T + \Gamma_2 \cos^2 T}{(G - G_1 \sin^2 T + G_2 \cos^2 T)^{3/2}} dT$$

où l'on a posé :

$$\Gamma = f \cdot \gamma^2 + b \cdot \alpha \gamma + h \cdot \beta \gamma - d \cdot \alpha \beta - l \cdot \alpha^2$$

$$\Gamma_1 = f \cdot \gamma_1^2 + b \cdot \alpha_1 \gamma_1 + h \cdot \beta_1 \gamma_1 - d \cdot \alpha_1 \beta_1 - l \cdot \alpha_1^2$$

$$\Gamma_2 = f \cdot \gamma_2^2 + b \cdot \alpha_2 \gamma_2 + h \cdot \beta_2 \gamma_2 - d \cdot \alpha_2 \beta_2 - l \cdot \alpha_2^2$$

les coefficients  $f$ ,  $b$ , etc., prennent les valeurs :

pour $R_0$	$U_0$	$Z_0$
$f = -A_c e_1 - r$ ,	$-B_c e_1$ ,	$-C_c e_1$
$b = A_c(1 + e_1^2) + r e_1$ ,	$B_c(1 + e_1^2)$ ,	$C_c(1 + e_1^2)$
$h = A_s$ ,	$B_s$ ,	$C_s$
$d = A_s e_1$ ,	$B_s e_1$ ,	$C_s e_1$
$l = A_c e_1$ ,	$B_c e_1$ ,	$C_c e_1$

Si l'on pose :

$$W = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dT}{\sqrt{(G - G_1 \sin^2 T + G_2 \cos^2 T)^3}},$$

on a :

$$\begin{aligned} \frac{\partial W}{\partial G} &= -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dT}{\sqrt{(G - G_1 \sin^2 T + G_2 \cos^2 T)^3}} \\ \frac{\partial W}{\partial G_1} &= +\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 T \cdot dT}{\sqrt{(G - G_1 \sin^2 T + G_2 \cos^2 T)^3}} \\ \frac{\partial W}{\partial G_2} &= -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 T \cdot dT}{\sqrt{(G - G_1 \sin^2 T + G_2 \cos^2 T)^3}} \end{aligned}$$

et l'expression  $V$  se réduit à :

$$V = -\frac{1}{\pi} \left( \Gamma \frac{\partial W}{\partial G} - \Gamma_1 \frac{\partial W}{\partial G_1} + \Gamma_2 \frac{\partial W}{\partial G_2} \right).$$

Il s'agit maintenant d'exprimer ces dérivées partielles par les intégrales elliptiques complètes.

Dans ce but, je pose :

$$\sin^2 T = t \quad \text{et} \quad \frac{G_1 + G_2}{G + G_2} = k^2 \quad (\text{module});$$

il en résulte pour les limites de l'intégrale :

$$\begin{aligned} t &= o \quad \text{pour } T = o \\ t &= +1 \quad \text{pour } T = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

et comme :

$$dT = \frac{1}{2} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}},$$

on a :

$$\begin{aligned} \frac{\partial W}{\partial G} &= + \frac{1}{2} \frac{1}{(G+G_2)^{3/2}} \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)(1-k^2t)^3}} \\ \frac{\partial W}{\partial G_1} &= - \frac{1}{2} \frac{1}{(G+G_2)^{3/2}} \int_0^1 \frac{t \cdot dt}{\sqrt{t(1-t)(1-k^2t)^3}} \\ \frac{\partial W}{\partial G_2} &= + \frac{1}{2} \frac{1}{(G+G_2)^{3/2}} \int_0^1 \frac{(1-t) dt}{\sqrt{t(1-t)(1-k^2t)^3}} \end{aligned}$$

Afin de pouvoir effectuer l'intégration à l'aide des fonctions de Weierstrass, je pose :

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-k^2t} &= -m(s-G) \\ \frac{t}{1-k^2t} &= -m_1(s-G_1) \\ \frac{1-t}{1-k^2t} &= -m_2(s+G_2) \end{aligned}$$

où la quantité  $s$  désigne une nouvelle variable et les coefficients  $m$ ,  $m_1$ ,  $m_2$  représentent des constantes arbitraires dont je puis disposer.

Par différentiation de ces équations, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{k^2 dt}{(1-k^2t)^2} &= -m ds; \quad \frac{dt}{(1-k^2t)^2} = -m_1 ds; \\ \frac{(k^2-1) dt}{(1-k^2t)^2} &= -m_2 ds \end{aligned}$$

Il résulte de ces équations que :

$$m_1 = m \cdot \frac{G + G_2}{G_1 + G_2}, \quad m_2 = m \cdot \frac{G_1 - G}{G_1 + G_2}$$

$$t = \frac{G + G_2}{G_1 + G_2} \cdot \frac{s - G_1}{s - G}$$

et l'on obtient pour les limites de l'intégrale :

$$t = 0 \quad \dots \quad s = G_1$$

$$t = +1 \quad \dots \quad s = -G_2$$

Si je fais maintenant :

$$m = \frac{1}{G - G_1}, \quad (G + G_2)(G - G_1)(G_1 + G_2) = C$$

et :

$$\sqrt{4(s - G)(s - G_1)(s + G_2)} = \sqrt{S},$$

on a :

$$\frac{\partial W}{\partial G} = + \frac{G_1 + G_2}{C} \int_G^{-G_2} \frac{ds}{\sqrt{S}} (s - G)$$

$$\frac{\partial W}{\partial G_1} = - \frac{G + G_2}{C} \int_G^{-G_2} \frac{ds}{\sqrt{S}} (s - G_1)$$

$$\frac{\partial W}{\partial G_2} = + \frac{G_1 - G}{C} \int_G^{-G_2} \frac{ds}{\sqrt{S}} (s + G_2)$$

En introduisant l'intégrale elliptique de la première espèce :

$$u = \int \frac{ds}{\sqrt{4(s - e_1)(s - e_2)(s - e_3)}}$$

comme nouvelle variable et en considérant les formules :

$$s - G = \varphi u - e_1, \quad s - G_1 = \varphi u - e_2, \quad s + G_2 = \varphi u - e_3$$

$$\text{et} \quad s = \varphi u, \quad \varphi \omega = e_1, \quad \varphi(\omega + \omega') = e_2, \quad \varphi \omega' = e_3$$

on obtient

$$\frac{C}{G_1 + G_2} \frac{\partial W}{\partial G} = - \int_{\omega'}^{\omega + \omega'} (\varphi u - e_1) du = - \left( e_1 \omega + \frac{\sigma'}{\sigma} (\omega + \omega') - \frac{\sigma'}{\sigma} (\omega') \right)$$

$$\frac{C}{G + G_2} \frac{\partial W}{\partial G_1} = - \int_{\omega'}^{\omega + \omega'} (\varphi u - e_2) du = - \left( e_2 \omega + \frac{\sigma'}{\sigma} (\omega + \omega') - \frac{\sigma'}{\sigma} (\omega') \right)$$

$$\frac{C}{G_1 - G} \frac{\partial W}{\partial G_2} = - \int_{\omega'}^{\omega + \omega'} (\varphi u - e_3) du = - \left( e_3 \omega + \frac{\sigma'}{\sigma} (\omega + \omega') - \frac{\sigma'}{\sigma} (\omega') \right)$$

où  $\varphi$  et  $\sigma$  désignent les fonctions weierstrassiennes, et  $\omega$ ,  $\omega'$ ,  $\eta$  et  $\eta'$  les périodes des fonctions elliptiques. D'après la théorie des fonctions  $\sigma$ , on a les relations :

$$\frac{\sigma'}{\sigma} (\omega + \omega') = \eta + \eta', \quad \frac{\sigma'}{\sigma} \omega' = \eta'$$

de sorte qu'on obtient finalement pour les trois dérivées :

$$\frac{\partial W}{\partial G} = - \frac{G_1 + G_2}{C} (e_1 \omega + \eta)$$

$$\frac{\partial W}{\partial G_1} = + \frac{G + G_2}{C} (e_2 \omega + \eta)$$

$$\frac{\partial W}{\partial G_2} = - \frac{G_1 - G}{C} (e_3 \omega + \eta)$$

et pour les composantes de la force perturbatrice :

$$V = \frac{2}{\pi} \left\{ \Gamma \frac{G_1 + G_2}{C} (e_1 \omega + \eta) + \Gamma_1 \frac{G + G_2}{C} (e_2 \omega + \eta) + \Gamma_2 \frac{G_1 - G}{C} (e_3 \omega + \eta) \right\}$$

Les trois quantités  $e$  doivent remplir la condition suivante :

$$e_1 + e_2 + e_3 = 0$$

et si l'on pose :

$$G_1 + G_2 - G = P_1$$

on a :

$$e_1 = G - \frac{1}{3}P_1, \quad e_2 = G_1 - \frac{1}{3}P_1, \quad e_3 = -G_2 - \frac{1}{3}P_1$$

Pour simplifier la formule, je pose encore :

$$\Lambda = (G_1 + G_2)\Gamma + (G + G_2)\Gamma_1 + (G_1 - G)\Gamma_2$$

et

$$\Theta = (G_1 + G_2)G\Gamma + (G + G_2)G_1\Gamma_1 - (G_1 - G)G_2\Gamma_2,$$

de sorte qu'on a :

$$V = \frac{2}{\pi} \left\{ \frac{\Lambda}{C} \left( \eta - \omega \frac{P_1}{3} \right) + \omega \frac{\Theta}{C} \right\}.$$

Les quantités  $\Theta$  et  $\Lambda$  contiennent encore les racines de l'équation cubique, qui doivent être exprimées par les coefficients de cette équation. Dans ce but, on forme les expressions suivantes :

$$A_1 = -\Gamma + \Gamma_1 + \Gamma_2$$

$$B_1 = G\Gamma - G_1\Gamma_1 + G_2\Gamma_2$$

$$C_1 = \frac{\Gamma}{G} - \frac{\Gamma}{G_1} + \frac{\Gamma_2}{G_2};$$

$$G + G_1 - G_2 = P_1$$

$$GG_1 - GG_2 - G_1G_2 = P_2$$

$$GG_1G_2 = P_3$$

D'après les formules de la page 11, on a :

$$\begin{aligned} A_1 &= f(-\gamma^2 + \gamma_1^2 + \gamma_2^2) + b(-\alpha\gamma + \alpha_1\gamma_1 + \alpha_2\gamma_2) \\ &\quad + h(-\beta\gamma + \beta_1\gamma_1 + \beta_2\gamma_2) - d(-\alpha\beta + \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2) \\ &\quad - l(-\alpha^2 + \alpha_1^2 + \alpha_2^2), \end{aligned}$$

expression qui se réduit à :

$$A_1 = -f - l$$

si l'on prend en considération les formules de la page 12; on obtient pour les trois composantes :

$$A_1 = +r, \quad 0, \quad 0.$$

Les mêmes formules donnent pour la seconde quantité  $B_1$  l'expression suivante :

$$\begin{aligned} B_1 = & f(G\gamma^2 - G_1\gamma_1^2 + G_2\gamma_2^2) + b(G\alpha\gamma - G_1\alpha_1\gamma_1 + G_2\alpha_2\gamma_2) \\ & + h(G\beta\gamma - G_1\beta_1\gamma_1 + G_2\beta_2\gamma_2) - d(G\alpha\beta - G_1\alpha_1\beta_1 + G_2\alpha_2\beta_2) \\ & - l(G\alpha^2 - G_1\alpha_1^2 + G_2\alpha_2^2); \end{aligned}$$

qui se réduit à :

$$B_1 = f \cdot A_0 + b \cdot B_0 \cos \varepsilon + h B_0 \sin \varepsilon - l \cdot C_0.$$

Cette équation paraît la plus commode pour le calcul numérique des quantités  $B_1^R$  et  $B_1^Z$ ; pour calculer la troisième quantité  $B_1^U$ , il est préférable d'introduire les valeurs primitives, de sorte qu'on obtient :

$$B_1^U = -\frac{1}{2} r \cdot a_1^2 \cos^2 \varphi_1 \sin^2 J \cdot \sin 2(\Pi + v) - r^2 e_1 B_c.$$

Il nous reste encore à transformer l'expression de la quantité  $C_1$ , savoir :

$$\begin{aligned} C_1 = & f \left( \frac{\gamma^2}{G} - \frac{\gamma_1^2}{G_1} + \frac{\gamma_2^2}{G_2} \right) + b \left( \frac{\alpha\gamma}{G} - \frac{\alpha_1\gamma_1}{G_1} + \frac{\alpha_2\gamma_2}{G_2} \right) \\ & + h \left( \frac{\beta\gamma}{G} - \frac{\beta_1\gamma_1}{G_1} + \frac{\beta_2\gamma_2}{G_2} \right) - d \left( \frac{\alpha\beta}{G} - \frac{\alpha_1\beta_1}{G_1} + \frac{\alpha_2\beta_2}{G_2} \right) \\ & - l \left( \frac{\alpha^2}{G} - \frac{\alpha_1^2}{G_1} + \frac{\alpha_2^2}{G_2} \right) \end{aligned}$$

Dans ce but, je multiplie la première des équations, page 10 :

$$G\alpha^2 - G_1\alpha_1^2 + G_2\alpha_2^2 = C_0$$

par l'équation :

$$G + G_1 - G_2 = P_1$$

puis l'équation :

$$\alpha_1^2 + \alpha_2^2 - \alpha^2 = + 1$$

par :

$$GG_1 - GG_2 - G_1G_2 = P_2$$

On obtient par l'addition des produits l'équation suivante :

$$\alpha^2 G_1 G_2 - \alpha_1^2 GG_2 + \alpha_2^2 GG_1 = + P_2 + P_1 C_0 + \alpha_2^2 G_2^2 + \alpha_1^2 G_1^2 - \alpha^2 G^2$$

Les trois termes au carré du second membre de cette équation peuvent être remplacés par des quantités connues, en multipliant les équations :

$$G\alpha = - C_0\alpha + B_0 \cos \varepsilon \cdot \gamma \text{ par } -G\alpha$$

$$G_1\alpha_1 = - C_0\alpha_1 + B_0 \cos \varepsilon \cdot \gamma_1 \text{ par } G_1\alpha_1$$

$$G_2\alpha_2 = + C_0\alpha_2 - B_0 \cos \varepsilon \cdot \gamma_2 \text{ par } G_2\alpha_2$$

et en additionnant les produits :

$$G_2^2 \alpha_2^2 + G_1^2 \alpha_1^2 - G^2 \alpha^2 = C_0^2 - B_0^2 \cos^2 \varepsilon,$$

et après avoir divisé cette expression par :

$$GG_1 G_2 = - P_3$$

on obtient l'équation finale :

$$\frac{\alpha^2}{G} - \frac{\alpha_1^2}{G_1} + \frac{\alpha_2^2}{G_2} = - \frac{1}{P_3} (P_2 + P_1 C_0 + C_0^2 - B_0^2 \cos^2 \varepsilon) = \frac{B_0^2 \sin^2 \varepsilon}{-P_3}$$

D'une manière analogue, on déduit les expressions suivantes :

$$\frac{\gamma^2}{G} - \frac{\gamma_1^2}{G_1} + \frac{\gamma_2^2}{G_2} = -\frac{1}{P_3} (-P_2 + P_1 A_0 + B_0^2 - A_0^2) = 0$$

$$\frac{\alpha\beta}{G} - \frac{\alpha_1\beta_1}{G_1} + \frac{\alpha_2\beta_2}{G_2} = \frac{1}{-P_3} \cdot B_0^2 \sin \varepsilon \cos \varepsilon$$

$$\frac{\alpha\gamma}{G} - \frac{\alpha_1\gamma_1}{G_1} + \frac{\alpha_2\gamma_2}{G_2} = \frac{B_0 \cos \varepsilon}{-P_3} (P_1 + C_0 - A_0) = 0$$

$$\frac{\beta\gamma}{G} - \frac{\beta_1\gamma_1}{G_1} + \frac{\beta_2\gamma_2}{G_2} = \frac{B_0 \sin \varepsilon}{-P_3} (P_1 - A_0) = -\frac{C_0 B_0 \sin \varepsilon}{-P_3}$$

Les trois termes quadratiques dans l'expression  $C_1$  se présentent sous la forme :

$$\begin{aligned} \frac{\Gamma}{G} &= \frac{\gamma^2}{G} f + \frac{\alpha\gamma}{G} b + \frac{\beta\gamma}{G} h - \frac{\alpha\beta}{G} d - \frac{\alpha^2}{G} l \\ -\frac{\Gamma_1}{G_1} &= -\frac{\gamma_1^2}{G_1} f - \frac{\alpha_1\gamma_1}{G_1} b - \frac{\beta_1\gamma_1}{G_1} h + \frac{\alpha_1\beta_1}{G_1} d + \frac{\alpha_1^2}{G_1} l \\ \frac{\Gamma_2}{G_2} &= \frac{\gamma_2^2}{G_2} f + \frac{\alpha_2\gamma_2}{G_2} b + \frac{\beta_2\gamma_2}{G_2} h - \frac{\alpha_2\beta_2}{G_2} d - \frac{\alpha_2^2}{G_2} l \end{aligned}$$

En additionnant ces trois équations, on obtient l'expression générale :

$$-P_3 C_1 = B_0 \sin \varepsilon (d \cdot B_0 \cos \varepsilon - l \cdot B_0 \sin \varepsilon - h \cdot C_0);$$

après avoir remplacé les coefficients  $d, h, l$  par leurs valeurs page 12, cette expression, pour les trois composantes, se présente sous la forme :

$$C_1^R = 0$$

$$\begin{aligned} -P_3 C_1^U &= A_s r^2 e_1 (A_c B_s - A_s B_c) = A_s r^2 e_1 A \cdot B \cdot a_1^2 \cos \varphi_1 \cos (A' - B') \\ -P_3 C_1^Z &= A_s r^2 e_1 (A_c C_s - A_s C_c). \end{aligned}$$

A l'aide des valeurs obtenues pour les quantités  $A_1, B_1, C_1$ , on peut développer les coefficients :

$$\Lambda = (G_1 + G_2) \Gamma + (G + G_2) \Gamma_1 + (G_1 - G) \Gamma_2$$

et

$$\Theta = (G_1 + G_2) G \Gamma + (G + G_2) G_1 \Gamma_1 + (G - G_2) G_2 \Gamma_2.$$

D'après Halphén<sup>1</sup>, on tire de l'identité :

$$\begin{vmatrix} -\Gamma & \Gamma_1 & \Gamma_2 \\ G & G_1 - G_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{G} & \frac{1}{G_1} & -\frac{1}{G_2} \\ G & G_1 - G_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_1 - C_1 & -B_1 \\ P_1 & 3P_1^2 - 2P_2 \\ 3 & \frac{-P_2}{-P_3} & P_1 \end{vmatrix}$$

l'expression suivante :

$$-\frac{\Lambda}{C} \cdot C^2 = A_1(3P_1P_3 - P_1^2P_2 + 2P_2^2) - B_1(P_1P_2 - 9P_3) - 2C_1P_3(P_1^2 - 3P_2).$$

Si l'on pose :

$$\begin{aligned} P_1P_2 - 9P_3 &= \rho \\ P_1^2 - 3P_2 &= \lambda \end{aligned}$$

on obtient donc :

$$\begin{aligned} \frac{\Lambda^R}{C} \cdot C^2 &= 2\lambda \cdot \frac{1}{3}P_2r + \rho \left( B_1^R + \frac{1}{3}P_1 \cdot r \right) \\ \frac{\Lambda^U}{C} \cdot C^2 &= 2\lambda P_3 \cdot C_1^U + \rho B_1^U \\ \frac{\Lambda^Z}{C} \cdot C^2 &= 2\lambda P_3 C_1^Z + \rho B_1^Z. \end{aligned}$$

Le calcul du coefficient  $C^2$  se fait de la manière suivante :

Si  $g_2$  et  $g_3$  représentent les invariants de l'équation cubique, dont les quantités  $G$  sont les racines, l'expression  $g_2^3 - 27g_3^2$  sera le discriminant de cette équation, et on aura :

<sup>1</sup> Halphén, *Théorie des fonctions elliptiques*.

$$C^2 = (G + G_2)^2 \cdot (G - G_1)^2 \cdot (G_1 + G_2)^2 = \frac{1}{16} (g_2^3 - 27 g_3^2).$$

En désignant par  $g$  l'invariant absolu, on obtient :

$$C^2 = \frac{27}{16} \cdot g_3^2 (g - 1)$$

où les invariants ont les valeurs respectives :

$$g_2 = \frac{4}{3} \lambda$$

$$g_3 = \frac{4}{27} (2 P_1 \lambda - 3 \rho),$$

$$g = \frac{g_3^2}{27 g_3^2}$$

L'autre coefficient  $\Theta$  s'obtiendra à l'aide de l'identité :

$$\begin{vmatrix} G\Gamma & -G_1\Gamma_1 & G_2\Gamma_1 \\ G & G_1 & -G_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{G} & \frac{1}{G_1} & -\frac{1}{G_2} \\ \frac{G_2+G_1}{G} & \frac{G_2+G}{G_1} & \frac{G_1-G}{G_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} B_1 & -A_1 & \Lambda \\ P_1 & 3 & 0 \\ 3 & -P_2 & -P_3 \end{vmatrix}$$

sous la forme :

$$\Theta \cdot 2 (P_1^2 - 3 P_2) = \Lambda (P_1 P_2 - 9 P_3) + C (P_1 A_1 + 3 B_1)$$

ou :

$$\frac{\Theta^R}{C} = \frac{1}{2\lambda} \left( \frac{\Lambda^R}{C} \rho + 3 (B_1^R + \frac{1}{3} P_1 r) \right)$$

$$\frac{\Theta^U}{C} = \frac{1}{2\lambda} \left( \frac{\Lambda^U}{C} \rho + 3 B_1^U \right)$$

$$\frac{\Theta^Z}{C} = \frac{1}{2\lambda} \left( \frac{\Lambda^Z}{C} \rho + 3 B_1^Z \right).$$

Pour effectuer le calcul de l'expression :

$$V = \frac{2}{\pi} \left\{ \frac{\Lambda}{C} \left( \eta - \omega \frac{P_1}{3} \right) + \omega \frac{\Theta}{C} \right\}$$

il nous reste encore à calculer les intégrales elliptiques  $\omega$  et  $\eta$ . Ce calcul se fait d'après les recherches de M. Bruns<sup>1</sup>.

Si  $g_2$  et  $g_3$  désignent les coefficients de l'équation cubique :

$$4s^3 - g_2 s - g_3 = 0$$

et  $g$  l'invariant absolu, M. Bruns pose :

$$\omega = \Omega g_3^{-\frac{1}{6}} \cdot g_2^{\frac{1}{3}} \quad \text{et} \quad \eta = H g_3^{\frac{1}{6}}$$

et trouve pour les quantités  $\Omega$  et  $H$  les équations différentielles suivantes :

$$\begin{aligned} g(g-1) \frac{d^2\Omega}{dg^2} + \left(\frac{7}{3}g - \frac{4}{3}\right) \frac{d\Omega}{dg} + \frac{55}{144}\Omega &= 0 \\ g(g-1) \frac{d^2H}{dg^2} + \left(\frac{4}{3}g - \frac{1}{3}\right) \frac{dH}{dg} - \frac{5}{144}H &= 0, \end{aligned}$$

ces équations correspondent à l'équation différentielle de la série hypergéométrique de Gauss, savoir :

$$x(x-1) \frac{d^2F}{dx^2} + (x(\alpha + \beta + 1) - \gamma) \frac{dF}{dx} + \alpha \cdot \beta \cdot F = 0;$$

on pourrait donc poser :

$$\begin{aligned} \Omega &= C \cdot F\left(\frac{11}{12}, \frac{5}{12}, \frac{4}{3}, g\right) \\ H &= C' \cdot F\left(\frac{5}{12}, -\frac{1}{12}, \frac{1}{3}, g\right) \end{aligned}$$

où  $C$  et  $C'$  représentent deux constantes.

En prenant en considération les relations :

<sup>1</sup> Bruns, *Ueber die Perioden der elliptischen Integrale erster und zweiter Gattung.*

$$F(\alpha, \beta, \gamma, x) = \\ x^{\alpha-\gamma} (1-x)^{\gamma-\alpha-\beta} \cdot F\left(1-\alpha, \gamma-\alpha, \gamma-\alpha-\beta+1, \frac{x-1}{x}\right)$$

on obtient pour les deux quantités  $\Omega$  et  $H$  les expressions suivantes :

$$\Omega = C \cdot 27^{-\frac{1}{12}} \cdot g_2^{-\frac{1}{4}} F\left(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, 1, \frac{g-1}{g}\right) \\ H = C' 27^{-\frac{1}{12}} g_2^{-\frac{1}{4}} F\left(\frac{7}{12}, -\frac{1}{12}, 1, \frac{g-1}{g}\right)$$

Pour déterminer les constantes  $C$  et  $C'$ , on pose :

$$g = 1, g_3 = 1 \text{ donc } g_2 = 3;$$

dans ce cas, on aura :

$$e_1 = 1, e_2 = e_3 = -\frac{1}{2}, k^2 = \frac{e_2 - e_3}{e_1 - e_3} = 0,$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{e_1 - e_3}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} = \frac{\pi}{\sqrt{6}},$$

et comme :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = \frac{e_1 \omega + \eta}{\sqrt{e_1 - e_3}}$$

on obtient :

$$\eta = \frac{\pi}{24}$$

Les intégrales elliptiques se calculent donc d'après les formules :

$$\omega = \frac{\pi}{\sqrt[4]{12}} g_2^{-\frac{1}{4}} F\left(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, 1, \frac{g-1}{g}\right) \\ \eta = \frac{\pi}{\sqrt[4]{1728}} g_2^{-\frac{1}{4}} F\left(\frac{7}{12}, \frac{1}{12}, 1, \frac{g-1}{g}\right),$$

Pour faciliter la détermination de ces quantités  $\omega$  et  $\eta$ , j'ai calculé une table qui donne pour l'argument  $\frac{g-1}{g} = x$  les deux séries hypergéométriques :

$$F_{\omega}\left(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, 1, x\right) \text{ et } F_{\eta}\left(\frac{7}{12}, -\frac{1}{12}, 1, x\right)$$

Si l'argument de ces séries est  $> \frac{1}{2}$ , leur convergence est petite; pour ce cas, j'ai effectué le calcul de la table de la manière suivante :

La somme de la série hypergéométrique dont l'argument est 1, se représente par l'expression :

$$F(\alpha, \beta, \gamma, 1) = \frac{\Gamma(\gamma) \cdot \Gamma(\gamma - \beta - \alpha)}{\Gamma(\gamma - \alpha) \cdot \Gamma(\gamma - \beta)}$$

ou d'après Gauss :

$$= \frac{\Pi(\gamma - 1) \Pi(\gamma - \alpha - \beta - 1)}{\Pi(\gamma - \alpha - 1) \Pi(\gamma - \beta - 1)};$$

dans ces formules  $\Gamma$  et  $\Pi$  ont la signification connue.

Pour quelques valeurs spéciales on a :

$$\Pi(0) = 1, \Pi\left(-\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \text{ et } \Pi(\mu) = \mu \cdot \Pi(\mu - 1)$$

de sorte qu'on obtient :

$$F\left(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, 1, 1\right) = \frac{77 \cdot \sqrt{\pi}}{144 \cdot \Pi\left(\frac{7}{12}\right) \Pi\left(\frac{11}{12}\right)}$$

$$F\left(\frac{7}{12}, -\frac{1}{12}, 1, 1\right) = \frac{5 \cdot \sqrt{\pi}}{12 \cdot \Pi\left(\frac{5}{12}\right) \cdot \Pi\left(\frac{1}{15}\right)}$$

Les logarithmes des fonctions  $\Pi$  se trouvent dans une table calculée par Gauss<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Gauss, *Disquisitiones generales circa seriem, etc.* Werke III.

En introduisant au lieu de  $x$  l'argument  $1 - x$ , on a la relation générale :

$$F(\alpha, \beta, \gamma, x) = A \cdot F(\alpha, \alpha + \beta - \gamma - 1, 1 - x) \\ + B \cdot (1 - x)^{\gamma - \alpha - \beta} \cdot F(\gamma - \alpha, \gamma - \beta, \gamma - \alpha - \beta + 1, 1 - x),$$

où

$$A = \frac{\Pi(\gamma - 1) \Pi(\gamma - \alpha - \beta - 1)}{\Pi(\gamma - \alpha - 1) \Pi(\gamma - \beta - 1)} \\ B = \frac{\Pi(\gamma - 1) \Pi(\alpha + \beta - \gamma - 1)}{\Pi(\alpha - 1) \Pi(\beta - 1)}.$$

On aura donc, pour les séries hypergéométriques dont nous avons besoin, les expressions suivantes :

$$F_{\omega}\left(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, 1, x\right) = A_1 \cdot F\left(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{1}{2}, 1 - x\right) \\ + B_1 (1 - x)^{\frac{1}{2}} \cdot F\left(\frac{11}{12}, \frac{7}{12}, \frac{3}{2}, 1 - x\right)$$

$$F_{\eta}\left(\frac{7}{12}, -\frac{1}{12}, 1, x\right) = A_2 \cdot F\left(\frac{7}{12}, -\frac{1}{12}, \frac{1}{2}, 1 - x\right) \\ + B_2 (1 - x)^{\frac{1}{2}} \cdot F\left(\frac{5}{12}, \frac{13}{12}, \frac{3}{2}, 1 - x\right)$$

et

$$A_1 = F\left(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, 1, 1\right), \quad A_2 = F\left(\frac{7}{12}, -\frac{1}{12}, 1, 1\right) \\ B_1 = -\frac{1}{6} A_2 \quad B_2 = +\frac{1}{6} A_1$$

$$\log A_1 = 0,040\,77266, \quad \log A_2 = 9,939\,49972 - 10;$$

Pour des valeurs de l'argument qui dépassent 0,980, l'interpolation devient inexacte pour un calcul de sept décimales, à cause des différences supérieures; il sera donc plus opportun pour un cas spécial de calculer directement les séries, où l'on n'a besoin que de quelques termes. Pour faciliter ce calcul, voici les coefficients de ces quatres séries :

$$F(\alpha, \beta, \gamma, 1-x) = 1 + c_1(1-x) + c_2(1-x)^2 + c_3(1-x)^3 + \dots$$

	$F\left(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{1}{2}, (1-x)\right)$	$F\left(\frac{11}{12}, \frac{7}{12}, \frac{3}{2}, (1-x)\right)$
$lg c_1$	<b>8.841 6375</b>	<b>9.478 4596</b>
$c_2$	<b>8.550 5460</b>	<b>9.249 5160</b>
$c_3$	<b>8.377 4602</b>	<b>9.100 5639</b>
$c_4$	<b>8.253 9553</b>	<b>8.989 9089</b>
$c_5$	<b>8.157 8823</b>	<b>8.901 8194</b>
$c_6$	<b>8.079 2491</b>	<b>8.828 6286</b>
$c_7$	<b>8.012 6888</b>	<b>8.766 0164</b>
$c_8$	<b>7.954 9840</b>	<b>8.711 3067</b>
$c_9$	<b>7.904 0532</b>	<b>8.662 7260</b>
$c_{10}$	<b>7.858 4720</b>	<b>8.619 0380</b>

	$F\left(\frac{7}{12}, \frac{1}{12}, -\frac{1}{2}, (1-x)\right)$	$F\left(\frac{5}{12}, \frac{13}{12}, \frac{3}{2}, (1-x)\right)$
$lg c_1$	<b>8.987 7655 n</b>	<b>9.478 4596</b>
$c_2$	<b>8.672 4280 n</b>	<b>9.249 5160</b>
$c_3$	<b>8.267 0553 n</b>	<b>8.901 8194</b>
$c_4$	<b>8.492 0937 n</b>	<b>9.100 5639</b>
$c_5$	<b>8.365 1397 n</b>	<b>8.989 9089</b>
$c_6$	<b>8.187 1057 n</b>	<b>8.828 6286</b>
$c_7$	<b>8.119 6172 n</b>	<b>8.766 0164</b>
$c_8$	<b>8.061 2230 n</b>	<b>8.711 3067</b>
$c_9$	<b>8.009 7599 n</b>	<b>8.662 7260</b>
$c_{10}$	<b>7.963 7554 n</b>	<b>8.619 0380</b>

## Résumé des Formules.

---

$$\sin \frac{1}{2} J \sin \frac{1}{2} (K + K_1) = \sin \frac{1}{2} (\vartheta_1 - \vartheta_2) \sin \frac{1}{2} (i_1 + i)$$

$$\sin \frac{1}{2} J \cos \frac{1}{2} (K + K_1) = \cos \frac{1}{2} (\vartheta_1 - \vartheta_2) \sin \frac{1}{2} (i_1 - i)$$

$$-\sin \Pi_1 \cos J = A \sin A', \quad -\sin \Pi_1 = B \sin B'$$

$$\cos \Pi_1 = A \cos A', \quad \cos \Pi_1 \cos J = B \cos B'$$

$$\begin{aligned} A \cdot a_1 \cos (A' + \Pi + v) &= A_c \\ -A \cdot a_1 \sin (A' + \Pi + v) &= B_c \\ a_1 \sin \Pi_1 \sin J &= C_c \end{aligned}$$

$$B \cdot a_1 \cos \varphi_1 \sin (B' + \Pi + v) = A_s$$

$$B \cdot a_1 \cos \varphi_1 \cos (B' + \Pi + v) = B_s$$

$$a_1 \cos \varphi_1 \cos \Pi_1 \cdot \cos J = C_s$$

$$a_1^2 + r^2 + 2e_1 r \cdot A_c = A_o$$

$$e_1 a_1^2 + r \cdot A_c = B_o \cos \varepsilon; \quad r A_s = B_o \sin \varepsilon; \quad a_1^2 e_1^2 = C_o$$

$$P_1 = A_o - C_o; \quad P_2 = B_o^2 - A_o C_o; \quad -P_3 = C_o B_o^2 \sin^2 \varepsilon$$

$$P_1^2 - 3P_2 = \lambda, \quad P_4 P_2 - G P_3 = \rho$$

$$g_2 = \frac{4}{3} \lambda, \quad g_3 = \frac{4}{27} \cdot (2P_1 \lambda - 3\rho), \quad g = \frac{g_2^3}{27 \cdot g_3^2}$$

$$\omega = \frac{\pi}{\sqrt[4]{12}} g_2^{-\frac{1}{4}} F_\omega; \quad \tau = \frac{\pi}{\sqrt[4]{1728}} g_2^{\frac{1}{4}} F_\eta$$

$$\log \frac{\pi}{\sqrt[4]{12}} = 0,22735456, \quad \log \frac{\pi}{\sqrt[4]{1728}} = 9,68776394 - 10$$

On prend de la table les valeurs de  $F_\omega$  et  $F_\eta$  avec l'argument :

$$\frac{g-1}{g} = x$$

$$A_1^R = r, \quad A_1^U = o, \quad A_1^Z = o$$

$$\begin{aligned} B_1^R &= -A_o (A_c e_1 + r) + B_o \cos \varepsilon (e_1 r + A_c (1 + e_1^2)) + A_s B_o \sin \varepsilon \\ B_1^U &= -\frac{1}{2} r a_1^2 \cos^2 \varphi_1 \sin^2 J \sin 2(\Pi + v) - r^2 e_1 B_c \\ B_1^Z &= -A_o C_c e_1 + B_o \cos \varepsilon C_c (1 + e_1^2) + C_s B_o \sin \varepsilon - C_c C_o e_1 \end{aligned}$$

$$-P_3 C_1^R = 0$$

$$-P_3 C_1^U = A_s r^2 e_1 A B a_1^2 \cos^2 \varphi_1 \cos(A' - B')$$

$$-P_3 C_1^Z = A_s r^2 e_1 (A_c C_s - A_s C_c)$$

$$C^2 = \frac{27}{16} \cdot g^2 (g-1)$$

$$\frac{\Lambda^R}{C} \cdot C^2 = \frac{2}{3} \lambda P_2 r + \rho (B_1^R + \frac{1}{3} P_4 r)$$

$$\frac{\Lambda^U}{C} \cdot C^2 = 2 \lambda P_3 C_1^U + \rho B_1^U$$

$$\frac{\Lambda^Z}{C} \cdot C^2 = 2 \lambda P_3 C_1^Z + \rho B_1^Z$$

$$\frac{\Theta^R}{C} = \frac{1}{2 \lambda} \left( \frac{\Lambda^R}{C} \rho + 3 (B_1^R + \frac{1}{3} P_4 r) \right)$$

$$\frac{\Theta^U}{C} = \frac{1}{2 \lambda} \left( \frac{\Lambda^U}{C} \rho + 3 B_1^U \right)$$

$$\frac{\Theta^Z}{C} = \frac{1}{2 \lambda} \left( \frac{\Lambda^Z}{C} \rho + 3 B_1^Z \right)$$

$$R_0 = \frac{2}{\pi} \left\{ \frac{\Lambda^R}{C} \left( \omega - \eta \frac{P_1}{3} \right) + \omega \cdot \frac{\Theta^R}{C} \right\}$$

$$U_0 = \frac{2}{\pi} \left\{ \frac{\Lambda^U}{C} \left( \omega - \eta \frac{P_1}{3} \right) + \omega \cdot \frac{\Theta^U}{C} \right\}$$

$$Z_0 = \frac{2}{\pi} \left\{ \frac{\Lambda^Z}{C} \left( \omega - \eta \frac{P_1}{3} \right) + \omega \cdot \frac{\Theta^Z}{C} \right\}$$

Pour contrôler ces formules, j'ai calculé les composantes de la force perturbatrice exercée par la planète Vénus sur Mercure et j'ai obtenu les mêmes valeurs que M. Hill<sup>1</sup> a trouvées.

Après avoir évalué les forces perturbatrices, le calcul des perturbations séculaires se fait de la manière suivante : on divise en douze parties l'orbite du corps céleste qui subit les perturbations, et on calcule pour chaque point de division, donc pour  $E = 0^\circ, 30^\circ, \dots, 330^\circ$ , les expressions suivantes :

$$H_{\infty} = Z_0 r \sin u$$

$$H_i = Z_0 r \cos u$$

$$H_e = R_0 \sin v + U_0 (\cos v + \cos E)$$

$$H_\omega = -R_0 \cos v + U_0 \left( 1 + \frac{r}{p} \right) \sin v$$

$$H_{M_1} = -r \cdot R_0.$$

Soient les valeurs trouvées  $H^0, H^1, H^2 \dots H^{14}$ . Si l'on pose :

$$(H) = \frac{1}{12} (H^0 + H^1 + \dots + H^{14})$$

on obtient :

<sup>1</sup> *On Gauss' Method of computing secular perturbations.* Astron. Papers, vol. I, part. V.

$$\sin i \cdot (\delta\vartheta)' = \frac{m_1}{1+m} \cdot a \mu \sec \varphi \cdot (H\omega)$$

$$(\delta i)' = \frac{m_1}{1+m} \cdot a \mu \sec \varphi \cdot (H_i)$$

$$(\delta e)' = \frac{m_1}{1+m} \cdot a^2 \mu \cos \varphi \cdot (H_e)$$

$$e (\delta\omega_1)' = \frac{m_1}{1+m} a^2 \mu \cos \varphi \cdot (H\omega)$$

$$(\delta M_1)' = \frac{m_1}{1+m} 2 a \mu (H_{M_1})$$

$$(\delta\omega)' = \delta\omega_1 - \cos i \cdot \delta\vartheta$$

$$(\delta\pi)' = \delta\omega_1 + 2 \sin^2 \frac{i}{2} \cdot \delta\vartheta$$

$$(\delta L)' = \delta M_1 + 2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cdot \delta\omega_1 + 2 \sin^2 \frac{i}{2} \cdot \delta\vartheta$$

où  $L$  désigne la longitude moyenne et  $\pi$  la longitude du périhélie mesurée d'un équinoxe fixe.

---

## TABLES DES SÉRIES HYPERGÉOMÉTRIQUES

$$F\left(\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, 1, x\right) = F_\omega$$

$$F\left(\frac{7}{12}, -\frac{1}{12}, 1, x\right) = F_\eta$$

pour évaluer les périodes des intégrales elliptiques  
de la première et de la deuxième espèce,  
d'après les formules :

$$\omega = \frac{\pi}{\sqrt[4]{12}} \cdot g_2^{-\frac{1}{4}} \cdot F_\omega; \quad \log \frac{\pi}{\sqrt[4]{12}} = 0,227\,3545\,6$$

$$\eta = \frac{\pi}{\sqrt[4]{1728}} \cdot g_2^{\frac{1}{4}} \cdot F_\eta; \quad \log \frac{\pi}{\sqrt[4]{1728}} = 9,687\,7639\,4 - 10$$

$g_2$  et  $g_3$  représentant les invariants et

$$g = \frac{g_2^3}{27 \cdot g_3^2}, \quad x = \frac{g-1}{g}$$

$x$	$F_{\omega}$	Diff.	$F_{\eta}$	Diff.	$x$	$F_{\omega}$	Diff.	$F_{\eta}$	Diff.
0.000	1.000 0000	+	1.000 0000	-	0.040	1.001 4107	+	0.998 0267	-
1	0347	347	0.999 9514	486	41	4465	358	0.997 9766	501
2	0695	348	9027	487	42	4824	359	9265	501
3	1043	348	8540	487	43	5183	359	8763	502
4	1391	348	8053	488	44	5542	359	8261	502
5	1739	349	7565	488	45	5902	360	7759	502
6	2088	349	7077	488	46	6262	360	7256	503
7	2437	349	6589	489	47	6622	360	6753	504
8	2786	350	6100	489	48	6982	361	6249	504
9	3136	350	5611	490	49	7343	361	5745	504
0.010	3486	350	5121	490	0.050	7704	361	5241	505
11	3836	350	4631	490	51	8065	362	4736	505
12	4186	351	4141	490	52	8427	362	4231	505
13	4537	351	3651	491	53	8789	362	3726	505
14	4887	351	3160	491	54	9151	362	3220	506
15	5238	352	2669	491	55	9513	363	2714	506
16	5590	352	2177	492	56	9876	363	2207	507
17	5942	352	1685	492	57	1.002 0239	363	1700	507
18	6294	352	1192	493	58	0602	364	1193	508
19	6646	352	0699	493	59	0966	364	0685	508
0.020	6998	353	0206	493	0.060	1330	364	0177	509
21	7351	353	0.998 9713	493	61	1694	364	0.996 9668	509
22	7704	353	9219	494	62	2058	365	9459	509
23	8057	353	8725	494	63	2423	365	8650	510
24	8411	354	8230	495	64	2788	366	8140	510
25	8765	354	7735	495	65	3154	366	7630	511
26	9119	354	7240	495	66	3519	365	7119	511
27	9474	354	6745	495	67	3885	366	6608	511
28	9828	355	6249	496	68	4252	367	6097	512
29	1.001 0183	356	5752	497	69	4618	366	5585	512
0.030	0539	355	5255	497	0.070	4985	367	5073	512
31	0894	355	4758	497	71	5352	368	4561	513
32	1250	356	4261	498	72	5720	368	4048	513
33	1606	356	3763	498	73	6088	368	3535	514
34	1962	356	3265	499	74	6456	368	3021	514
35	2319	357	2766	499	75	6824	368	2507	515
36	2676	357	2267	499	76	7193	369	1992	515
37	3033	357	1768	500	77	7562	369	1477	515
38	3391	358	1268	500	78	7931	370	0962	516
39	3749	358	0768	501	79	7301	370	0446	516
0.040	4107		0267		0.080	8671		0.995 9930	

$x$	$F_\omega$	Diff.	$F_\eta$	Diff.	$x$	$F_\omega$	Diff.	$F_\eta$	Diff.
0.080	1.002 8671	+ 370	0.995 9930	- 517	0.120	1.004 3725	+ 383	0.993 8945	- 533
81	9041	370	9413	517	21	4108	383	8412	534
82	9411	371	8896	517	22	4491	384	7878	534
83	9782	371	8379	518	23	4875	384	7344	534
84	1.003 0153	371	7861	518	24	5259	384	6809	535
85	0525	372	7343	519	25	5643	385	6274	536
86	0897	372	6824	519	26	6028	385	5738	536
87	1269	372	6305	519	27	6413	385	5202	536
88	1641	372	5786	520	28	6798	385	4666	536
89	2014	373	5266	520	29	7183	386	4129	537
0.090	2387	373	4746	520	0.130	7569	386	3592	538
91	2760	374	4226	521	31	7955	387	3054	538
92	3134	374	3705	522	32	8342	387	2516	539
93	3508	374	3183	522	33	8729	388	1977	539
94	3882	375	2661	522	34	9117	387	1438	540
95	4257	375	2139	522	35	9504	388	0898	540
96	4632	375	1616	523	36	9892	388	0358	540
97	5007	375	1093	523	37	1.005 0280	389	0.992 9818	541
98	5382	376	0570	524	38	0669	389	9277	541
99	5758	376	0046	525	39	1058	390	8736	542
0.100	6134	377	0.994 9521	525	0.140	1448	389	8194	542
01	6511	377	8996	525	41	1837	390	7652	543
02	6888	377	8471	525	42	2227	391	7109	543
03	7265	377	7946	525	43	2618	391	6566	544
04	7642	378	7420	526	44	3009	391	6022	544
05	8020	378	6893	527	45	3400	391	5478	544
06	8398	378	6366	527	46	3791	392	4934	545
07	8776	378	5839	527	47	4183	392	4389	546
08	9155	379	5311	528	48	4575	392	3843	546
09	9534	379	4783	528	49	4967	392	3297	546
0.110	9914	379	4254	529	0.150	5360	393	2751	547
11	1.004 0293	380	3725	529	51	5753	394	2204	547
12	0673	380	3196	530	52	6147	394	1657	548
13	1053	380	2666	530	53	6541	394	1109	548
14	1434	381	2136	530	54	6935	395	0561	549
15	1815	381	1605	531	55	7330	395	0012	549
16	2196	382	1074	532	56	7725	395	0.991 9463	549
17	2578	382	0542	532	57	8120	395	8914	550
18	2960	382	0010	532	58	8515	396	8364	551
19	3342	382	0.993 9478	532	59	8911	396	7813	551
0.120	3725		8945		0.160	9308		7262	

$x$	$F_{\omega}$	Diff.	$F_{\eta}$	Diff.	$x$	$F_{\omega}$	Diff.	$F_{\eta}$	Diff.
0.160	1.005 9308	+	0.991 7262	—	0.200	1.007 5461	+	0.989 4828	—
61	9704	396	6714	551	01	5873	412	4257	571
62	1.006 0101	397	6159	552	02	6285	412	3685	572
63	0499	398	5607	552	03	6697	412	3113	572
64	0897	398	5054	553	04	7110	413	2540	573
65	1295	398	4501	553	05	7523	413	1967	573
66	1693	399	3947	554	06	7937	414	1394	574
67	2092	399	3393	554	07	8351	414	0820	574
68	2491	400	3838	555	08	8765	414	0245	575
69	2891	400	3283	555	09	9180	415	0.988 9670	575
				556			415		576
0.170	3291	400	1727	556	0.210	9595	415	9094	576
71	3691	401	1171	556	11	1.008 0010	416	8518	576
72	4092	401	0614	557	12	0426	416	7941	577
73	4493	401	0057	557	13	0842	416	7364	577
74	4894	402	0.990 9499	558	14	1259	417	6786	578
75	5296	402	8941	558	15	1676	417	6208	578
76	5698	402	8382	559	16	2094	418	5629	579
77	6101	403	7823	559	17	2512	418	5050	579
78	6504	403	7263	560	18	2930	418	4470	580
79	6907	403	6703	560	19	3348	418	3890	580
				560			419		581
0.180	7310	404	6143	561	0.220	3767	420	3309	582
81	7714	404	5582	562	21	4187	420	2727	582
82	8118	404	5020	562	22	4607	420	2145	582
83	8523	405	4458	562	23	5027	420	1563	582
84	8928	405	3896	563	24	5448	421	0980	583
85	9334	406	3333	563	25	5869	421	0396	584
86	9740	406	2769	564	26	6290	421	0.987 9812	584
87	1.007 0146	406	2205	564	27	6712	422	9227	585
88	0553	407	1641	565	28	7134	422	8642	585
89	0960	407	1076	566	29	7557	423	8056	586
0.190	1367	408	0510	566	0.230	7980	424	7470	587
91	1775	408	0.989 9944	566	31	8404	424	6883	587
92	2183	408	9378	566	32	8828	424	6296	588
93	2591	409	8814	567	33	9252	424	5708	588
94	3000	409	8243	568	34	9677	425	5120	589
95	3409	410	7675	568	35	1.009 0102	425	4531	590
96	3819	410	7107	569	36	0528	426	3941	590
97	4229	410	6538	570	37	0954	426	3351	591
98	4639	411	5968	570	38	1380	426	2760	591
99	5050	411	5398	570	39	1807	427	2169	591
				570			427		582
0.200	5461		4828		0.240	2234		1577	

$\omega$	$F_\omega$	Diff.	$F_\eta$	Diff.	$x$	$F_\omega$	Diff.	$F_\eta$	Diff.
0.240	1.009 2234	+	0.987 1577	—	0.280	1.010 9682	+	0.984 7444	—
41	2662	428	0985	592	81	1.011 0127	445	6825	616
42	3090	428	0392	593	82	0573	446	6209	616
43	3519	429	0.986 9799	593	83	1019	446	5592	617
44	3948	429	9205	594	84	1466	447	4975	617
45	4377	430	8610	595	85	1913	447	4357	618
46	4807	430	8015	595	86	2361	448	3739	618
47	5237	431	7420	596	87	2809	449	3120	620
48	5668	431	6824	597	88	3258	449	2500	620
49	6099	432	6227	598	89	3707	450	1880	621
0.250	6531	432	5629	598	0.290	4157	450	1259	622
51	6963	432	5031	598	91	4607	450	0637	622
52	7395	433	4433	598	92	5057	450	0015	623
53	7828	433	3834	599	93	5508	451	0.983 9392	623
54	8261	433	3234	600	94	5960	452	8769	623
55	8695	434	2634	600	95	6412	452	8145	624
56	9129	434	2033	601	96	6864	452	7520	625
57	9564	435	1432	601	97	7317	453	6894	626
58	9999	435	0830	602	98	7770	453	6268	626
59	1.010 0434	436	0228	602	99	8224	454	5642	626
				603		454		627	
0.260	0870	436	0.985 9625	604	0.300	8678	455	5015	628
61	1306	436	9024	604	01	9133	455	4387	629
62	1743	437	8417	604	02	9589	456	3758	629
63	2180	437	7812	605	03	1.012 0045	456	3129	630
64	2618	438	7207	605	04	0501	456	2499	630
65	3056	439	6601	606	05	0958	457	1869	630
66	3495	439	5994	607	06	1415	457	1238	631
67	3934	440	5387	607	07	1873	458	0606	632
68	4374	440	4779	608	08	2331	458	0.982 9974	633
69	4814	440	4171	609	09	2789	459	9341	634
0.270	5254	441	3562	609	0.310	3248	460	8707	634
71	5695	441	2953	610	11	3708	460	8073	635
72	6136	441	2343	611	12	4168	461	7438	636
73	6578	442	1732	611	13	4629	461	6802	636
74	7020	442	1121	612	14	5090	461	6166	637
75	7462	442	0509	612	15	5552	462	5529	637
76	7905	443	0.984 9897	613	16	6014	463	4892	638
77	8349	444	9284	614	17	6477	463	4254	639
78	8793	444	8670	614	18	6940	464	3615	640
79	9237	445	8056	615	19	7404	464	2975	640
0.280	9682		7441		0.320	7868		2335	

$x$	$F_\omega$	Diff.	$F_\eta$	Diff.	$x$	$F_\omega$	Diff.	$F_\eta$	Diff.
0.320	1.012 7868	+	0.982 2335	-	0.360	1.014 6864	+	0.979 6167	-
21	8333	465	1694	641	61	7350	486	5498	669
22	8798	465	1053	641	62	7837	487	4829	669
23	9264	466	0411	642	63	8324	487	4159	670
24	9730	466	0.981 9768	643	64	8811	488	3488	671
25	1.013 0197	467	9124	644	65	9299	489	2816	672
26	0664	467	8480	645	66	9788	490	2143	673
27	4132	468	7835	645	67	1.015 0278	490	1470	674
28	1600	468	7190	646	68	0768	490	0796	674
29	2069	469	6544	646	69	1258	490	0121	675
				647			491		675
0.330	2538	470	5897	648	0.370	1749	492	0.978 9446	676
31	3008	470	5249	648	71	2241	492	8770	677
32	3478	471	4601	649	72	2733	493	8093	678
33	3949	471	3952	649	73	3226	494	7315	678
34	4420	471	3303	651	74	3720	494	6737	678
35	4892	472	2652	651	75	4214	494	6058	680
36	5364	472	2001	652	76	4708	495	5378	681
37	5837	473	1349	652	77	5203	496	4697	681
38	6311	474	0697	653	78	5699	496	4016	683
39	6785	474	0044	653	79	6195	497	3333	683
				653			497		683
0.340	7259	475	0.980 9391	655	0.380	6692	498	2650	684
41	7734	476	8736	655	81	7190	498	1966	684
42	8240	476	8081	656	82	7688	499	1282	686
43	8686	476	7425	656	83	8187	499	0596	686
44	6163	477	6769	658	84	8686	500	0.977 9910	687
45	9640	477	6111	658	85	9186	500	9223	687
46	1.014 0118	478	5453	659	86	9686	500	8536	687
47	0596	478	4794	659	87	1.016 0187	501	7847	689
48	1075	479	4135	660	88	0689	502	7158	690
49	1554	479	4475	660	89	1191	502	6468	691
				660			503		691
0.350	2034	481	2815	662	0.390	1694	504	5777	692
51	2515	481	2153	662	91	2198	504	5085	692
52	2996	481	1491	663	92	2702	505	4393	693
53	3478	482	0828	664	93	3207	505	3700	694
54	3960	482	0164	664	94	3712	506	3006	695
55	4443	483	0.979 9500	664	95	4218	507	2311	695
56	4926	483	8835	665	96	4725	507	1616	697
57	5410	484	8169	666	97	5232	508	0919	697
58	5894	484	7502	667	98	5740	508	0222	698
59	6379	485	6835	667	99	6248	508	0.976 9524	698
				668			509		699
0.360	6864		6167		0.400	6757		4825	

$x$	$F_{\omega}$	Diff.	$F_{\eta}$	Diff.	$x$	$F_{\omega}$	Diff.	$F_{\eta}$	Diff.
0.400	1.016 6757	+	0.976 8825	-	0.440	1.018 7646	+	0.974 0180	-
01	7267	510	8125	700	41	8182	536	0.973 9446	734
02	7777	510	7425	700	42	8719	537	8711	735
03	8288	511	6724	701	43	9256	537	7975	736
04	8799	511	6022	702	44	9794	538	7238	737
05	9314	512	5319	703	45	1.019 0333	539	6500	738
06	9824	513	4615	704	46	0873	540	5762	740
07	1.017 0337	513	3910	705	47	1413	540	5022	740
08	0851	514	3205	705	48	1954	541	4282	742
09	1366	515	2499	706	49	2496	542	3540	742
		515		707			542		742
0.410	1881	516	1792	708	0.450	3038	543	2798	744
11	2397	517	1084	709	51	3581	543	2054	744
12	2914	517	0375	710	52	4124	545	1310	745
13	3431	518	0.975 9665	710	53	4669	545	0565	746
14	3949	518	8955	710	54	5214	546	0.972 9819	747
15	4468	519	8244	711	55	5760	547	9072	748
16	4987	519	7532	712	56	6307	548	8324	749
17	5507	520	6819	713	57	6855	548	7575	750
18	6027	520	6105	714	58	7403	549	6825	751
19	6548	521	5390	715	59	7952	549	6074	752
		522		716			549		752
0.420	7070	522	4674	716	0.460	8501	550	5322	753
21	7592	523	3958	717	61	9051	551	4569	754
22	8115	524	3241	718	62	9602	552	3815	755
23	8639	524	2523	719	63	1.020 0154	553	3060	755
24	9163	525	1804	720	64	0707	553	2305	757
25	9688	525	1084	721	65	1260	554	1548	758
26	1.018 0214	526	0363	722	66	1814	555	0790	759
27	0741	527	0.974 9641	722	67	2369	556	0031	759
28	1268	527	8919	722	68	2925	556	0.971 9272	761
29	1796	528	8195	724	69	3481	557	8511	762
		528		724			557		762
0.430	2324	529	7471	725	0.470	4038	558	7749	763
31	2853	530	6746	726	71	4596	559	6986	763
32	3383	531	6020	727	72	5155	559	6223	765
33	3914	531	5293	727	73	5714	560	5458	765
34	4445	531	4566	727	74	6274	561	4693	767
35	4977	532	3837	729	75	6835	562	3926	768
36	5509	532	3107	730	76	7397	563	3158	769
37	6042	533	2376	731	77	7960	563	2389	769
38	6576	534	1645	731	78	8523	564	1620	771
39	7114	535	0913	732	79	9087	565	0849	771
		535		733			565		771
0.440	7646		0180		0.480	9652		0078	

$x$	$F_{\omega}$	Diff.	$F_{\eta}$	Diff.	$x$	$F_{\eta_1}$	Diff.	$F_{\eta}$	Diff.
0.480	1.020 9652	+ 566	0.971 0078	- 773	0.520	1.023 2918	+ 600	0.967 8332	- 817
81	1.021 0218	566	0.970 9305	774	21	3518	600	7515	817
82	0784	566	8531	775	22	4118	600	6698	817
83	1351	567	7756	776	23	4719	601	5879	819
84	1919	568	6980	777	24	5321	602	5059	820
85	2488	569	6203	777	25	5924	603	4237	822
86	3058	570	5426	779	26	6527	605	3415	824
87	3628	570	4647	780	27	7132	606	2591	824
88	4199	571	3867	782	28	7738	607	1767	826
89	4771	572	3085	782	29	8345	607	0941	827
0.490	5344	574	2303	783	0.530	8952	608	0114	829
91	5918	574	1520	784	31	9560	609	0.966 9285	829
92	6492	574	0736	786	32	1.024 0169	611	8456	831
93	7068	576	0.969 9950	786	33	0780	611	7625	832
94	7644	576	9164	788	34	1391	612	6793	834
95	8221	577	8376	788	35	2003	613	5959	834
96	8798	577	7588	790	36	2616	614	5125	836
97	9377	579	6798	790	37	3230	615	4289	837
98	9956	579	6008	792	38	3845	616	3452	839
99	1.022 0536	580	5216	793	39	4461	617	2613	839
0.500	1117	582	4423	794	0.540	5078	618	1774	841
01	1699	582	3629	795	41	5696	618	0933	841
02	2282	583	2834	796	42	6314	620	0092	844
03	2866	584	2038	797	43	6934	621	0.965 9248	844
04	3450	585	1241	799	44	7555	622	8404	846
05	4035	586	0442	799	45	8177	622	7558	847
06	4621	587	0.968 9643	801	46	8799	624	6711	848
07	5208	588	8842	801	47	9423	625	5863	849
08	5796	589	8041	803	48	1.025 0048	626	5014	852
09	6385	590	7238	804	49	0674	626	4162	852
0.510	6975	590	6434	805	0.550	1300	628	3310	854
11	7565	591	5629	806	51	1928	628	2456	854
12	8156	592	4823	808	52	2556	630	1602	856
13	8748	583	4015	808	53	3186	630	0746	857
14	9341	594	3207	810	54	3816	632	0.964 9889	859
15	9935	595	2397	810	55	4448	633	9030	860
16	1.023 0530	596	1587	812	56	5081	634	8170	862
17	1126	597	0775	813	57	5715	634	7308	862
18	1723	597	0.967 9962	815	58	6349	636	6446	864
19	2320	598	9147	815	59	6985	636	5582	865
0.520	2918		8332		0.560	7624		4717	

$x$	$F_{\omega}$	Diff.	$F_{\eta}$	Diff.	$x$	$F_{\omega}$	Diff.	$F_{\eta}$	Diff.
0.560	1.025 7624	+	0.964 4717	-	0.600	1.028 3980	+	0.960 8954	-
61	8259	638	3850	867	01	4662	682	8026	925
62	8898	639	2982	868	02	5346	684	7100	926
63	9538	640	2113	869	03	6031	685	6172	928
64	1.026 0179	641	1243	870	04	6717	686	5243	929
65	0821	642	0371	872	05	7404	687	4312	931
66	1464	643	0.963 9497	874	06	8093	689	3379	933
67	2108	644	8622	875	07	8782	691	2445	934
68	2753	645	7746	876	08	9473	692	1510	935
69	3399	646	6868	878	09	1.029 0165	694	0573	937
		647							939
0.570	4046	649	5990	880	0.610	0859	695	0.959 9634	941
71	4695	649	5110	882	11	1554	696	8693	942
72	5344	651	4228	883	12	2250	697	7751	944
73	5995	651	3345	885	13	2947	699	6807	946
74	6646	652	2460	886	14	3646	700	5861	947
75	7298	654	1574	887	15	4346	701	4914	949
76	7952	655	0687	889	16	5047	702	3965	950
77	8607	656	0.962 9798	890	17	5749	704	3015	952
78	9263	657	8908	892	18	6453	705	2063	954
79	9920	658	8016	893	19	7158	706	1109	955
0.580	1.027 0578	659	7123	894	0.620	7864	707	0154	958
81	1237	661	6229	896	21	8571	709	0.958 9196	959
82	1898	662	5333	898	22	9280	710	8237	961
83	2560	662	4435	899	23	9990	712	7276	962
84	3222	663	3536	900	24	1.030 0702	713	6314	964
85	3885	665	2636	902	25	1415	714	5350	966
86	4550	667	1734	903	26	2129	715	4384	967
87	5217	667	0831	905	27	2844	717	3417	969
88	5884	668	0.961 9926	906	28	3561	718	2448	971
89	6552	669	9020	908	29	4279	720	1477	973
0.590	7221	671	8112	909	0.630	4999	722	0504	974
91	7892	672	7203	910	31	5721	722	0.957 9530	976
92	8564	673	6293	913	32	6443	723	8554	978
93	9237	674	5380	914	33	7166	725	7576	980
94	9911	675	4466	915	34	7891	727	6596	982
95	1.028 0586	676	3551	917	35	8618	728	5614	984
96	1262	678	2634	918	36	9346	729	4630	985
97	1940	679	1716	920	37	1.031 0075	731	3645	987
98	2619	680	0796	922	38	0806	732	2658	989
99	3299	681	0.960 9874	923	39	1538	733	1669	991
0.600	3980		8951		0.640	2274		0678	

$x$	$F_{\omega}$	$Diff.$	$F_{\eta}$	$Diff.$	$x$	$F_{\omega}$	$Diff.$	$F_{\eta}$	$Diff.$
0.640	1.034 2271	+	0.957 0678	-	0.680	1.034 2855	+	0.952 9438	-
41	3006	735	0.956 9685	993	81	3653	799	8364	1074
42	3743	737	8691	994	82	4452	801	7288	1076
43	4481	738	7695	996	83	5253	803	6209	1079
44	5220	739	6697	1000	84	6056	805	5129	1080
45	5961	741	5697	1002	85	6861	807	4046	1083
46	6703	742	4695	1004	86	7668	808	2960	1086
47	7446	743	3691	1006	87	8476	810	1872	1090
48	8191	745	2685	1008	88	9286	812	0782	1092
49	8938	747	1677	1010	89	1.035 0098	814	0.951 9690	1094
0.650	8686	750	0667	1012	0.690	0912	816	8596	1097
51	1.034 0436	751	0.955 9655	1013	91	1728	817	7499	1099
52	1487	752	8642	1016	92	2545	819	6400	1102
53	1939	754	7626	1017	93	3364	821	5298	1104
54	2693	756	6609	1019	94	4185	823	4194	1106
55	3449	757	5590	1022	95	5008	824	3088	1108
56	4206	759	4568	1023	96	5832	826	1980	1111
57	4965	760	3545	1025	97	6658	829	0869	1114
58	5725	762	2520	1028	98	7487	831	0.950 9755	1116
59	6487	763	1492	1029	99	8318	832	8639	1119
0.660	7250	765	0463	1034	0.700	9150	834	7520	1121
61	8015	766	0.954 9432	1034	01	9984	837	6399	1123
62	8781	768	8398	1035	02	1.036 0824	838	5276	1126
63	9549	770	7363	1038	03	1659	840	4150	1128
64	1.032 0319	771	6325	1040	04	2499	842	3022	1131
65	1090	773	5285	1044	05	3341	843	1891	1134
66	1863	774	4244	1043	06	4184	846	0757	1136
67	2637	776	3201	1046	07	5030	848	0.949 9621	1139
68	3413	778	2155	1048	08	5878	850	8482	1141
69	4191	779	1107	1050	09	6728	852	7341	1144
0.670	4970	781	0057	1053	0.710	7580	854	6197	1146
71	5751	783	0.953 9004	1054	11	8434	856	5051	1149
72	6534	784	7950	1057	12	9290	858	3902	1152
73	7318	786	6893	1058	13	1.037 0148	860	2750	1154
74	8104	788	5835	1061	14	1008	862	1596	1157
75	8892	789	4774	1063	15	1870	864	0439	1159
76	9681	791	3711	1065	16	2734	866	0.948 9280	1162
77	1.033 0472	793	2646	1067	17	3600	868	8148	1166
78	1265	794	1579	1070	18	4468	870	6952	1168
79	2059	796	0509	1071	19	5338	873	5784	1170
0.680	2855		0.952 9438		0.720	6214		4614	

$x$	$F_{\omega}$	Diff.	$F_{\eta}$	Diff.	$x$	$F_{\omega}$	Diff.	$F_{\eta}$	Diff.
0.720	1.037 6244	+	0.948 4614	-	0.760	1.041 3006	+	0.943 5357	-
21	7086	875	3444	1173	61	3977	974	4059	1298
22	7963	877	2265	1176	62	4951	974	2758	1301
23	8842	879	4086	1179	63	5928	977	1453	1305
24	9723	881	0.947 9905	1181	64	6908	980	0445	1308
25	4.038 0606	883	8720	1185	65	7894	983	0.942 8833	1342
26	1492	886	7533	1187	66	8876	985	7517	1316
27	2380	888	6343	1190	67	9864	988	6197	1320
28	3270	890	5150	1193	68	1.042 0855	991	4874	1323
29	4162	892	3954	1196	69	1849	994	3547	1327
		894	1198				997		1330
0.730	5056	897	2756	1201	0.770	2846	999	2217	
31	5953	899	1555	1205	71	3845	1003	0883	1334
32	6852	901	0350	1208	72	4848	1006	0.941 9545	1338
33	7753	904	0.946 9142	1210	73	5854	1008	8203	1342
34	8657	906	7932	1213	74	6862	1011	6858	1345
35	9563	908	6719	1217	75	7873	1015	5509	1349
36	1.039 0471	910	5502	1220	76	8888	1018	4155	1354
37	1381	913	4282	1222	77	9906	1021	2797	1358
38	2294	915	3060	1225	78	1.043 0927	1023	1436	1361
39	3209	918	1835	1229	79	1950	1023	0074	1365
							1027		1369
0.740	4127	920	0606	1232	0.780	2977	1030	0.947 8702	
41	5047	923	0.945 9374	1235	81	4007	1033	7329	1373
42	5970	925	8139	1238	82	5040	1037	5952	1377
43	6895	927	6901	1241	83	6077	1040	4571	1381
44	7822	930	5660	1244	84	7417	1042	3185	1386
45	8752	932	4416	1248	85	8459	1046	1795	1390
46	9684	935	3168	1251	86	9205	1049	0401	1394
47	1.040 0619	937	1917	1254	87	1.044 0254	1053	0.939 9003	1398
48	1556	940	0663	1257	88	1307	1056	7601	1402
49	2496	943	0.944 9406	1260	89	2363	1059	6195	1406
									1411
0.750	3439	945	8446	1263	0.790	3422	1063	4784	1415
51	4384	947	6883	1267	91	4485	1066	3369	1420
52	5331	950	5616	1271	92	5551	1069	1949	1424
53	6281	953	4345	1274	93	6620	1073	0525	1428
54	7234	955	3071	1277	94	7693	1077	0.938 9097	1433
55	8189	958	1794	1280	95	8770	1080	7664	1437
56	9147	961	0514	1284	96	9850	1083	6227	1442
57	1.041 0108	963	0.943 9230	1288	97	1.045 0933	1087	4785	1447
58	1074	966	7942	1291	98	2020	1091	3338	1451
59	2037	969	6651	1294	99	3111	1094	1887	1455
0.760	3006		5357		0.800	4205		0432	

$x$	$F_{\omega}$	$Diff.$	$F_{\eta}$	$Diff.$	$x$	$F_{\omega}$	$Diff.$	$F_{\eta}$	$Diff.$
0.800	1.045 4205	+	0.938 0432	-	0.840	1.050 1305	+	0.931 7929	-
01	5303 1098		0.937 8972	1460	41	2577 1272		6246 1683	
02	6404 1101		7507 1465		42	3854 1277		4556 1680	
03	7509 1105		6037 1470		43	5136 1282		2859 1697	
04	8618 1109		4562 1475		44	6423 1287		4155 1704	
05	9731 1113		3082 1480		45	7716 1293		0.930 9444 1711	
06	1.046 0847	1116	1484		46	9015 1299		7727 1717	
07	1967 1120		1598 1488		47	1.051 0319		6003 1724	
08	3091 1124		0110 1494		48	1628 1309		4272 1731	
09	4219 1128		0.936 8616	1499	49	2943 1315		2533 1739	
			7117 1504				2943 1320		4746
0.810	5351 1136		5613 1509		0.850	4263 1326		0787 1753	
11	6487 1140		4104 1514		51	5589 1333		0.929 9034 1761	
12	7627 1144		2590 1519		52	6922 1338		7273 1768	
13	8771 1147		1071 1524		53	8260 1344		5505 1776	
14	9918 1152		0.935 9547	1530	54	9604 1350		3729 1783	
15	1.047 1070	1156	8017 1535		55	1.052 0954		1946 1791	
16	2226 1160		6482 1540		56	2310 1362		0155 1799	
17	3386 1165		4942 1546		57	3672 1368		0.928 8356 1807	
18	4551 1168		3396 1551		58	5040 1375		6549 1815	
19	5719 1173		1845 1557		59	6415 1381		4734 1823	
0.820	6892 1177		0288 1562		0.860	7796 1387		2911 1831	
21	8069 1182		0.934 8726	1567	61	9183 1394		1080 1839	
22	9251 1186		7159 1574		62	1.053 0577		0.927 9241 1848	
23	1.048 0437	1190	5585 1579		63	1977 1400		7393 1856	
24	1627 1195		4006 1585		64	3384 1407		5537 1864	
25	2822 1199		2421 1591		65	4798 1414		3673 1873	
26	4021 1204		0830 1596		66	6218 1420		1800 1882	
27	5225 1208		0.933 9234	1602	67	7645 1427		0.926 9918 1891	
28	6433 1213		7632 1608		68	9080 1435		8027 1899	
29	7646 1218		6024 1614		69	1.054 0521		6128 1909	
0.830	8864 1222		4410 1621		0.870	1968 1455		4219 1918	
31	1.049 0086	1227	2789 1626		71	3423 1462		2301 1927	
32	1313 1232		1163 1632		72	4885 1469		0374 1937	
33	2545 1236		0.932 9531	1638	73	6354 1477		0.925 8437 1946	
34	3781 1242		7893 1645		74	7831 1484		6491 1956	
35	5022 1247		6248 1651		75	9345 1492		4535 1965	
36	6269 1252		4597 1657		76	1.055 0807		2570 1975	
37	7521 1256		2940 1664		77	2306 1499		0595 1985	
38	8777 1261		1276 1670		75	3843 1507		0.924 8610 1995	
39	1.050 0038	1267	0.931 9606	1677	79	5328 1515		6615 2005	
0.840	1305		7929		0.880	6851		4610	

$x$	$F_{\omega}$	$Diff.$	$F_{\eta}$	$Diff.$	$x$	$F_{\omega}$	$Diff.$	$F_{\eta}$	$Diff.$
0.880	1.055 6854	+	0.924 4610	—	0.920	1.062 5859	+	0.915 4095	—
81	8383	1532	2594	2016	21	7835	1976	1514	2584
82	9923	1540	0568	2026	22	9827	1992	2602	
83	1.056 1471	1548	0.923 8531	2037	23	1.063 1836	2009	0.914 8909	2623
84	3027	1556	6484	2047	24	3861	2025	6286	2644
85	4592	1565	4425	2059	25	5902	2041	3642	2666
86	6166	1574	2356	2069	26	7959	2057	0976	2687
87	7749	1583	0276	2080	27	1.064 0034	2075	0.913 8289	2709
88	9340	1591	0.922 8184	2092	28	2126	2092	5580	2730
89	1.057 0941	1601	6080	2104	29	4236	2140	2850	2752
		1609		2115			2128	0098	2774
0.890	2550	1619	3965	2127	0.930	6364	2147	0.912 7324	2799
91	4169	1628	4838	2139	31	8511	2166	4525	2824
92	5797	1638	0.921 9699	2151	32	1.065 0677	2185	1701	2849
93	7435	1647	7548	2164	33	2862	2206	0.911 8852	2875
94	9082	1657	5384	2176	34	5068	2225	5977	2900
95	1.058 0739	1668	3208	2189	35	7293	2247	3077	2926
96	2407	1677	4019	2202	36	9540	2268	0151	2954
97	4084	1688	0.920 8817	2215	37	1.066 1808	2289	0.910 7197	2981
98	5772	1698	6602	2228	38	4097	2313	4216	3011
99	7470	1708	4374	2241	39	6410	2335	1205	3040
0.900	9178	1720	2133	2255	0.940	8745	2359	0.909 8165	3070
01	1.059 0898	1730	0.919 9878	2270	41	1.067 1104	2383	5095	3401
02	2628	1741	7608	2284	42	3487	2408	1994	3432
03	4369	1753	5324	2298	43	5895	2434	0.908 8862	3465
04	6122	1764	3026	2313	44	8329	2460	5697	3499
05	7886	1776	0743	2327	45	1.068 0789	2487	2498	3232
06	9662	1788	0.918 8386	2342	46	3276	2514	0.907 9266	3268
07	1.060 1450	1799	6044	2358	47	5790	2544	5998	3304
08	3249	1812	3686	2374	48	8334	2572	2694	3341
09	5061	1824	4342	2389	49	1.069 0906	2603	0.906 9353	3380
0.910	6885	1837	0.917 8923	2405	0.950	3509	2634	5973	3420
11	8722	1849	6518	2422	51	6143	2667	2553	3461
12	1.061 0574	1863	4096	2439	52	8810	2699	0.905 9092	3504
13	2434	1876	1657	2455	53	1.070 1509	2734	5588	3547
14	4310	1889	0.916 9202	2472	54	4243	2770	2041	3592
15	6199	1903	6730	2491	55	7013	2807	0.904 8449	3638
16	8102	1917	4239	2509	56	9820	2844	4811	3686
17	1.062 0019	1932	1730	2526	57	1.071 2664	2884	4125	3736
18	1951	1946	0.915 9204	2545	58	5548	2924	0.903 7389	3788
19	3897	1962	6659	2564	59	8472	2967	3601	3842
0.020	5859		4095		0.960	1.072 1439		0.902 9759	

$x$	$F_{\omega}$	$Diff.$	$F_{\eta}$	$Diff.$	$x$	$F_{\omega}$	$Diff.$	$F_{\eta}$	$Diff.$
0.960	1.072 1439	+	0.902 9759	-	0.980	1.079 3332	+	0.893 6990	-
61	4449	3010	5861	3898	81	7852	4520	1178	5812
62	7505	3056	1906	3955	82	1.080 2509	4657	0.892 5194	5984
63	1.073 0609	3104	0.901 7890	4016	83	7315	4806	0.891 9023	6171
64	3763	3154	3810	4080	84	1.081 2282	4967	2648	6375
65	6968	3205	0.900 9666	4144	85	7425	5143	0.890 6047	6601
66	1.074 0228	3260	5453	4213	86	1.082 2763	5338	0.889 9200	6847
67	3543	3315	4168	4285	87	8316	5553	2080	7120
68	6917	3374	0.899 6809	4359	88	1.083 4112	5796	0.888 4654	7426
69	1.075 0353	3436	2373	4436	89	1.084 0182	6070	0.887 6881	7773
		3500	4520			6380			8167
0.970	3853	3569	0.898 7853	4605	0.990	1.084 6562	6741	0.886 8714	8622
71	7422	3641	3248	4697	91	1.085 3303	7164	0092	9158
72	1.076 1063	3716	0.897 8551	4792	92	1.086 0467	7668	0.885 0934	9796
73	4779	3796	3759	4894	93	1.086 8135	8288	0.884 4138	10579
74	8575	3881	0.896 8865	5002	94	1.087 6423	9069	0.883 0559	11568
75	1.077 2456	3974	3863	5116	95	1.088 5492	10103	0.881 8991	12873
76	6427	4066	0.895 8747	5236	96	1.089 5595	11559	0.880 6418	14712
77	1.078 0493	4168	3541	5365	97	1.090 7154	13836	0.879 1406	17595
78	4661	4277	0.894 8146	5504	98	1.092 0990	18244	0.877 3841	23165
79	8938	4394	2642	5652	99	1.093 9234	45073	0.875 0646	57065
0.980	1.079 3332		0.893 6990		1.000	1.098 4307		0.869 3581	

— • —