Contribution à la flore cryptogamique du Maroc

Autor(en): **Amann, J.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles**

Band (Jahr): **57 (1929-1932)**

Heft 224

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-284166

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Contribution à la Flore cryptogamique du Maroc

PAR

J. AMANN

Les mousses, récoltées en 1926 par mon ami le prof. P. Jaccard-Zurich, ont été déterminées par moi; les lichens, provenant des bords du Bou Regreb, près Rabat (leg. P. Jaccard, 2 IV 25), ont été déterminés par M. Bouly de Lesdains.

I. Mousses.

Hymenostomum tortile (Schwägr.), st. Djebel Habid.

Weisia crispata Br. germ. Zerekten, Haut-Atlas, 1400 m. env.

Ceratodon corsicus Schimp. st. Guédrouz, Haut-Atlas, 1600 m. env.

Aloina aloides Koch, st. Col de Tisrarin, 400 m.

Trichostomum flavovirens Bruch. Guédrouz, Haut-Atlas. 2000 m.

Crossidium squamiferum (Viv.) Guédrouz, 1600 m. Route de Sidi Maïn, 30 m.

Tortula revolvens Schimp. Col de Tisrarin.

Syntrichia inermis (Brid.). Guédrouz, Haut-Atlas, 1500 et 2000 m.

Pleurochæte squarrosa (Brid.). Zerekten, Haut-Atlas, 1400 m.

Grimmia trichophylla Grev. même localité.

G. pulvinata Sm. Guédrouz, 1500 et 2000 m.

Orthotrichum Sturmii Horn. même localité, 1500 m. Forme sans cils, les dents avec un prépéristome représenté par des plaques extérieures irrégulièrement épaissies.

Philonotis rigida (Brid.). Guédrouz, 1600 m.

II. Lichens.

Anaptychia ciliaris Kbr.
Diploschistes ocellatus (Vill).
Leptogium lacerum (Ach.).
Squamaria crassa Nyl. et var. *deserti* Hue.
S. fulgens Tul.
Xanthoria parietina (L).