

# Diagnoses latines

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera**

Band (Jahr): **10 (1945)**

Heft 3

PDF erstellt am: **28.05.2024**

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Diagnoses latines

### **Pseudoplectania nigrella** var. **Episphagnum** J. Favre, p. 30.

A typo differt minore statura; stipite curto, crasso; receptaculo minus expanso, frequenter urceolato. Inter Sphagna.

### **Rhodophyllus tenellus** J. Favre, p. 56.

*Pileo* (7—14 mm) convexo, papillato, pellucido-striato, glabro, griseo-fusco; margine excedenti. *Lamellis* ventricosis, parum stipatis (7—17), late vel profunde emarginatis vel subliberis, pallide incarnato-fuscidulis. *Stipite* usque ad 36 mm  $\times$  1,3 mm, fuscidulo, apice pruinoso-hispido. *Sporis* ellipticis, obtuse angulatis (11—12,5  $\times$  6—7,5  $\mu$ ). *Pilis apicis stipitis*, longis, gracilibus, capitatis. — In turfosis paludibus vel circa rivulos.

### **Rhodophyllus undatus** var. **odorus** J. Favre, p. 58.

A typo differt odore farinaceo-rancido.

### **Omphalia cincta** J. Favre, p. 64.

*Pileo* ad usque 12 mm lato, pallide ochraceo, convexo-hemisphaerico, papilla acuta praedita. *Lamellis* albis, latis, parum stipatis (12—18), arcuatis et longe decurrentibus. *Stipite* usque ad 4 cm  $\times$  2,5 mm, albo, sed in media vel supra parte pallide ochraceo. *Sporis* ellipsoideis (6—7  $\times$  3,5—4,5  $\mu$ ). — Inter Sphagna.

### **Rhodopaxillus densifolius** J. Favre, p. 76.

*Pileo* ad usque 7 cm lato, primitus convexo, margine involuto, demum subinfudibuliformi; ab initio villo albo tenuissimo et arcte adpresso sericeo, postea incarnato-alutaceo, demum albo. *Lamellis* ex albis alutaceo-fulvescentibus, tenuibus, confertis, angustis, postremo forte decurrentibus. *Stipite* usque ad 5 cm  $\times$  8 mm, pleno, ex albo-fibrilloso, pallide alutaceo-incarnato. *Carne* primitus alutacea-incarnata, dein albescit; odore ingrato. *Sporis* acervatim sordide cremeo-incarnato, non amyloideis, ellipsoideis (4—4,5  $\times$  2,5—3  $\mu$ ), subtiliter echinulato-verrucosis. — Sub coniferis, inter Vaccinia.

### **Mycena flavoalba** var. **amara** J. Favre, p. 93.

A typo differt sapore amaro.

**Fayodia bisphærigera** var. **anthracobia** J. Favre, p. 99.

A typo differt statura minore; pileo obscuriore, fuligineo; sporis minoribus, hyphis sine fibulis.

**Fayodia bisphærigera** var. **longicystis** J. Favre, p. 99.

A typo differt non modo cystidiis longissimis, sed carpophore tardius lutescenti.

**Pluteus granulatus** var. **tenellus** J. Favre, p. 101.

A typo differt statura minore, gracili; pileo non pellucido-striato; stipite pleno, sporis minoribus.

**Cortinarius betulinus** J. Favre, p. 106.

*Pileo* usque ad 5 cm lato, umbone obtuso parum prominente, viscosissimo, primitus pallide lilaceo, centro excepto, demum pallide ochraceo. *Lamellis* usque ad 7 mm latis, parum stipatis (24—32): ab initio pallide lilaceis, dein ochraceo-fulvidulis. *Stipite* usque ad 8 cm longo, apice 5,5 mm lato, base 13 mm, pleno, viscoso, primitus pallide lilacino, dein pallide flavo-ochraceo. *Cortina* lilacina. *Carne* lilacina, dein pallide ochracea. *Sporis* breve ellipsoideis vel subsphaeroidalibus (8—9,5 × 6,5—7,5  $\mu$ ), verrucosis. — In paludosis betuletis.

**Cortinarius pulchripes** J. Favre, p. 114.

*Pileo* usque ad 3 cm lato, convexo-plano, umbone prominenti, fuligineo; margine membranaceo, araneo-fibrilloso. *Lamellis* in principio luteo-cinnamomeis, non lilacinis, dein pallide cinnamomeis, parum stipatis, satis ventricosis. *Stipite* æquo, gracili, usque ad 6 cm × 4 mm, flexuoso, purpureo-vinaceo vel purpureo-lilacino, dein fusco-purpuraceo. *Cortina* albida. *Carne* in pileo fuliginea, in stipite purpureo-vinacea, dein fusco-purpurea. *Sporis* ellipticis (7,5—9 × 4,3—5  $\mu$ ) subtile verrucosis. — Sub Salice et Alno, in turfosis paludibus.

**Cortinarius speciosus** J. Favre, p. 117.

*Pileo* usque ad 7,5 cm lato, conico-convexo, umbone crasso, acuto praedito, flocoso-squamuloso, aurantiaco-fulvo. *Lamellis* latissimis, usque ad 14 mm latis, crassis, parum stipatis, profunde emarginatis, crocato-cinnamomeis. *Stipite* usque ad 12 cm × 14 mm, subæquo; pileo concolori, sed deorsum pallidiore, fibrilloso. *Cortina* fulvo-aurantiaca. *Carne* croceo-fulva, odore raphanoidea. *Sporis* breve ellipsoideis vel sphæroidalibus (9—12 × 6,5—9  $\mu$ ), satis verrucosis. — In piceetis et pinetis, in turfosis paludibus.

**Cortinarius striæpilus** J. Favre, p. 119.

*Pileo* usque ad 2,5 cm lato, convexo, acute umbonato, dein expanso demumque circa umbonem depresso, udo forte pellucido-striato, fusco-rufescenti, umbone obscuriore, dein, in statu sicco, exstrio, pallidiore;

margine fibrilloso, submembranaceo, fissili. *Lamellis* usque ad 4 mm latis, emarginatis et dente decurrentibus, satis confertis, pallide cinnamomeis. *Stipite* usque ad 7 cm  $\times$  5 mm, pleno, æquo, flexuoso, primo fibrilloso-sericeo, albido, dein sursum pallide fusco, ad basim obscure fusco, annulo manifesto, albido. *Carne* concolori. *Sporis* ellipsoideis vel subamygdaloidibus (7,5—9,5  $\times$  4,7—5,5  $\mu$ ), subtile verrucosis. — In piceetis et pinetis, in turfosis paludibus.

**Cortinarius validus** J. Favre, p. 120.

*Pileo* usque ad 12,5 cm lato, valde carnosus, convexo, convexo-plano, viscosissimo, centro fusco-rufo, ad marginem pallide fusco-lutescenti. *Lamellis* confertis, angustis (usque ad 7 mm latis), sat tenuibus, in acie sinuato-serratis, primitus pallide argilaceis, dein alutaceo-ochraceis, demum fusco-cinnamomeis. *Stipite* valido, solido, clavato-bulboso, usque ad 11 cm  $\times$  23 mm et ad basim 35 mm, sursum albo, deorsum pallide luteo-fusco, primitus forte floccoso-squamoso, dein fibrilloso. *Cortina* pallide ochraceo-alutacea. *Carne* in pileo pallide luteo-fusca, in stipite alba, dein pallide luteo-fusca, odore ingrato. *Sporis* ellipticis (9—10  $\times$  5,5—6  $\mu$ ), subtile verrucosis vel sublævibus. — In piceetis et pinetis, inter Vaccinia.

**Hebeloma helodes** J. Favre, p. 122.

*Pileo* ad usque 3 cm lato, convexo, dein expanso, demum depresso, umbone nullo vel subnullo, viscoso, argillaceo sed centro pallide fuligineo infecto, margine sulcato et subtile araneoso-floccoso. *Lamellis* angustis, usque ad 2,8 mm latis tenuibus, sat confertis (33—41), albido-alutaceis, dein alutaceo-fuscis, plorantibus. *Stipite* subæquo, usque ad 6 cm  $\times$  3,5—5 mm, fere ubique pruinoso-flocculosus, fusco-albido. *Carne* albida, in stipite pallide fusca, non amara. *Sporis* amygdaloidibus (8—11  $\times$  5,5—5  $\mu$ ). *Pilis lamellarum marginis* longis, gracilis, sursum capitatis. — In turfosis paludibus.

**Alnicola scolecina** var. **fellea** J. Favre, p. 133.

A typo differt statura robustiore, stipite deorsum attenuato, carne amara. In turfosis paludibus, sub Betula, Pino.

**Naucoria Centunculus** var. **lævigata** J. Favre, p. 138.

A typo differt statura minore, colore fusco, non autem olivaceo; stipite pileoque glabris; hyphis cutis pileis lævibus, incoloribus; habitatione supra folia putrida Caricis, in turfosis paludibus.

**Naucoria saliciphila** J. Favre, p. 146.

*Pileo* usque ad 7 mm lato, obtuse conico-convexo, sulcato, rufo-alutaceo, udo pellucido-striato, in statu sicco exstrio, fere albido, margine sinuoso. *Lamellis* latis, distantibus (10—13), ochraceo-alutaceis, parum emarginatis sed dente decurrentibus. *Stipite* flexuoso, concolori.

*Sporis* amygdaloidibus (10—12  $\times$  6—7  $\mu$ ), pallide ochraceis. *Pilis marginum* tereto-vermiformibus (38—60  $\times$  4,5—9  $\mu$ ). — Supra Salicis folia putrida, in paludosis locis.

**Psathyrella typhæ** var. **sulcato-tuberculosa** J. Favre, p. 152.

A typo differt margine pilei sulcato-tuberculoso, sporis minoribus (7,5—10  $\times$  4—5  $\mu$ ).

**Coprinus Melo** J. Favre, p. 154.

*Pileo* usque ad 6 mm alto, 7,5 mm lato, subhemisphærico-truncato, crasse costato, albo, dein griseo-brunneo, tenuissime araneo-fibrilloso. *Lamellis* confertissimis, latissimis, albis dein griseo-brunneis, non nigris. *Stipite* usque ad 16 mm  $\times$  1 mm, deorsum dilatato, albo, tenuissime araneo-fibrilloso, dein glabro. *Sporis* ellipsoideis, subamygdaloidibus (8—9—9,5  $\times$  5—6,2  $\mu$ ), non opacis, sed pallide fuliginoso-fuscis. *Hyphis superficialibus* pilei coralloideis. — In Caricibus, in turfosis locis.