Gleichschenklige Teildreiecke im regelmässigen Vieleck

Autor(en): **Francke, Dietrich**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Elemente der Mathematik**

Band (Jahr): **66 (2011)**

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-283503

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Elem. Math. 66 (2011) 155 – 163
0013-6018/11/040155-9
DOI 10.4171/EM/184

© Swiss Mathematical Society, 2011

Elemente der Mathematik

Gleichschenklige Teildreiecke im regelmäßigen Vieleck

Dietrich Francke

Dietrich Francke hat an der TU Dresden ein Diplom-Ingenieurstudium in Elektrotechnik absolviert und war später als Leiter einer Entwicklungsabteilung für elektronische Spezialmeßgeräte tätig.

Einleitung

Die im folgenden beschriebene elementare Eigenschaft der Diagonalendreiecke im regelmäßigen Vieleck wurde im Jahr 2005 bei Untersuchungen der n komplexen Einheitswurzeln z_k der Kreisteilungsgleichung $z^n - 1 = 0$ und der goniometrischen und algebraischen Bestimmungsgleichungen für regelmäßige Vielecke gefunden. Weitgehende Recherchen hierzu erbrachten nur wenige spezielle Literaturstellen [1, S. 203], [2, S. 63, Fig. 4.6c, (4.6. Regular, impossible tesselations)].

Regelmäßige Vielecke mit ungerader Eckenzahl n bzw. mit gerader Eckenzahl n' seien in Diagonalendreiecke zerlegt, die von je zwei der von derselben Ecke des Vielecks ausgehenden Haupt- bzw. Nebendiagonalen und jeweils einer Seite a des regelmäßigen Vielecks gebildet sind und deren Spitzen daher auf dieser Ecke des Vielecks liegen. Nach dem Peripheriewinkelsatz sind ihre Spitzenwinkel $\alpha = \pi/n$ bzw. $\alpha = \pi/n'$ gleich groß.

Diese Haupt- bzw. Nebendiagonalendreiecke lassen sich ihrerseits in jeweils eine Aneinanderreihung von gleichschenkligen Teildreiecken mit der Schenkellänge a zerlegen. Dieser Sachverhalt ermöglicht es, das bzw. die Hauptdiagonalendreiecke darzustellen und

Ein Hauptdiagonalendreieck ABC in einem regelmäßigen Vieleck ungerader Eckenzahl wird von den beiden gleichlangen Hauptdiagonalen AB und AC, die von der Ecke A ausgehen, und von der A gegenüberliegenden Seite $BC = a$ des Vielecks gebildet. In dem nachfolgenden Beitrag zeigt der Autor, wie sich das Hauptdiagonalendreieck ausgehend von der Spitze A vollständig in aneinandergereihte gleichschenklige Dreiecke zerlegen lässt, deren Schenkel gleichlang wie die Seite a sind. Dieser geometrische Sachverhalt lässt sich durch ein stabiles Stabwerk modellieren, das aus einem Stellwinkel und untereinander gelenkig verbundenen Stücken gleicher Länge a besteht, die zusätzlich auf dessen Schenkeln parallelverschiebbar gelagert sind.

weiter von diesen ausgehend das ganze regelmäßige Vieleck elementar, also mittels Zirkel und Lineal zu konstruieren.

Nach den Gaußschen Kriterien läßt sich nur eine kleine Auswahl regelmäßiger Vielecke ausschließlich mit Zirkel und Lineal konstruieren, während bei den folgenden Betrachtungen für die Eckenzahlen n bzw. n' der regelmäßigen Vielecke keine Einschränkungen gelten sollen.

1 Das Hauptdiagonalendreieck im regelmäßigen Vieleck mit ungerader Eckenzahl n

Das Hauptdiagonalendreieck ABC in einem regelmäßigen Vieleck mit einer ungeraden Eckenzahl n wird von den beiden gleichlangen Hauptdiagonalen AB und AC, die von einer Ecke A des Vielecks ausgehen, und von der dieser Ecke A gegenüberliegenden Seite $BC = a$ des regelmäßigen Vielecks gebildet (Abb. 1).



Abb. 1 Gleichschenkliges Dreieck mit ganzzahligem Basis-/Spitzenwinkel-Verhältnis $m = 5$ und der Basis a, zugleich das Hauptdiagonalendreieck ABC über einer Seite a eines regelmäßigen Vielecks mit ungerader Eckenzahl $n = 2m + 1 = 11$, zerlegt in m Teildreiecke $\triangle 1$ bis $\triangle m$ mit gleicher Schenkellänge a, $\alpha = \pi/n = \pi/11$, $\beta = \gamma = m\alpha = 5\alpha$.

Da das Hauptdiagonalendreieck ABC demnach gleichschenklig ist, sind die Basiswinkel β und γ gleich groß.

Wie man leicht errechnen kann, führt die Winkelsumme in dem gleichschenkligen Hauptdiagonalendreieck $\alpha + 2\beta = \alpha + 2\gamma = \pi$ mit dem Spitzenwinkel $\alpha = \pi/n$ zu dem

Basis-Spitzenwinkel-Verhältnis

$$m = \beta/\alpha = \gamma/\alpha = (n-1)/2. \tag{1}$$

Wegen der Ungeradzahligkeit der Eckenzahl n ist der Ausdruck $(n-1)/2$ ganzzahlig, d.h., die Basiswinkel β und γ sind ganzzahlige Vielfache $m = (n-1)/2$ des Spitzenwinkels α.

Wendet man den Außenwinkelsatz auf die Folge der gleichschenkligen Teildreiecke $\triangle 1$ bis $\triangle m$ an (s. Abb. 1), so beträgt der Außenwinkel α_1 des 1. Teildreiecks $2 \cdot \alpha$, der zugleich der Basiswinkel β_2 des 2. Teildreiecks ist, usw. Durch vollständige Induktion läßt sich zeigen, daß der Basiswinkel β_k des k-ten Teildreiecks $\triangle k$ gleich $2 \cdot (k-1)\alpha - (k-2)\alpha = k\alpha$ und somit der Basiswinkel β_m des letzten Teildreiecks $\triangle m$ gleich $m\alpha$ ist.

Der Basiswinkel $\beta_m = m\alpha$ des m-ten Teildreiecks $\triangle m$ stimmt nach (1) mit dem Basiswinkel $\beta = m\alpha$ bzw. $\gamma = m\alpha$ des ganzen Hauptdiagonalendreiecks ABC überein, womit nachgewiesen ist, daß sich das Hauptdiagonalendreieck in einem regelmäßigen Vieleck mit ungerader Eckenzahl n vollständig in m aneinandergereihte gleichschenklige Teildreiecke $\triangle k$, $k = 1, \ldots, m$, zerlegen läßt, deren Schenkel gleich lang wie die Basis a des Hauptdiagonalendreiecks und damit gleich lang wie eine Seite a des regelmäßigen Vielecks sind.

2 Das Hauptdiagonalendreieck im regelmäßigen Vieleck mit gerader Eckenzahl n'

Das Hauptdiagonalendreieck ABC in einem regelmäßigen Vieleck mit einer geraden Eckenzahl n' wird von der Hauptdiagonalen AB und einer der beiden benachbarten gleichlangen Nebendiagonalen AC, die von einer Ecke A des Vielecks ausgehen, und von der dieser Ecke A gegenüberliegenden Seite $BC = a$ des regelmäßigen Vielecks gebildet (Abb. 2).

Da die Hauptdiagonale AB ein Durchmesser des Umkreises des regelmäßigen Vielecks ist, ist nach dem Satz des Thales das Hauptdiagonalendreieck ABC rechtwinklig, d.h. $\gamma = \pi/2$.

Wie leicht zu errechnen ist, ist der Spitzenwinkel $\alpha = \pi/n'$ und somit das Katheten-Hypotenusenwinkel-Verhältnis

$$m = \beta/\alpha = n'/2 - 1. \tag{2}$$

Wegen der Geradzahligkeit der Eckenzahl n' ist der Ausdruck $n'/2 - 1$ ganzzahlig, d.h., der Katheten-Hypotenusenwinkel β ist ein ganzzahliges Vielfaches $m = n'/2 - 1$ des Spitzenwinkels α.

Es soll hergeleitet werden, daß auch im regelmäßigen Vieleck mit gerader Eckenzahl n' jedes Hauptdiagonalendreieck ABC vollständig in m aneinandergereihte gleichschenklige Teildreiecke $\triangle 1$ bis $\triangle m$ mit einer einheitlichen Schenkellänge a zerlegt werden kann, die der Kathete a des ganzen Hauptdiagonalendreiecks ABC und damit zugleich einer Seite a des regelmäßigen Vielecks entspricht.

Wendet man den Außenwinkelsatz auf die Folge der gleichschenkligen Teildreiecke $\triangle 1$ bis $\triangle m$ an, so ist der Basiswinkel β_k des k-ten Teildreiecks $\triangle k$ gleich $k\alpha$ und der Basiswinkel β_m des letzten Teildreiecks $\triangle m$ gleich $m\alpha$.



Abb. 2 Rechtwinkliges Dreieck mit ganzzahligem Katheten-Hypotenusenwinkel-Verhältnis $m = 5$ und der Basis a, zugleich ein Hauptdiagonalendreieck ABC über einer Seite a eines regelmäßigen Vielecks mit gerader Eckenzahl $n' = 2(m+1) = 12$, zerlegt in m Teildreiecke $\triangle 1$ bis $\triangle m$ mit gleicher Schenkellänge a, $\alpha = \pi/n' = \pi/12$, $\beta = m\alpha = 5\alpha$, $\gamma = \pi/2$.

Der Basiswinkel $\beta_m = m\alpha$ des m-ten Teildreiecks $\triangle m$ stimmt nach (2) mit dem Katheten-Hypotenusenwinkel $\beta = m\alpha$ des ganzen Hauptdiagonalendreiecks ABC überein, womit nachgewiesen ist, daß sich ein Hauptdiagonalendreieck in einem regelmäßigen Vieleck mit gerader Eckenzahl n' vollständig in m aneinandergereihte gleichschenklige Teildreiecke $\triangle k$, $k = 1, \ldots, m$, zerlegen läßt, deren Schenkel gleich lang wie die Kathete a des Hauptdiagonalendreiecks und damit gleich lang wie eine Seite a des regelmäßigen Vielecks sind.

3 Die konstruktive Darstellung eines Hauptdiagonalendreiecks für ein regelmäßiges Vieleck mit ungerader Eckenzahl n

Das Ergebnis von Abschnitt 1, demzufolge ein Hauptdiagonalendreieck in eine bestimmte Anzahl von gleichschenkligen Teildreiecken mit gegebener Schenkellänge a zerlegt werden kann, soll daher zu einer konstruktiven Darstellung benutzt werden.

Das Hauptdiagonalendreieck ABC für ein regelmäßiges Vieleck mit ungerader Eckenzahl n, das wegen seiner Gleichschenkligkeit symmetrisch ist, soll in zwei zur Symmetrieachse spiegelbildliche Aneinanderreihungen von je m gleichschenkligen Teildreiecken mit der Schenkellänge a zerlegt werden (Abb. 3).



Abb. 3 Darstellung des Hauptdiagonalendreiecks ABC für ein regelmäßiges Vieleck mit der ungeraden Eckenzahl $n = 9$ als Stabwerk aus den im Eckpunkt A drehbar verbundenen Schenkeln b und c eines Stellwinkels α und aus $n = 9$ gelenkig und parallelverschiebbar verbundenen Distanzstücken von der gleichen Länge a. ◯ und □ = Gelenkpunkte zwischen den Distanzstücken gleicher Länge a. □ = außerdem auf den Schenkeln b und c parallelgeführte Gelenkpunkte ◯.

Da benachbarte Teildreiecke jeweils einen gemeinsamen Schenkel der Länge a besitzen, ist die Gesamtzahl dieser Teildreiecksschenkel gleich der Anzahl der Teildreiecke $2m$, zuzüglich eines gemeinsamen Schenkels der m-ten Teildreiecke, also gleich $2m + 1$; sie ist damit gleich der Eckenzahl $n = 2m+1$. Die n Seiten des ganzen regelmäßigen Vielecks entstehen durch Parallelverschiebung dieser n Teildreiecksschenkel.

In Abb. 4 ist das Funktionsmodell eines Stabwerkes für das zu einem regelmäßigen Vieleck mit der ungeraden Eckenzahl $n = 11$ gehörende Hauptdiagonalendreieck dargestellt.

4 Die konstruktive Darstellung von Hauptdiagonalendreiecken für ein regelmäßiges Vieleck mit gerader Eckenzahl n'

Das Ergebnis von Abschnitt 2, demzufolge ein Hauptdiagonalendreieck in eine bestimmte Anzahl von gleichschenkligen Teildreiecken mit gegebener Schenkellänge a zerlegt werden kann, soll daher zu einer konstruktiven Darstellung benutzt werden.

Das Hauptdiagonalendreieck ABC für ein regelmäßiges Vieleck mit gerader Eckenzahl n', das wegen seiner Rechtwinkligkeit unsymmetrisch ist, wird durch das spiegelbildliche und daher ebenfalls rechtwinklige Dreieck $AB'C$ zu einem gleichschenkligen und daher symmetrischen Dreieck ABB' ergänzt, dessen Basis die Länge $2a$ hat. Ähnliche



Abb. 4 Funktionsmodell eines Stabwerkes für das zu einem regelmäßigen Vieleck mit der ungeraden Eckenzahl $n = 11$ gehörende Hauptdiagonalendreieck, bestehend aus einem gleichschenkligen Stellwinkel α und n mit dessen Schenkeln und untereinander gelenkig verbundenen und zusätzlich parallelverschiebbar gelagerten Distanzstücken der Länge a.

Überlegungen wie in Abschnitt 3 führen nun zu Zerlegungen dieser beiden Hauptdiagonalendreiecke ABC und $AB'C$ in zwei spiegelbildliche Aneinanderreihungen von je m gleichschenkligen Teildreiecken mit der Schenkellänge a (Abb. 5).

Da benachbarte Teildreiecke jeweils einen gemeinsamen Schenkel der Länge a besitzen, ist die Gesamtzahl dieser Teildreiecksschenkel gleich der Anzahl der Teildreiecke $2m + 2$ bei geradzahligem m bzw. $2m + 1$ bei ungeradzahligem m, wegen des dabei entstehenden gemeinsamen Schenkels der ersten beiden Teildreiecke. Die n' Seiten des ganzen regelmäßigen Vielecks entstehen durch Parallelverschiebung dieser n' bzw. $n' - 1$ Teildreiecksschenkel.

5 Die Zerlegbarkeit eines regelmäßigen Vielecks in ein Netz aus Rhomben gleicher Seitenlänge a

In ein regelmäßiges Vieleck mit einer ungeraden oder geraden Eckenzahl n bzw. n' seien von einer Ecke A aus alle Haupt- und Nebendiagonalen eingetragen, so daß das Vieleck in $n - 2$ bzw. $n' - 2$ Diagonalendreiecke mit dem gleichen Spitzenwinkel $\alpha = \pi/n$ bzw. $\alpha = \pi/n'$ zerlegt ist, die aus je zwei benachbarten Diagonalen und einer Seite a des Vielecks bestehen.

Aus Abb. 6 bzw. Abb. 7 ist zu ersehen, daß sich ein regelmäßiges Vieleck vollständig in Teildreiecke $\triangle ki, k = 1, \ldots, m - i, i = 0, \ldots, m - 1$, zerlegen läßt und die spiegelbildlichen Teildreiecke $\triangle k$ sich paarweise zu Rhomben mit der Seitenlänge a ergänzen lassen, so daß das Vieleck, ausgehend von seinem gleichschenkligen Hauptdiagonalendreieck ABC bzw. von seinen rechtwinkligen Hauptdiagonalendreiecken ABC und ABC', sich auch in ein Netz aus zusammenhängenden Rhomben zerlegen läßt (Abb. 8).



Abb. 5 Darstellung der spiegelbildlichen Hauptdiagonalendreiecke ABC und $AB'C$ für ein regelmäßiges Vieleck mit der geraden Eckenzahl $n' = 12$ als Stabwerk aus den im Eckpunkt A drehbar verbundenen Schenkeln b, c und c' eines Stellwinkels 2α und aus 9 gelenkig und parallelgeführt verbundenen Stäben der Länge a und einem Stab der Länge $2a$. ○ und □ = Gelenkpunkte zwischen den Distanzstücken der Längen a und $2a$. □ = außerdem auf den Schenkeln b, c und c' parallelgeführte Gelenkpunkte ○.



Abb. 6 Zerlegung eines regelmäßigen Vielecks mit der ungeraden Eckenzahl $n = 7$, $m = 3$, und der Seitenlänge a in $n-2$ Diagonalendreiecke $i = 0, \ldots, m-1$, und diese wiederum in gleichschenklige Teildreiecke $\triangle k$, $k = 1, \ldots, m-i$, die ein Netz aus zusammenhängenden Rhomben von der gleichen Seitenlänge a des Vielecks bilden.



Abb. 7 Zerlegung eines regelmäßigen Vielecks mit der geraden Eckenzahl $n' = 8$, $m = 3$, und der Seitenlänge a in $n' - 2$ Diagonalendreiecke $i = 0, \ldots, m-1$, und diese wiederum in gleichschenklige Teildreiecke $\triangle k$, $k = 1, \ldots, m - i$, die ein Netz aus zusammenhängenden Rhomben von der gleichen Seitenlänge a des Vielecks bilden.



Abb. 8 Funktionsmodell eines Stabwerkes für ein regelmäßiges Vieleck mit der ungeraden Eckenzahl $n = 9$ als ein Netz aus zusammenhängenden Rhomben gleicher Seitenlänge a, wobei die beiden Hauptdiagonalen zur eindeutigen Bestimmung der Regelmäßigkeit des Vielecks durch Parallelführung der zugehörigen Gelenkpunkte notwendig sind.

Dabei liegen gleichliegende Eckpunkte der Rhomben mit gleichem Spitzenwinkel $k \cdot 2\alpha$, $k = 1, \ldots, m$, auf Halbkreisen um die gemeinsame Spitze A der Diagonalendreiecke.

Aus Abb. 8 ist auch zu entnehmen, daß ein nur in Rhomben zerlegtes regelmäßiges Vieleck ohne Zuhilfenahme des bzw. der Hauptdiagonalendreiecke ein instabiles Stabwerk darstellen würde, d.h., es ließe sich zu einem beliebigen unregelmäßigen Vieleck umgestalten.

Literatur

[1] Gericke, H.: *Mathematik in Antike, Orient und Abendland*. Teil I, Matrixverlag, Wiesbaden 2005.

[2] Coxeter, H.S.M.: *Introduction to Geometry*. Wiley Classics Library, 2. Edition 1989.

Dietrich Francke
Salvador-Allende-Str. 13
D-12559 Berlin, Deutschland
e-mail: `dietrich-francke@gmx.de`