

Capture au Tessin de Xylosandrus germanus Blandf. (Coleoptera, Scolytidae)

Autor(en): **Gogniat, Laurent**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin romand d'entomologie**

Band (Jahr): **5 (1987)**

Heft 2

PDF erstellt am: **27.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-986328>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

CAPTURE AU TESSIN DE XYLOSANDRUS GERMANUS BLANDF.
(COLEOPTERA, SCOLYTIDAE).

par Laurent GOGNIAT, Institut de zoologie,
Chantemerle 22, CH-2000 Neuchâtel

Du 20 au 29 juin 1987, lors d'un stage d'entomologie à Camignolo au Tessin, nous avons capturé 3 individus femelles de Xylosandrus germanus.

C'est dans une châtaigneraie au-dessus du village que les captures ont été faites. Deux individus ont été récoltés dans des pièges Barber alors que le troisième se trouvait sur le tronc d'un châtaignier. A noter que cet individu n'avait pas encore creusé son système de galeries.

Cette espèce, d'origine est-asiatique, a été introduite en 1932 sur la côte est des U.S.A. grâce à l'importation de bois provenant du Japon. En 1952, elle s'est établie en Allemagne, dans les environs de Darmstadt, également par du bois d'importation.

Elle a été trouvée pour la première fois en Suisse en 1984 par le Prof. P. Bovey à St. Chrischona dans les environs de Bâle sur un charme. En 1986, une attaque en masse s'est produite sur du hêtre, du chêne et de l'épicéa dans la région de Rheinfelden (Maksymov 1987).

Selon le catalogue des Scolytidae de Suisse (Bovey 1987), cette espèce très polyphage s'est probablement déjà acclimatée dans d'autres régions du nord-est de la Suisse (Schaffhouse, Thurgovie, St-Gall, Zurich).

Selon Maksymov (communication orale), ces captures pourraient être le signe d'un autre foyer d'infestation.

Je remercie M. Maksymov qui a bien voulu contrôler la détermination de ces trois individus.

Bibliographie

Bovey P. 1987. Scolytidae, Platypodidae. Insecta Helvetica,
Catalogus 6. Soc. Ent. suisse, Zurich. 95 p.

Maksymov J.K. 1987. Erstmaliger Massenbefall des schwarzen
Nutzholzborkenkäfer, Xylosandrus germanus Blandf., in
der Schweiz. Schweiz. Z. Forstwes., 138 (1987)
3 : 215-227.