Abstract

Objekttyp: Abstract

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Band (Jahr): 28 (1982)

Heft 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

THE REPRESENTATION THEORY OF *SL*(2, **R**), A NON-INFINITESIMAL APPROACH

by Tom H. Koornwinder

ABSTRACT

The representation theory of $SL(2, \mathbf{R})$ is developed by the use of non-infinitesimal methods. This approach is based on an explicit knowledge of the matrix elements of the principal series with respect to the K-basis. The irreducible subquotient representations of the principal series are determined, and also their Naimark equivalences and unitarizability. All irreducible K-unitary, K-finite representations of $SL(2, \mathbf{R})$ are classified, where an inversion formula for the generalized Abel transform provides an important tool.

1. Introduction

In 1947 two papers appeared on the representation theory of the two prototypes of noncompact semisimple Lie groups, namely by Bargmann [2] on $SL(2, \mathbb{R})$ and by Gelfand & Naimark [18] on $SL(2, \mathbb{C})$. The methods in the two papers are surprisingly different. Bargmann uses the infinitesimal (i.e. Lie algebraic) approach, while Gelfand & Naimark prefer non-infinitesimal (global) methods. In subsequent work to generalize these results for arbitrary noncompact semisimple Lie groups, the Bargmann approach has proved to be most successful, in particular by the work of Harish-Chandra. (However, it is interesting to note Mautner's [31] review of Harish-Chandra's paper [22].)

Without denying the success of the infinitesimal approach, I want to add some motivation for a paper which favours the global approach:

(a) The didactic argument. The global approach is a more natural and direct one and it does not require so much sophisticated functional analysis as the infinitesimal approach.