

7. Centralisers in \$SB_n\$

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **42 (1996)**

Heft 1-2: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **24.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

7. CENTRALISERS IN SB_n

7.1 THEOREM. *For a singular braid $x \in SB_n$ the following are equivalent:*

- (a) $\sigma_j x = x \sigma_k$;
- (b) $\sigma_j^r x = x \sigma_k^r$, for some nonzero integer r ;
- (c) $\sigma_j^r x = x \sigma_k^r$, for every integer r ;
- (d) $\tau_j x = x \tau_k$;
- (e) $\tau_j^r x = x \tau_k^r$, for some nonzero integer r ;
- (f) x has a (possibly singular) (j, k) -band.

Proof. We only show (b) implies (f). The other implications are quite clear. The term “band” will include the possibility of a singular band. Suppose $\sigma_j^r x = x \sigma_k^r$. Then we have that $\sigma_j^{2r} x = x \sigma_k^{2r}$. Assume $x = \beta \tau_i y$, where β is a braid; in other words τ_i is the first singular generator appearing in x . Then we have $\beta^{-1} \sigma_j^{2r} \beta \tau_i y = \tau_i y \sigma_k^{2r}$. Recall that isotopy, or the extended Reidemeister moves for singular braids, do not change the order of singular generators on the same strings. Since $\beta^{-1} \sigma_j^{2r} \beta$ is a pure braid, the τ_i in $\tau_i y \sigma_k^{2r}$ corresponds under some homeomorphism, to the τ_i in $\beta^{-1} \sigma_j^{2r} \beta \tau_i y$. Hence the image, under that homeomorphism, of the trivial singular band near the first τ_i provides a band for $\beta^{-1} \sigma_j^{2r} \beta$. Therefore, τ_i commutes with $\beta^{-1} \sigma_j^{2r} \beta$. It follows that $\tau_i \beta^{-1} \sigma_j^{2r} \beta y = \tau_i y \sigma_k^{2r}$. By Proposition 5.1, we have $\beta^{-1} \sigma_j^{2r} \beta y = y \sigma_k^{2r}$, i.e. $\sigma_j^{2r} \beta y = \beta y \sigma_k^{2r}$. By induction, βy has a (j, k) -band. Since τ_i commutes with $\beta^{-1} \sigma_j^{2r} \beta$, so does σ_i , thus we have $\beta^{-1} \sigma_j^{2r} \beta \sigma_i y = \sigma_i \beta^{-1} \sigma_j^{2r} \beta y = \sigma_i y \sigma_k^{2r}$, i.e. $\sigma_j^{2r} \beta \sigma_i y = \beta \sigma_i y \sigma_k^{2r}$. It follows from induction assumption that $\beta \sigma_i y$ has a (j, k) -band. Since both βy and $\beta \sigma_i y$ have a (j, k) -band, we can use the argument of Lemma 6.4 to conclude that $x = \beta \tau_i y$ has a (j, k) -band. \square

The above theorem allows us to identify monoid centralisers in SB_n . Notice that SB_2 is abelian. On the other hand, for $n \geq 3$, any singular braid with a singularity involving strings labelled, say, j and k , $j < k$, could not possibly commute with τ_k , as any (singular) band from $[k, k+1] \times 0$ to $[k, k+1] \times 1$ would have a forbidden intersection with the j string, see Figure 7. Therefore for $n \geq 3$, only *nonsingular* braids are central. We will conclude with two applications whose proofs, at this point, can safely be left to the reader.

7.2 THEOREM. *The centre of SB_n is all of SB_n for $n = 2$. But in case $n \geq 3$ it is the same as the (infinite cyclic) centre of $B_n \subset SB_n$, generated by Δ^2 .* \square

7.3 THEOREM. *Under the natural inclusion, the centraliser of SB_r in SB_n , $r \leq n$, is generated as a monoid by the generators (see Theorem 4.4) of $C(r, n)$:*

$$\sigma_{r+1}, \sigma_{r+2}, \dots, \sigma_{n-1}, A_{r+1}, \dots, A_n, C,$$

together with their inverses and the singular generators:

$$\begin{aligned} \tau_{r+1}, \dots, \tau_{n-1} & \quad \text{if } r \geq 3, \text{ or} \\ \tau_1, \tau_3, \tau_4, \dots, \tau_{n-1} & \quad \text{if } r = 2. \end{aligned}$$

 \square

REFERENCES

- [Art 1] ARTIN, E. Theorie der Zöpfe. *Abh. Math. Sem. Hamburg Univ.* 4 (1926), 47-72.
- [Art 2] —— Theory of Braids. *Ann. of Math.* (2) 48 (1947), 101-128.
- [Bae] BAEZ, J. Link invariants and perturbation theory. *Lett. Math. Phys.* 2 (1992), 43-51.
- [Bar] BAR-NATAN, D. On the Vassiliev knot invariants. *Topology* 34 (1995), 423-471.
- [Bir1] BIRMAN, J. *Braids, links and mapping class groups*. Ann. Math. Studies 82, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1974.
- [Bir2] —— New points of view in knot theory. *Bull. AMS* 28 (1993), 253-287.
- [Bur] BURDE, G. Über Normalisatoren der Zopfgruppe. *Abh. Math. Sem. Hamburg* 27 (1964), 97-115.
- [BZ] BURDE, G. and H. ZIESCHANG. *Knots*. De Gruyter Studies in Math. 5, New York, 1985.
- [Char1] CHARNEY, R. Artin groups of finite type are biautomatic. *Math. Ann.* 292 (1992), 671-693.
- [Char2] —— Geodesic automation and growth functions for Artin groups of finite type. *Math. Ann.* 301 (1995), 307-324.
- [Chow] CHOW, W.-L. On the algebraical braid group. *Ann. of Math.* (2) 49 (1948), 654-658.
- [ECHLPT] EPSTEIN, D., J. CANNON, D. HOLT, S. LEVY, M. PATERSON and W. THURSTON. *Word processing in groups*. Jones and Bartlett, 1992.
- [FRR] FENN, R., R. RIMÁNYI and C. ROURKE. The braid-permutation group. Preprint (submitted for publication).
- [Gar] GARSIDE, F. The braid group and other groups. *Quart. J. Math. Oxford Ser.* (2) 20 (1969), 235-254.
- [GS] GERSTEN, S. and H. SHORT. Rational subgroups of biautomatic groups. *Ann. Math.* 105 (1991), 641-662.