V. Changement de variable

Objekttyp: Chapter

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Band (Jahr): 42 (1996)

Heft 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

PDF erstellt am: **24.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

V. CHANGEMENT DE VARIABLE

L'objet de cette section est de ramener l'étude de $\dot{u}_{\varepsilon} \in \mathbf{R}^{S_{\varepsilon}}$ qui est solution d'une équation de Schrödinger discrète, à celle d'une fonction harmonique sur S_{ε} , solution d'un problème de Dirichlet. Le point de départ de cette réduction est le

LEMME 1. Soit $\varphi: S_{\varepsilon} \to \mathbf{R}$ une solution d'une équation de Schrödinger discrète du type $(\Delta + V)\varphi = 0$ où $V: S_{\varepsilon} \to \mathbf{R}_+$ et $(\Delta \varphi)(s) = c_s \varphi(s) + \sum_{s' \sim s} c_{ss'} \varphi(s')$, $\forall s \in I_{\varepsilon}$ avec $c_s > 0$, $c_{ss'} < 0$, $c_{ss'} = c_{s's}$ et $\forall s \in I_{\varepsilon}$, $c_s + \sum_{s' \sim s} c_{ss'} = 0$. Soit $\varphi_0: S_{\varepsilon} \to \mathbf{R}^*$ une autre fonction vérifiant $(\Delta + V)\varphi_0 = 0$.

Alors la fonction $\Psi = \phi/\phi_0$ est solution de $\tilde{\Delta}\Psi = 0$, où l'opérateur $\tilde{\Delta}$ est donné par $\tilde{\Delta}\Psi(s) = \tilde{c_s}\Psi(s) + \sum\limits_{s' \sim s} \tilde{c_{ss'}}\Psi(s')$; les coefficients $\tilde{c_s}$ et $\tilde{c_{ss'}}$ vérifient les mêmes propriétés que les c_s et $c_{ss'}$ et sont donnés par: $\tilde{c_{ss'}} = \phi_0(s) \phi_0(s') c_{ss'}$.

Preuve du lemme 1. Elle est élémentaire: sachant que $(\Delta + V)(\varphi_0 \Psi) = 0$, on a $\forall s \in I_{\varepsilon}$,

$$c_s \varphi_0(s) \Psi(s) + \sum_{s' \sim s} c_{ss'} \varphi_0(s') \Psi(s') + V(s) \varphi_0(s) \Psi(s) = 0$$
. (*)

Comme $(\Delta + V) \varphi_0 = 0$, on a

$$c_s \varphi_0(s) + V(s) \varphi_0(s) = -\sum_{s' \sim s} c_{ss'} \varphi_0(s')$$

d'où, en reportant dans (*), $\sum_{s'\sim s}c_{ss'}\phi_0(s')\left[\Psi(s')-\Psi(s)\right]=0$, d'où $\tilde{\Delta}\Psi(s)=0$ avec $\tilde{c}_{ss'}=c_{ss'}\phi_0(s')\phi_0(s)$ et $\tilde{c}_s=-\sum_{s'\sim s}c_{ss'}\phi_0(s')\phi_0(s)$, ce qui prouve le lemme 1.

Pour appliquer ce lemme à $\varphi = \dot{u}_{\varepsilon}$ et à l'opérateur $\Delta_b^{\varepsilon,t} + V$ obtenu à la section III, il faut maintenant construire une solution explicite φ_0 . Voici un procédé général:

LEMME 2. Soit $\mathcal{H}^t_{\epsilon}(\lambda), \lambda \in]-\alpha, \alpha[$ une déformation continûment dérivable de l'empilement \mathcal{H}^t_{ϵ} telle que $\mathcal{H}^t_{\epsilon}(0)=\mathcal{H}^t_{\epsilon},$ et $u_{\epsilon,\lambda}(t)$

 $\in [0, +\infty[^{S_{\varepsilon}} \ la \ fonction \ définie \ sur \ S_{\varepsilon} \ associée \ aux \ rayons \ de \ l'empilement \ \mathcal{H}^{t}_{\varepsilon}(\lambda).$

Alors on $a \left(\Delta_b^{\varepsilon,t} + V\right) \frac{du_{\varepsilon,\lambda}}{d\lambda} \Big|_{\lambda=0} = 0.$

Preuve du lemme 2. Soit $F: \mathbf{R}_{+}^{B_{\varepsilon}} \times \mathbf{R}_{+}^{I_{\varepsilon}} \to \mathbf{R}$ la fonctionnelle construite par Yves Colin de Verdière dans [CV] et évoquée à la section III. Puisque pour tout $\lambda \in]-\alpha, \alpha[, \mathcal{H}_{\varepsilon}^{t}(\lambda)]$ est un empilement de cercles, on a $d_{I}F(u_{\varepsilon,\lambda}^{B}, u_{\varepsilon,\lambda}^{I}) = 0$. En dérivant par rapport à λ , il vient:

$$\forall \lambda \in]-\alpha, \alpha[, \sum_{s \in I_{\varepsilon}} \left(\sum_{d_{c}(s|s) \leq 1} \frac{\partial K_{s}[u_{\varepsilon,\lambda}]}{\partial u_{\varepsilon}^{s'}} \cdot \frac{du_{\varepsilon,\lambda}^{s'}}{d\lambda} \right) du_{\varepsilon}^{s} = 0.$$

En $\lambda = 0$, on a:

$$\forall s \in I_{\varepsilon}, \frac{\partial K_{s}(u_{\varepsilon})}{\partial u_{\varepsilon}^{s}} \cdot \left(\frac{du_{\varepsilon,\lambda}^{s}}{d\lambda}\right)_{\lambda = 0} + \sum_{s' \sim s} \frac{\partial K_{s}(u_{\varepsilon})}{\partial u_{\varepsilon}^{s'}} \cdot \left(\frac{du_{\varepsilon,\lambda}^{s'}}{d\lambda}\right)_{\lambda = 0} = 0$$

c'est-à-dire exactement $(\Delta_b^{\varepsilon, t} + V) \cdot (\frac{du_{\varepsilon, \lambda}}{d\lambda})_{\lambda = 0} = 0.$

Il reste maintenant à fabriquer une déformation explicite de l'empilement $\mathcal{H}_{\varepsilon}^{t}$.

En guise de premier essai, on va examiner l'image de l'empilement \mathcal{H}^t_{ϵ} par l'homothétie euclidienne de centre 0 et de rapport $1 + \lambda$. Pour une raison qui sera expliquée plus loin, ça n'est pas cet exemple que nous retiendrons en définitive. Néanmoins, on peut en dégager certaines informations qui seront utiles:

Lemme 3. Soit, dans le disque hyperbolique, un cercle C de rayon r et dont le centre est à distance hyperbolique d > r de l'origine. Soit r_{λ} le rayon (hyperbolique) de l'image de C par l'homothétie euclidienne de centre 0 et de rapport $1 + \lambda$.

$$Si$$
 $u_{\lambda} = -\text{Log tanh } \frac{r_{\lambda}}{2}, \quad alors \quad \frac{du_{\lambda}}{d\lambda} \Big|_{\lambda = 0} = -\frac{\cosh d}{\cosh r}.$




FIGURE 2

Preuve du lemme 3. Notons a le demi-angle sous lequel le cercle C est vu du point 0 (cf. fig. 2). D'après les formules de trigonométrie hyperbolique dans le triangle rectangle (voir [B], p. 148), on a

$$\sinh r = \sin a \cdot \sinh d \tag{*}$$

Notons δ la distance euclidienne du centre hyperbolique de C à l'origine. On rappelle que $d = \text{Log} \frac{1+\delta}{1-\delta}$ et que $\delta = \tanh \frac{d}{2}$. On en déduit que $\sinh d = \frac{2\delta}{1-\delta^2}$, de sorte que:

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\sinh h \right) \bigg|_{\lambda = 0} = \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{2(1+d)\delta}{1 - (1+\lambda)^2 \delta^2} \right) \bigg|_{\lambda = 0} = \frac{2\delta}{1 - \delta^2} \cdot \frac{1 + \delta^2}{1 - \delta^2}$$

$$= \sinh d \cdot \cosh d.$$

En dérivant (*) par rapport à λ en $\lambda = 0$, il vient donc, comme a est constant,

$$\cosh r \cdot \frac{dr}{d\lambda} \bigg|_{\lambda = 0} = \sin a \times \frac{d}{d\lambda} \left(\sinh d \right) \bigg|_{\lambda = 0} = \frac{\sinh r}{\sinh d} \times \sinh d \cdot \cosh d,$$

de sorte

$$\frac{1}{\sinh r} \cdot \frac{dr}{d\lambda} \Big|_{\lambda = 0} = \frac{\cosh d}{\cosh r}.$$

Comme

$$u = -\operatorname{Log} \tanh \frac{r}{2} = \int_{r}^{+\infty} \frac{d\sigma}{\sinh \sigma} \quad \text{on} \quad a \quad \frac{du}{d\lambda} \Big|_{0} = -\frac{1}{\sinh r} \cdot \frac{dr}{d\lambda} \Big|_{0} = -\frac{\cosh d}{\cosh r}. \quad \Box$$

Voici le résultat qui, joint à la section suivante, nous permettra de conclure:

Lemme 4. Soit K un compact de \mathscr{U} et S_{ϵ}^{K} l'ensemble des sommets de S_{ϵ} dans K. Alors il existe une fonction $\phi_{\epsilon}^{t}: S_{\epsilon} \to \mathbf{R}_{-}^{*}$ vérifiant:

(i)
$$(\Delta_b^{\varepsilon,t} + V) \varphi_{\varepsilon}^t = 0$$

(ii)
$$\forall s, s' \in S_{\varepsilon}^{K}$$
 tels que $s' \sim s$, on a $\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\varphi_{\varepsilon}'(s)}{\varphi_{\varepsilon}^{t}(s')} = 1$.

Preuve du lemme 4. On observe tout d'abord qu'il existe un compact K' du disque hyperbolique tel que si ε est assez petit alors pour tout $t \in [0, 1]$, tous les cercles de $\mathcal{H}^t_{\varepsilon}$ correspondant à des sommets dans S^K_{ε} sont contenus dans K'. Ceci résulte du point iii) de la proposition de la section IV et du fait que le diamètre combinatoire de $\mathcal{H}^t_{\varepsilon}$ est $\leq \frac{C}{\varepsilon}$, la constante C ne dépendant que de \mathcal{U} .

Considérons maintenant une isométrie hyperbolique j telle que j(K') ne contienne pas 0. Notons h_{λ} l'homothétie euclidienne de centre 0 de rapport $1 + \lambda$. On définit l'emplacement $\mathcal{H}^{t}_{\varepsilon}(\lambda)$ comme étant l'image de $\mathcal{H}^{t}_{\varepsilon}$ par l'application $j^{-1} \circ h_{\lambda} \circ j$.

Avec les notations du lemme 2, on pose

$$\varphi_{\varepsilon}^{t}(s) = \frac{du_{\varepsilon,t}^{s}(t)}{d\lambda} \bigg|_{\lambda = 0}.$$

 $\varphi_{\varepsilon}^{t}$ vérifie *i*) d'après ce lemme. De plus, comme *j* est une isométrie, on a d'après le lemme 3,

$$\varphi_{\varepsilon}^{t}(s) = -\frac{\cosh \tilde{d}_{\varepsilon}^{t}(s)}{\cosh r_{\varepsilon}^{s}(t)}$$

où $\tilde{d}_{\varepsilon}^{t}(s)$ est la distance à l'origine du centre du cercle de $j(\mathcal{H}_{\varepsilon}^{t})$ correspondant au sommet s. Déjà, $\lim_{\varepsilon \to 0} \cosh r_{\varepsilon}^{s}(t) = 1$ d'après le point iii) de la proposition du IV.

Notons δ la distance de 0 à j(K'), et σ , σ' les centres des cercles de $j(\mathcal{H}^t_{\epsilon})$ images par j de deux cercles tangents de \mathcal{H}^t_{ϵ} correspondants aux sommets s et s' de S^K_{ϵ} .

Alors les longueurs $\tilde{d}_{\varepsilon}^{t}(s)$ et $\tilde{d}_{\varepsilon}^{t}(s')$ des côtés 0σ et $0\sigma'$ du triangle $(0\sigma\sigma')$ sont minorées par $\delta > 0$ tandis que la longueur $r_{\varepsilon}^{s}(t) + r_{\varepsilon}^{s'}(t)$ du côté $\sigma\sigma'$ tend vers 0 avec ε uniformément en t. On en déduit

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\cosh \tilde{d}_{\varepsilon}^{t}(s)}{\cosh \tilde{d}_{\varepsilon}^{t}(s')} = 1 , \quad \text{d'où } \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\varphi_{\varepsilon}^{t}(s)}{\varphi_{\varepsilon}^{t}(s')} = 1 ,$$

la limite étant uniforme en t, ce qui prouve le point ii).

VI. INÉGALITÉ DE HARNACK

Le but de cette section est de terminer la preuve du théorème de Rodin-Sullivan en démontrant la

PROPOSITION (Inégalité de Harnack). Soit K un compact d'intérieur non vide contenu dans \mathcal{U} et A,B deux réels vérifiant 0 < A < B.

Pour tout compact \tilde{K} d'intérieur non vide contenu dans \mathring{K} , il existe une constante $C = C(\tilde{K})$ possédant la propriété suivante: