

# The Smith filtration on the universal principal bundle of a Coxeter group

Autor(en): **Fiedorowicz, Zig**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **54 (2008)**

Heft 1-2

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-109900>

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# 31

## THE SMITH FILTRATION ON THE UNIVERSAL PRINCIPAL BUNDLE OF A COXETER GROUP

by Zig FIEDOROWICZ

DEFINITION 31.1. If  $G$  is any discrete group, let  $EG$  denote the *standard construction of a universal principal  $G$ -bundle*. That is,  $EG$  is the geometric realization of the simplicial set  $E_*G$  whose set of  $k$ -simplices is  $G^{k+1}$ , with faces given by deletion of coordinates and degeneracies given by repetition of coordinates and with  $G$  acting diagonally on the coordinates.

In his 1981 thesis [2], J. Smith constructed a natural filtration on the universal principal bundle  $E\Sigma_n$  of the symmetric group  $\Sigma_n$  as follows.

For each  $m \geq 1$ , let  $F^{(m)}E_*\Sigma_n$  denote the simplicial subset of  $E_*\Sigma_n$  consisting of those simplices  $(g_0, g_1, \dots, g_k)$ , where for each pair  $1 \leq i < j \leq n$ , the number of times the pair gets reversed by the sequence of permutations  $g_0g_1^{-1}, g_1g_2^{-1}, \dots, g_{k-1}g_k^{-1}$  is at most  $m - 1$  times. Let  $F^{(m)}E\Sigma_n$  denote the geometric realization of this simplicial set.

Smith conjectured the following result, which was later proved by C. Berger [1].

THEOREM 31.2.  $F^{(m)}E\Sigma_n$  has the homotopy type of the configuration space of  $n$ -tuples of distinct points in  $\mathbf{R}^m$ .

This result can be reformulated in the context of Coxeter groups as follows. Let  $G$  be a finite Coxeter group generated by orthogonal reflections on  $\mathbf{R}^n$ . Then we can define the *Smith filtration* on  $E_*G$  by counting the number of times a generic point in  $\mathbf{R}^n$  gets flipped around any one of the reflecting hyperplanes  $H_i$  by the sequence  $g_0g_1^{-1}, g_1g_2^{-1}, \dots, g_{k-1}g_k^{-1}$  corresponding to a  $k$ -simplex  $(g_0, g_1, \dots, g_k)$ .

A natural generalization of the above result seems to be

**CONJECTURE 31.3.**  *$F^{(m)}EG$  has the homotopy type of the complement of  $\cup_i H_i \otimes \mathbf{R}^m$  in  $\mathbf{R}^{mn}$ .*

Moreover a considerable portion of Berger's proof carries through in this context. Berger's proof consists of constructing a certain poset and then decomposing the configuration space as a colimit of contractible subspaces indexed by this poset. He then shows that on the one hand the colimit has the same homotopy type as the homotopy colimit, and thus the same homotopy type as the nerve of the poset. On the other hand, he shows by a Quillen Theorem A argument that the nerve of the poset has the same homotopy type as  $F^{(m)}E\Sigma_n$ . Berger's poset has a natural interpretation in the Coxeter context. However there are certain technical difficulties in carrying out the complete proof.

It may also be the case that there are further generalizations possible for more general classes of reflection groups.

#### REFERENCES

- [1] BERGER, C. Combinatorial models for real configuration spaces and  $E_n$ -operads. In: *Operads: Proceedings of Renaissance Conferences* (1995), 37–52. Contemp. Math. 202. Amer. Math. Soc., 1997.
- [2] SMITH, J. H. Simplicial group models for  $\Omega^n S^n(X)$ , *Israel J. Math.* 66 (1989), 330–350.

Z. Fiedorowicz

Department of Mathematics  
 The Ohio State University  
 Columbus, OH 43210  
 USA  
*e-mail:* fiedorow@math.ohio-state.edu