

Supplementary note : the polarized proton source for the Harwell Proton Linear Accelerator

Autor(en): **Craddock, M.K.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Helvetica Physica Acta**

Band (Jahr): **34 (1961)**

Heft [6]: **Supplementum 6. Proceedings of the International Symposium on polarization phenomena of nucleons**

PDF erstellt am: **24.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-513291>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Supplementary note by M. K. CRAWDODCK

The Polarized Proton Source for the Harwell Proton Linear Accelerator

15 March 1961

A polarized beam has been successfully accelerated to an energy of 30 MeV. The polarization and the proton intensity obtained depend somewhat on the adjustment of the source. At the maximum polarization measured (0.31 ± 0.02) the proton intensity was 1.5×10^7 per second. At the maximum intensity (6×10^7 protons per second) the polarization was 0.216 ± 0.004 . It is now known that when these measurements were made the transmission factor of the accelerator was 30% below normal; so in future experiments, a corresponding improvement in the proton intensity can be expected. In addition to the statistical error quoted, the measured values of the polarization have an uncertainty of $\pm .01$ due to the uncertainty in the value used for the polarization efficiency of the analyser.

The measurements of BROCKMAN and YAMABE of the polarization (P_2) in elastic proton scattering from carbon at 15.9 MeV were used to determine the beam polarization (P_1) in an asymmetry measurement ($\epsilon = P_1 P_2$). After suitably degrading the energy from 30 MeV the protons were scattered at 45° and detected by two double coincidence scintillation telescopes placed to the left and to the right of the incident proton beam. The telescopes were not moved during the experiment, but the direction of polarization of the beam was changed by reversal of the magnetic field across the ioniser with a switch in the Control Room. Background counting rates were less than 1 part in 1000.