

Zeitschrift: Intercura : eine Publikation des Geriatriischen Dienstes, des Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik der Stadt Zürich

Band: - (2001-2002)

Heft: 76

Rubrik: Altersmythos LXXXIX : Schwindel bei Betagten ist meist Folge von Labyrinthkrankungen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 10.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ALTERSMYTHOS LXXXIX

Schwindel bei Betagten ist meist Folge von Labyrinthkrankungen.

Wirklichkeit

Schwindel ist ein geriatrisches Syndrom mit multiplen Teilursachen.

Begründung

- ◆ Die Analyse von 362 nicht dementen ambulanten geriatrischen Patienten in New Haven CT USA ergab unspezifischen (nicht Dreh-) Schwindel bei 21% der 79 ± 7 Jahre alten Personen.
- ◆ Es ergaben sich folgende signifikant mit Schwindel assoziierte Risikofaktoren:

- S.P. Myokardinfarkt	OR 6.6
- Katarakt	OR 5.3
- Gang- oder Gleichgewichtsstörung	OR 3.1
- Depressives Zustandsbild	OR 2.8
- Diabetes	OR 2.5
- Orthostatische Hypotonie	OR 2.0
- 3 oder mehr Medikamente	OR 1.6
- ◆ Unter Schwindel litten:
 - 6% der Pers. mit 1 der obigen 7 Risikofaktoren
 - 12% der Pers. mit 2 der obigen 7 Risikofaktoren
 - 26% der Pers. mit 3 der obigen 7 Risikofaktoren
 - 51% der Pers. mit 4 der obigen 7 Risikofaktoren
 - 0% der Personen mit 0 der obigen Risikofaktoren

AC Kao et al. Validation of Dizziness as a possible geriatric syndrome, JAGS 49: 72-75, 2001