Objekttyp:	Advertising

Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für

Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Band (Jahr): 132 (1990)

Heft 2

PDF erstellt am: 26.05.2024

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

Klinische Euterentzündungen während der Laktation

RASCH HANDELN! ENTSCHEIDEND HANDELN!

- Eine wirksame Therapie erster Wahl, um die symptomatische und bakteriologische Heilung ohne Risiko zur Chronozität zu sichern.
- Eine Cloxacillin-Colistin-Kombination, um auf alle für Mastitiden verantwortlichen Erreger einzuwirken, einschliesslich der penicillinresistenten Staphylokokken und E-Coli



Mammites cliniques pendant la lactation

FRAPPEZ VITE! FRAPPEZ FORT!

- Un traitement efficace de 1er choix pour assurer une guérison symptomatique et bactériologique sans passage à la chronicité.
- Une association cloxacilline-colistine pour agir sur tous les germes responsables de mammites, même sur les staphylocoques résistants à la pénicilline et sur E-Coli.
- Une diffusion rapide et complète des principes actifs dans la mamelle pour un traitement en profondeur.

virbac

GENTASEPTIN®

ermöglicht dank seiner spezifischen pharmazeutischen Formulierungen eine hochwirksame

Mastitis-Retardtherapie

gegen das gesamte Erregerspektrum bei sehr hoher Heilungsrate:

subklinische Mastitiden	92%
klinische Mastitiden	87%
bei S. aureus/Streptokokken sp.	91%
andere Str. (Str. uberis und dysgal.)	87%
Gramnegative (E. coli/Ps. aerug.)	
IF Kleinschroth und J. Deneke 1987]	

OP: GENTASEPTIN Eutersuspension Injektor à 10 ml Flasche à 80 ml

Therapie resistenter Endometritiden:

bei A. pyogenes-Endometritis nach einmaliger intrauteriner Applikation im klinischen Test vollständige Heilung mit normaler Fertilität

OP: GENTASEPTIN Metritisinjektor à 150 ml





Besonders Uterusentzündungen sind meistens Mischinfektionen, die bei unbekanntem Erregerspektrum sofortige Behandlung verlangen.

Notwendig ist ein breites Wirkungsspektrum, das grampositive und -negative Keime erfasst. Das Mittel der Wahl: Totocillin im neuen 20-ml-lnjektor, im 10-ml-lnjektor oder in der 100-ml-Flasche.

Totocillin ist penicillinasefest, hat eine kurze Wartezeit, kann

zur Uterusbehandlung 12 bis 24 Stunden nach dem Besamen (Aströmsche Methode) eingesetzt werden.

Zusammensetzùng: 1 ml Suspension enthält 23,1 mg Ampicillin 3 H_2O , entsprechend 20 mg Ampicillin und 44 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazol-carboxamido)penicillansäure, Natriumsalz 1 H_2O , entsprechend 40 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolcarboxamido)penicillansäure (Oxacillin).

Handelsformen:

- Sch. mit 10 lnj. zu je 20 ml
- Sch. mit 10 Inj. zu je 10 ml
- Flaschen zu 100 ml



Generalvertretung Schweiz:



3421 Lyssach bei Burgdorf