Product-Infos

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **142 (2000)**

Heft 8

PDF erstellt am: **27.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Biokema AG

HORSOL®-Spray **ad us. vet.**

Pflegemittel für Pferde

Zusammensetzung: Salicylsäure 10% – Fettsäure – Excipiens.

Allgemeines

Während der Sommermonate gegen Mähne-, Schweif- und Hautreizungen, mit Abkratzen und Missbehagen als Folge. Horsol® hilft dieses Missbehagen zu reduzieren.

Bei der empfohlenen Behandlungsdosis (5 ml oder 80 Tropfen der Mähne entlang und 2 ml oder 30 Tropfen bei der Schweifrübe) bleiben die Salicylsäurewerte im Urin und im Plasma unterhalb der von der FEI zugelassenen Toleranzwerte.

Anwendung und Dosierung

Max. 5 ml (80 Tropfen) der Mähne entlang und 2 ml (ca. 30 Tropfen) bei der Schweifrübe verabreichen (anwenden).

Horsol® schon im Frühling anwenden (bei den ersten Zeichen von Missbehagen) und bis im Herbst fortsetzen. Am Anfang Horsol® 1× täglich anwenden, dann 2–3× wöchentlich, bis die Situation unter Kontrolle ist.

Vorsichtsmassnahmen

- Horsol® nicht in die Augenregion sprühen.
- Wenn das Produkt mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt, sofort und reichlich mit Wasser waschen.
- Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Handelsform: Flasche zu 100 ml.

Vertrieb sat 11
Biokema AG
1023 Crissier-Lausanne

Provet AG

Neu: Cydectin pour-on ad us. vet.
Endo- und Ektoparasitikum für Rinder

Der Wirkstoff Moxidectin gehört in die Gruppe der makrozyklischen Laktone und stellt das einzige Milbemycin unter den Endektoziden dar. Damit verbinden sich erstmals die Vorzüge des hochwirksamen Wirkstoffs mit den Annehmlichkeiten einer Pour-on-Formulierung. Moxidectin ist der am stärksten lipophile Wirkstoff unter den Endektoziden. Durch Ablagerung im Fettgewebe und verzögerte Freisetzung wird eine ausgeprägte Langzeitwirkung gegen die hauptpathogenen Endoparasiten des Rindes (5/6 Wochen Schutz vor Reininfektion mit Ostertagia osertagi/Dictyocaulus viviparus) erreicht.

Ein breites Wirkspektrum, das alle bedeutenden Endo- und Ektoparasiten des Rindes umfasst, garantiert hervorragende Behandlungserfolge (wie auch eine verbesserte Gewichtszunahme).

Die Aufgussformulierung auf Kokosölbasis enthält keine alkoholischen Bestandteile und ist äusserst hautschonend, regenfest und am Tier gut sichtbar.

In Zeiten zunehmender Verbrauchersensibilisierung gewinnt die Tatsache, dass Moxidectin ein besonders umweltverträglicher Wirkstoff ist, zunehmend an Bedeutung. So hat Cydectin pour-on keinen negativen Einfluss auf die am Dungabbau beteiligten Arthropoden wie z. B. Mistkäfer.

Cydectin pour-on wird in der neuen 500-ml-Flasche mit praktischem Dosiersystem angeboten.

Alleinvertrieb für die Schweiz: sat 5
Provet AG
3421 Lyssach
Tel. 034 445 40 66

Veterinaria AG

Vetamun® Live KC, der intranasale Impfstoff gegen Zwingerhusten

Der neue Vetamun® Live KC ist ein Lebendimpfstoff zur intranasalen Anwendung gegen Bordetella bronchiseptica und canines Parainfluenzavirus, die Haupterreger des Zwingerhustens.

Was sind die Vorteile der intranasalen Vakzination?

- Sehr gute Verträglichkeit sogar bei 2 Wochen alten Welpen und trächtigen Hündinnen.
- Schutz nach einmaliger Impfung mit Vetamun® Live KC. Die Immunitätsdauer beträgt mindestens 3 Monate.
- Bereits 72 Stunden nach der Impfung belastungsfähiger Schutz gegen Bordetella bronchiseptica und canines Parainfluenzavirus (partieller Schutz bereits nach 48 Std.)!
- Induziert eine rasche Immunantwort durch Simulieren einer natürlichen Infektion, da die lebende, attenuierte Komponente B. bronchiseptica die Eigenschaft besitzt, sich fest an das Flimmerepithel der Nasenschleimhaut zu heften.
- Einfache Applikation: Die Impfdosis (0,4 ml) muss in nur ein Nasenloch verabreicht werden.

Hunde können nun kurz vor einer Risikosituation, z.B. Tierheimaufenthalt, Ausstellung, Welpenspielgruppe usw., mit Vetamun® Live KC effizient geschützt werden. Dies ist ein grosser Vorteil gegenüber der parenteralen Immunisierung, da Hunde nun kurzfristig und risikofrei in ein Tierheim gegeben werden können.
Packungsgrösse: 5× 1 Dosis Lyophilisat, 5 Fläschchen Lösungsmittel und 5 Applikatorspritzen.
Selbstverständlich haben wir Vetamun® Live KC in unsere Abschlusskonditionen integriert, damit Sie von den optimalen Bestellkonditionen und den vorteilhaften Preisen profitieren können.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere kompetenten MitarbeiterInnen im Innen- und Aussendienst.

Veterinaria AG sat 14
Postfach, 8021 Zürich
Tel. 01 455 31 11, Fax 01 455 31 55

Biokema SA

HORSOL® Spray ad us. vet.

Produit d'hygiène pour chevaux
Composition: Acide salicylique 10% – Acides gras – Excipient.

Généralités
Durant les périodes plus chaudes de l'année, certains chevaux présentent des irritations de la crinière, de la queue et de la peau. Il s'en suit grattage et inconfort. Horsol® aide à réduire cet inconfort.
A la dose d'entretien recommandée (5 ml ou 80 gouttes sur la crinière et 2 ml ou 30 gouttes sur la base de la queue) les taux d'urine et plasmatiques d'acide salicylique restent en dessous des seuils de tolérance admis par la FEI.

Mode d'emploi et posologie
Appliquer au maximum 5 ml (80 gouttes) le long de la base de la crinière et 2 ml (environ 30 gouttes) à la base de la queue.
Commencer à utiliser Horsol® au printemps, aux premiers signes d'inconfort et continuer jusqu'à l'automne. Au début, appliquer Horsol® une fois par jour puis 2 à 3 fois par semaine à mesure que le processus est contrôlé.

Précautions
- Horsol® ne doit pas être appliqué dans la zone des yeux.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Tenir hors de portée des enfants.

Présentation: Flacon de 100 ml.

Distributeur sat 12
Biokema SA
1023 Crissier-Lausanne