Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 2 (1866-1868)

Heft: 3

Artikel: Descriptions d'espèces nouvelles de Carabiques propres à la faune

méditerranéenne, suivies de quelques observations

Autor: Des Cottes, Gautier

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-400215

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Band 2. Nr. 3.]

Redigirt von Dr. Stierlin in Schaffhausen.

[August 1866.

Gautier des Cottes.

DESCRIPTIONS

d'espèces nouvelles de Carabiques propres à la faune méditerranéenne, suivies de quelques observations

1º RECUEIL.

1. Metabletus valladolensis. Gaut. des Cottes.

Elongatus obscuro-æneus, subnitidus. Prothorace subcordato angulis posticis obtusis reflexisque. Elytris elongatis substriatis, ad apicem rotundato-truncatis; aliquoties macula obsoleta humerali. Pedibus nigris, tibiis in medio levissime rufis; habitat in Hispania (Valladolid). A. Dom. Bellier de la Chavignerie lectus.

Longit. $3^{1}/_{2}$ à 4 mill.

Allongé d'un noir obscur avec un reflet bronzé en dessus. Corselet cordiforme, assez court, retréci en arrière, angles postérieurs obtus, relevés. Elytres allongées, striées; l'angle huméral ordinairement d'une couleur un peu plus claire à peine visible. Pattes noires, tibias quelquefois un peu plus clairs.

Ce Metabletus se rapproche de l'obscuroguttatus (Dufts.); ce n'est que par comparaison avec ce dernier, qu'il est possible d'en bien préciser la description par la différence: Il est d'abord d'un tiers plus grand; le corselet est plus retréci en arrière; les élytres sont plus parallèles, plus allongées, à maculations presque invisibles sur les angles huméraux, n'en présentant jamais avant leur extrémité. Les pattes sont entièrement noires, avec les tibias quelquefois un peu plus clairs. —

Ces caractères sont constants sur une dixaine d'éxemplaires rapportés de Valladolid par mon collègue et ami, Mr. Bellier de la Chavignerie.

Nota. J'ai fait une nouvelle espèce de ce Metabletus au même titre que l'on a séparé le Metabletus pallipes - Dej. de l'obscuroguttatus Duftsch.

2. Blechrus mauritanicus. Lucas (Exp. al. p. 16).

Cet insecte a été envoyé, de Sicile, à Mr. Bellier de la Chavignerie; il fait donc partie actuellement de la faune européenne.

3. Amblystomus escorialensis. Gaut. des Cottes.

Ovalo-oblongus, nigro-micans. Capite oblongo-ovali; articulis antennarum, primo testaceo, 2º—6º nigris, ultimis griseotomentosis. Prothorace subtransverso, rotundato, angulis posticis obtusis, utrinque impressis; linea basali sub-arcuata, transversa. Elytris parallelis, ad apicem rotundatís, sinuatotrunctatis, subglabris striatisque. Pedibus piceis, tibiis in medio tarsisque læviter testaceis. — Hab. in Hispania (Escorial).

Longit. 13/4 mm. — à 2 mm.

Ovale-oblong d'un noir très brillant. Tête en ovale allongé; antennes à premier article testacé, les suivans jusqu'au sixièmie noirs, les derniers revêtus d'une villosité grise. Prothorax subtransversal, arrondi sur les côtés, un peu plus étroit en arrière, traversé à sa bâse par une ligne enfoncée qui se perd, de chaque côté, dans l'impression des angles postérieurs qui sont obtus mais bien marqués. Elytres presque parallèles s'arrondissant à l'extrémité qui est tronquée sinueusement; entièrement couvertes de stries d'autant plus fines qu'elles se rapprochent de leurs côtés. Les pattes sont couleur de poix, avec les tibias et les tarses un peu plus clairs.

Cette espèce diffère de toutes ses congénères:

- 1º par sa forme plus courte.
- 2º par la tête plus allongée.
- 3° par le premier article des anténnes entièrement testacé.
- 4º par les élytres qui sont striées sur toute leur surface.
- 5º par l'exiguité de la taille qui est constante.

Je dois deux exemplaires de cette espèce à l'obligeance de Mr. Perez-Arcas de Madrid, qui me l'avait indiquée comme nouvelle, et un autre à Mr. Piochard de la Brûlerie qui l'avait confondu avec l'Amblystomus metallescens Dej. Ils proviennent tous de l'Escorial.

Cette nouvelle espèce porte à 6 celles méditerranéennes contenues dans ce genre; abstraction faite toutefois du Stenolophus niger Heer (faun. helv. appendix p. 563) qui n'est que l'Amblystomus metallescens de Dejean; et non pas une variété de cette espèce comme l'indiquent tous les catalogues. En voici l'énumération:

Amblystomus mauritanicus, Dej- 480. - Algiria, Hispania,

metallescens, Dej- 482. Gal. mer. Helvetia Hispania etc.

Raymondi Gautier Fr. 61. 193. Gal. mer. hispan.

Solskyi. Reiche Fr. 64. 231. Algiria.

escorialensis Gautier. Mittheilungen 66. Hisp. bor.

dilatatus. Chaudoir 188. Caucasus.

J'ajouterai que toutes ces espèces se divisent en deux groupes bien distincts:

1er groupe corselet transversal, subarondi.

2^{de} cordiforme.

4. Bembidium (notaphus) guadarramense. Gaut. des Cottes.

Curto-ovalum, nigro-nitidum; in utroque latere capitis striis duabus sub parallelis; antennis nigris, articulis primis glabris, ultimis villosis, — Thorace subquadrato, angulis posticis rectis reflexis, utrinque impressis. Elytris nigris, subnitidis, ovalibus, leviter convexis — sub striato-punctatis. Pedibus nigris.

Longit. 3 Mill.

a. dom. Piochard de la Brûlerie lectum. Habitat in Montibus nivosis Guadarramæ (Hispania.)

C'est un des plus petits Bembidium de la division des Notaphus telle qu'elle est établie dans le Catalogue de feu Mr. Schaum; il n'y a guères que le Bembidium ephippium (Marsh), de la même division, qui lui soit inférieur en taille.

Il a la forme du *B. adustum* (Schaum)-fumigatum (Dej.); mais il est plus pètit, entièrement noir brillant en dessus. La tête présente les deux sillons frontaux presque parallèles, non réunis à l'avant. Le corselet transversal, les angles postérieurs droits, relevés avec une impression bien marquée, de chaque côté. Les élytres sont striées ponctuées, les stries peu effacées en arrière et sur les côtés. Les pattes sont noires.