Chasses de nuit au Vallon de la Versoix

Autor(en): Méroz, A.

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the

Swiss Entomological Society

Band (Jahr): 17 (1937-1939)

Heft 11

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-400887

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

Chasses de nuit au Vallon de la Versoix

par

A. Méroz.

Cette vallée, située à proximité de Genève, se prête admirable-

ment bien pour la chasse des Hétérocères.

De nuit, dès la sortie de la garé de Versoix, en direction Les Villars, Richelien La Bâtie, les rares réverbères attirent de nombreux papillons surtout durant les nuits sombres ou les soirs d'orages. La chasse autour de ces réverbères est cependant peu fructueuse car, étant donné la hauteur des lumières, les papillons échappent souvent aux filets. Il est donc préférable de se munir de lanternes que l'on fixe dans des lieux choisis. Le résultat de la chasse est généralement bon. Mais, l'endroit le mieux situé est, sans aucun doute, le Restaurant Sick à Richelien. Le bâtiment, placé sur la hauteur, domine toute la contrée, sa grande façade vitrée et bien éclairée, attire les insectes mieux que toute autre lumière. Les captures que l'on peut faire contre les vitres de la salle sont nombreuses et souvent intéressantes ainsi qu'en témoigne la liste ci-dessous :

Endromis versicolara ·L. — 11. IV. 39, 1 exempl.

Gastoropacha rimicola Hb. — 29. X. 38, 1 exempl.

Stauropus fagi L. — Juillet 1937, plusieurs exempl.

Notodonta trepida Esp. — 14. V. 37, 1 exempl. Notodonta chaonia Hb. — 20. IV. 39, 1 exempl.

Notodonta querna F. — 14. V. 38, 1 exempl.

Notodonta trimacula Esp. — 5. VI. 37, 1 exempl. Drynobia velitaris Rott. — 28. VII. 37, 1 exempl.

Gluphisia glyphida H.-S. crenata Esp. — 6. VI. 37, 2 exempl.

Pygaera clostera Stph. anachoreta F. — 29. IV. 38, 1 exempl.

Asphalia diluta F. — Juillet, août et septembre 1936 et 1937, plusieurs exempl.

Gonophora derasa L. — 7. VII. 37, 1 exempl.

Acronycta tridens Schiff. — 18. I. 37, 1 exempl.

Triphaena fimbria L. — 7. VII. 37, 1 exempl.

Laria L. nigrum Mill. — 19. VI. 37, 1 exempl.

Psilura monacha L. — Juillet 1937, plusieurs exempl.

Agrotis praecox L. — 26. IX. 28, 1 exempl.

Dianthoecia nana Rott. — 24. VI. 38, 1 exempl.

Apama testacea Hb. — 25. IX. 36, 2 exempl.

Hadena rubricena Tr. var. Hercyniae Str. — 21. IX. 36, 2 exempl.

Hadena srubwei. — 16. VII. 38, 1 exempl.

Calimnia diffinis L. — 7. VII. 37, 1 exempl.

Orthosia helvola L. — 1. X. 38, 1 exempl.

Xanthia fulvago L. var. flavesens. — 25. IX. 36, 1 exempl.

Xylocampa areola Esp. — 2. IV. 39, 1 exempl.

Plusia bractea F. — 20. IX. 36, 1 exempl. Plusia illustris F. — 23. VII. 38, 1 exempl.

Erastria venustula Hb. — 10. VÍ. 37, 1 exempl.

Biston hispidarius F. — 21. III. 37, 5. III. 38, 26. II. 39, 11. III. 39, 4 exempl.

Boarmia cinctaria Schiff. — 10. IV. 38, 1 exempl.

Cidaria-Larentia corylata Th. — 19. VI. 37, 1 exempl.

Enomos fuscantaria Hn. — 5. IX. 36, 1 exempl.

A propos de

«Chasses printanières aux Lépidoptères au Maroc»

(voir Bull. Soc. Lépid. Genève, vol. VII, p. 246—265, 1938)

par

Dr G. E. Audeoud

M. Ch. Boursin après avoir eu en mains notre article, a eu l'amabilité de contrôler nos Autophila cités sous chiffres 124 et 125 de notre liste des espèces. Il m'a fait remarquer que l'appellation Aut. cataphanes ab. roseata Rtsch. n'est pas exacte. Ce papillon n'est pas considéré comme une aberration de cataphanes; il s'appelle maura Stgr. (syn. roseata Rtsch.) bona sp.

Quant à rosea Stgr. ce n'est pas non plus une variété de dilu-

cida, mais elle aussi une bona sp.

Les 2 exemplaires sus-mentionnées sont des Q.

Il résulte de ces rectifications que le No. 124 doit être rédigé ainsi: Autophila maura Stgr. 1 Q à Beni-Ounif

et le No. 125 : Autophila rosea Stgr. 1 Q à l'Oued Juif.

Pour être complet, je dois ajouter à notre liste deux espèces que j'ai omises:

No. 14bis Gonepteryx rhamni L. 2 od à Ras el Ma, 29. III. 1923.

No. 51bis Adopaea hamza Obth. 1 Q à St-Hubert.

Ce qui porte le total de nos espèces à 261.