Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie

Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde

Band: 62 (1984)

Heft: 4

Artikel: Coprinus romagnesianus Sing. (= C. squamosus [Bres.] Romagn.), Braunschuppiger Tintling = Coprin à mèches brunes

Autor: Kobler, B.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-936110

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Coprinus romagnesianus Sing. (= C. squamosus [Bres.] Romagn.), Braunschuppiger Tintling

Fam.: *Coprinaceae*

Hut: Fast häutig, glockig aufschirmend, grau-rötlichbraun mit hellerem Rand, der schuppig einreisst, rotbraun-olivbraun angedrückt grobschuppig, 4—6 cm.
Lamellen: Weisslich, dann purpurschwarz, gedrängt, breit bauchig, kurz angewachsen bis frei.
Stiel: Über ringartigem Wulst weiss, seidig gestreift, darunter schuppig wie der Hut, markig ausgefüllt.
Fleisch: Zart, weiss, im Hut im Schnitt leicht rötend, im Stiel kaum verfärbend, geruchlos.
Sporenpulver: Purpurschwarz-schwarz. Sporen: 8—12 × 5—6 µm, eiförmig.
Standort: Auf gedüngten Böden, gerne um Baumwurzeln, meist büschelig.
Bemerkung: Diese meist in wärmerer Gegend wachsende Art steht verwandtschaftlich und in der Form dem Faltentintling (*C. atramentarius* [Bull. ex Fr.] Fr.) sehr nahe, ist aber im Gegensatz deutlich schuppig. Bresadola fasste diesen Pilz als Varietät des Faltentintlings auf. Nicht mit Alkohol zu geniessen, da diese Art eventuell etwas Coprin enthalten könnte! B. Kobler

Coprinus romagnesianus Sing. (= C. squamosus [Bres.] Romagn.), Coprin à mèches brunes

Fam.: *Coprinaceae*

Chapeau: ovoïde puis campanulé, à chair presque pelliculaire; brun gris rougeâtre, plus clair à la marge qui se déchire en squames; couvert de grossières écailles apprimées brun-rouge à brun-olive; 4—6 cm.
Lames: blanchâtres, puis noir pourpre; serrées, largement ventrues; brièvement adnées à libres.
Pied: blanc au-dessus d'un bourrelet annulaire, vergeté soyeux; squameux au-dessous comme le chapeau; médulleux.
Chair: tendre, blanche, rougissant légèrement à la coupe dans le chapeau; blanche presque immuable dans le pied; inodore.
Sporée: noir pourpré à noire.
Spores: ovoïdes, 8—12 × 5—6 µm.
Habitat: sur terres fumées, fréquemment entourant des racines d'arbres; généralement cespiteux.
Remarque: cette espèce préfère des stations où la température est relativement élevée; elle est apparentée de près à *C. atramentarius* (Bull. ex Fr.) Fr. (Coprin goutte d'encre); de port semblable, elle est par contre nettement squameuse. Pour Bresadola, ce champignon n'est qu'une variété du C. goutte d'encre. Ne pas consommer cette espèce avec de l'alcool, car elle pourrait contenir éventuellement un peu de coprine (substance à effet antabuse). (Trad.: F. Brunelli)

Coprinus romagnesianus Sing. (= C. squamosus [Bres.] Romagn.)

Fam.: *Coprinaceae*

Cappello: quasi membranoso, si apre a campana, grigio rossiccio bruno con orlo chiaro, desquamato, con squame grossolane e adnate di colore rosso bruno-oliva bruno, 4—6 cm.
Lamelle: biancastre, poi porpora-nero, fitte, largamente ventricose, da brevemente adnate a libere.
Gambo: bianco sopra un cercine a forma di anello, con striature sericee, al disotto squamoso come il cappello e midolloso-farcito.
Carne: tenera, bianca, nel cappello arrossa leggermente al taglio, nel gambo si colora appena, senza odore.
Polvere sporica: porpora nera a nera. Spore 8—12 × 5—6 µm, ovali.
Habitat: su terreno concimato, di preferenza intorno a radici di alberi, in prevalenza cespitoso.
Osservazioni: questa specie, che cresce di preferenza in zone calde, è in stretta parentela, anche nella forma, al *C. atramentarius* (Bull. ex Fr.) Fr., ne differisce però perchè è chiaramente squamoso. Bresadola concepì questo fungo come una varietà del *C. atramentarius* (Bull. ex Fr.) Fr. Da non mangiare con alcool, perchè potrebbe eventualmente contenere «Coprin». (Trad.: E. Zenone)

Coprinus romagnesianus Sing. = C. squamosus (Bres.) Romagn.

(Aquarelle de Jean Mouchet)