

Zeitschrift: Naturwissenschaftlicher Anzeiger der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften
Herausgeber: Allgemeine Schweizerische Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften
Band: 1 (1817)
Heft: 10

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

NOTES

sur quelques espèces de Saxifrages du SYNOPSIS SAXIFRAGARUM HELVETICARUM de Mr. Gaudin et sur quelques exemplaires séchés, envoyés par Mr. le Comte de Sternberg. — Par N. C. Seringe.

1. SAXIFRAGA AIZOON, MINIMA SER. HERB.

Cette variété récoltée au Pont-du-diable n'a pas plus d'un pouce et demi de haut; c'est dans toute la rigueur des caractères la Saxifraga aizoon en miniature. J'ai des exemplaires qui n'ont que deux fleurs sur la tige.

2. SAXIFRAGA PATENS. GAUD. SYN. SAXIF.

No. 5. Naturw. Anzeig. No. 9. p. 65.
Cette espèce me paraît être la même que la *S. Valdensis* De Cand. Fl. fr. tom. 5. p. 517. No. 3564^a, dont je possède un exemplaire de Mr. De Candolle (ex alpibus valdensibus inter Abriès et Pignerol), qui est parfaitement semblable à ceux que j'ai souvent reçus des frères Thomas sous le nom de *S. rupestris*, et de Mr. Bonjean, sous celui de *S. caesia* var. (récoltée au Mont-Cenis sur les rochers des Margeries au dessus de la Ferrière), dont Willdenow fait mention, Spec. tom. 2. p. 642. comme variété de la *S. caesia*. Il me semble que cette plante n'est nullement distincte de la *S. caesia*, et que Willdenow a bien eu raison de ne pas l'en séparer. Toutes les parties sont conformées de la même manière. Les feuilles dans les *Saxifraga caesia* L., *Valdensis* De C., *patens* Gaud. ont la même forme, la même teinte glauque, les mêmes points farineux, ressemblant en quelque sorte aux Soredia des Lichens, les mêmes pores vers leur sommet, la même forme de calice et de

pétales. Les seuls caractères qui semblent les distinguer (et qui pour moi sont de très peu d'importance) sont: des tiges un peu plus courtes, plus grosses et garnies de poils glanduleux, que l'on retrouve encore dans la *S. caesia* lorsqu'elle croît dans des expositions un peu chaudes, et des fleurs moins longuement pédicellées dans les *S. valdensis* et *patens*, que dans la *S. caesia*.

3. SAXIFRAGA CUNEIFOLIA SUBINTEGRA SER. HERB.

Cette variété, à feuilles presque rondes, à peine crénelées, souvent très courtement pétiolées, à tige pauciflore, croît dans les bois secs des pieds des alpes, à la Gemmi et ailleurs.

Les variétés de cette espèce, qui si on voulait les désigner toutes, seraient aussi nombreuses que dans d'autres espèces, ont toutes dans la rosette de feuilles de l'année précédente, des feuilles, qui sont presque toujours d'un beau pourpre-foncé en dessous, une espèce de bordure transparente blanchâtre qui n'est dûe qu'au rendoublement de l'épiderme entre les lames duquel ne se trouve point de parenchyme de la feuille, bordure qui se remarque aussi dans plusieurs des autres espèces de cette section.

4. SAXIFRAGA CUNEIFOLIA DIVERSIFOLIA SER. HERB.

Cette singulière variété, qui se présente et dans l'état spontané et surtout dans l'état cultivé, a les feuilles de sa rosette inférieure spatulées, longuement pétiolées, presque entières, tandis que celles de la rosette supérieure sont presque rondes, aussi longuement pétiolées, au moins une fois plus grandes, fortement crénelées, et ressemblant beaucoup à celles de la *Chrysanthemum leucanthemum atratum* et à celles de la *Saxifraga umbrosa*.