

**Zeitschrift:** Naturwissenschaftlicher Anzeiger der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften  
**Band:** 4 (1820)  
**Heft:** 7

## Titelseiten

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 22.11.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# NATURWISSENSCHAFTLICHER ANZEIGER

der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten  
Naturwissenschaften.



Den 1. Jenner

No. 7.

*Synopsis Hieraciorum in Helvetia sponte  
nascentium.*

Autore J. Gaudin, V. D. M.

(Beschluss.)

\*\* *Caulis foliosus.*

40. *HIERACIUM hyoseridifolium* Vill. —  
H. caule folioso unifloro apice incrassato, fo-  
liis petiolatis runcinatis glabriusculis, calyce  
imbricato hirsuto.

Vill. voy. 11. (obiter.) Catal. H. Argent.  
p. 186. in not. Vill. in not. amat. scient. nat. 1.  
p. 70. tab. 2. (mediocr.) Zollik. ic. lithogr.  
ined. Pers. syn. 2. p. 370. Poir. enc. suppl. 2.  
p. 365. (inter minus cognita.)

*Species nova, insignis ab omnibus distinctis-  
sima. Radix* atrofusca, crassa, brevis, truncata,  
obliqua, fibris crassis, rectis, simplicibus lon-  
gisque stipata. *Caulis* 2-3 uncialis, teres, in-  
ferne tenuis glaberque, superne sensim incre-  
satus, strictus, lanuginoso-pubescens pilisque  
longissimis obsitus, foliosus, uniflorus. *Folia*  
omnia petiolata, laete virentia, fere usque ad  
costam pinnatifido-runcinata, caulis longitudi-  
nem aequantia v. superantia, laciniis utrin-  
que 3-5, scapo retroversis, subinde acutis,  
saepius rotundatis, obtusissimis, integris v.  
sursum denticulatis, lobo terminali integro v.  
trilobo ceteris majore. *Petioli* albi, subulati,  
semunciales et ultra, subinde pilis longis, gra-  
cilibus, albis (ut et foliorum lacinae costae-  
que) ciliati. *Pili* totius herbae perinde graci-  
les et omnino edentuli. *Flos* terminalis, fla-  
vus, maximus, diametro saltem sexunciali.  
*Calix* imbricatus: phylla 3-4 ordinum valde

Ater Jahrg.

inaequalia, late lanceolata, pilis rufis hirsutis-  
sima, atro-liventia, margine membranacea.  
*Flosculi* 2-3 lineas lati. *Semina* brevissima,  
angulata, fere ovalia, dilute castanea. *Pappus*  
copiosus, lacteus, basi tamen subsordidus (ut  
fortasse haecce species ad sectionem priorem  
referenda sit), tenuissime remoteque denticu-  
latus. (D. S.)

Hab. in M. Hohen-Mesmer pagi *Abba-  
tiscellani*, ubi Cl. ZOLLIKERUS primus om-  
nium detexit, qui mihi specimina optima ico-  
nemque suam humanissime suppeditavit. — Fl.  
Julio et Augusto 24.

41. *HIERACIUM prunellaefolium* Gouan. —  
H. caule decumbente ramoso paucifloro, foliis  
subcordatis ovatis petiolisque dentatis.

Hall. helv. 42. Catal. rar. n. 981. — Gouan  
illustr. 57. tab. 22. fig. 3. (optima.) *H. brunel-  
laefolium* Ser. Cichor. n. 20. (Spec. in M.  
*Ventoux* Galloprovinciae lectum, a nostro fo-  
liis facie calyceque tomentosum paululum dif-  
fert.) — *H. pumilum* (non Hoppe) Sut. fl.  
helv. 2. p. 137.

42. *HIERACIUM succisaefolium* Allion. —  
H. caule anguloso apice paniculato, foliis lan-  
ceolatis obsolete dentatis pilosiusculis semiam-  
plexicaulibus: radicalibus oblongis petiolatis.

Hall. helv. 47. Ser. Cichor. n. 14. Allion.  
pedem. n. 747. — *H. molle* Smith brit. 832.  
(descr. aptissima). *H. integrifolium* Hoppe  
in Sturm fl. germ. fasc. 39. (et exs. Cent. 3.  
auct. Cl. CANDOLLO).

43. *HIERACIUM blattarioides* L. — H. fo-  
liis lanceolatis sagittato-amplexicaulibus: auri-  
culis acuminatis, pedunculis axillaribus solita-  
riis unifloris, calyce exteriori maximo laxo.