

Zeitschrift: Archives des sciences [1948-1980]
Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève
Band: 12 (1959)
Heft: 4

Artikel: Sur les faisceaux tangentiels coplanaires de paraboles
Autor: Rossier, Paul
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-739085>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Si nous appelons Δp_i la différence $\bar{p}_i - p_i$, nous aurons :

$$\Delta p_i = \frac{1}{2} R^j_{\cdot jki} \delta q^i \delta' q^k \quad (34)$$

où $R^j_{\cdot jki}$ est le tenseur de Riemann composé par les g_{ik} .

(La suite de cet article paraîtra ultérieurement.)

BIBLIOGRAPHIE

1. B. DE WITT. *Rev. Mod. Phys.*, 29 (1957), p. 386 et suivantes.

*Laboratoire de Recherches nucléaires
Institut de Physique, Genève*

Paul Rossier. — *Sur les faisceaux tangentiels coplanaires de paraboles.*

En coordonnées tangentielles, l'équation d'une parabole est de la forme

$$1) \quad P \equiv au^2 + buv + cv^2 + duw + evw = 0 .$$

La droite impropre du plan est caractérisée par $u = 0$ et $v = 0$.

L'équation (1) contient cinq coefficients homogènes. Soient $P_j = 0$ les équations de cinq paraboles indépendantes et invariables. Le premier membre de l'équation (1) peut être obtenu par une combinaison linéaire et homogène des cinq premiers membres des équations $P_j = 0$:

$$P \equiv \Sigma \lambda_j P_j = 0 .$$

Prenons les cinq coefficients λ_j comme coordonnées homogènes d'un point de l'espace quadridimensionnel. Ainsi est établie une correspondance biunivoque entre les points de cet hyperspace et les paraboles du plan, et aux propriétés des uns correspondent des propriétés corrélatives des autres. Par un exemple, un faisceau de paraboles est représenté par les points

d'une droite de l'hyperespace; trois telles droites possèdent une unique transversale. Corrélativement, trois faisceaux coplanaires de paraboles étant donnés, il existe un unique faisceau de paraboles qui contient une parabole de chacun des faisceaux donnés. Les paraboles d'un faisceau sont tangentes aux trois côtés d'un triangle. Donc, étant donné trois triangles coplanaires, il existe un unique triangle de leur plan tel que trois paraboles, respectivement tangentes aux trois côtés de chacun des triangles donnés soient tangentes aux côtés du quatrième triangle.

ERRATUM

Th. Pcsternak, W. H. Schopfer et Brigitte Boetsch, Archives des Sciences, Vol. 12, p. 468 (1959), 3^e ligne à partir du bas, au lieu de 1,4%, lire 0,14%.
