

Zeitschrift: Beiträge zur nordischen Philologie
Herausgeber: Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien
Band: 39 (2005)

Artikel: Schrift, Schreiben und Wissen : zu einer Theorie des Archivs in Texten von C.J.L. Almqvist
Autor: Müller-Wille, Klaus
Anhang: A. Abbildungen
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-858188>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

A. Abbildungen




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5

C A R O L I L I N N Æ I		L DODECANDRIA <i>Sexus distinctus</i>	
		MONOGYNIA DIGYNIA TRIGYNIA DODECAGYNIA	M. ICOSANDRIA <i>Sexus distinctus</i>
K DECANDRIA <i>Sexus distinctus</i>		H OCTANDRIA <i>Sexus distinctus</i>	
		MONOGYNIA DIGYNIA TRIGYNIA PENTAGYNIA DECAGYNIA	I. ENNEANDRIA <i>Sexus distinctus</i>
G HEPTANDRIA <i>Sexus distinctus</i>		F HEXANDRIA <i>Sexus distinctus</i>	
		MONOGYNIA DIGYNIA TRIGYNIA TETRAGYNIA HEXAGYNIA POLYGYNIA	J. ENNEANDRIA <i>Sexus distinctus</i>
F HEXANDRIA <i>Sexus distinctus</i>		E PENTANDRIA <i>Sexus distinctus</i>	
		MONOGYNIA DIGYNIA TRIGYNIA TETRAGYNIA PENTAGYNIA POLYGYNIA	G. HEPTANDRIA <i>Sexus distinctus</i>
D TETRANDRIA <i>Sexus distinctus</i>		C TRIANDRIA <i>Sexus distinctus</i>	
		MONOGYNIA DIGYNIA TRIGYNIA TETRAGYNIA	B. DIANDRIA <i>Sexus distinctus</i>
A MONANDRIA <i>Sexus distinctus</i>		A MONANDRIA <i>Sexus distinctus</i>	
MONOGYNIA DIGYNIA		MONOGYNIA DIGYNIA	

Abb. 6

MONOECIA TETRANDRIA. 283

T E T R A N D R I A.

URTICA * *Tournef.* 308. *Malp.* 116. Ceraoides *Tournef.* cor. 710
* *Magnifini Flores.*

CAL: *Perianthium* tetraphyllum: *foliis* subrotundis, concavis, obtusis.
COR: *Petala* nulla.
Nectarium in centro floris, urceolatum, integrum, inferne angustius, minimum.

STAM: *Filamenta* quatuor, subulata, longitudine calycis, parva, intra singulum folium calycinum singula. *Antherae* bilobatae.
* *Feminisii Flores* vel in eadem vel in distincta planta.

CAL: *Perianthium* bivalve, ovatum, concavum, erectum, persistens.
COR: nulla.

PIST: *Germen* ovatum. *Stylus* nullus. *Stigma* villosum.

PER: nullum. *Calyx* connivens.

SEM: unicum, ovatum, obculo-compressum, nitidum.

OB: Urtica *T. eff.* *quam calyx femininus obfuscus eff.*
Ceraoides *T. eff.* *cum calyx femininus singula vacuola acuminatus eff.*
Urticoides *Pont. androgyna eff.* Urtica *Pont. vero sexu distincta eff.*

MORUS * *Tournef.* 362. *Malp.* 115. 711

* *Magnifini Flores* in racemum conerti.

CAL: *Perianthium* quadripartitum: *foliis* ovatis, concavis.
COR: nulla.

STAM: *Filamenta* quatuor, subulata, erecta, calyce longiora, intra singulum folium calycinum singula. *Antherae* simpliciter.

* *Feminisii Flores* congesti vel in eadem, vel diversâ planta à masculinis.

CAL: *Perianthium* tetraphyllum: *foliis* subrotundis, obtusis, persistentibus, oppositis duobus exterioribus incumbentibus alternatim reliquis.
COR: nulla.

PIST: *Germen* cordatum. *Styli* duo, subulati, longi, resecti, scabri. *Stigma* simpliciter.
PER: nullum. *Calyx* maximus, carnosus, succulentus factus *Bacca*.
SEM: unicum, ovato-acutum.

Abb. 7

GENUS IV.
Urtica. *Ortie.*

URTICA est plantæ genus, flore A, C apetalo, plurimis scilicet staminibus B calyci insidentibus, constante & sterili: embryones enim D iis speciebus Urticæ innasci solent quæ flore carent, abeuntque deinde vel in capsulam E, I bivalvem F, K, semine feram G, L, in globulos quandoque congestam H, vel abeunt in volvellam M qua comprehenditur semen N.

Urtica. *Ortie*

Abb. 8