

Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Band: 56 (1925-1929)
Heft: 219

Artikel: Note sur l'élevage des hirondelles et des martinets
Autor: Bonjour, J.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-271619>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

**Dr J. Bonjour. — Note sur l'élevage des hirondelles
et des martinets.**

Peut-on élever des hirondelles et des martinets? Au moment où j'ai dû sauver deux martinets noirs (*Cypselus apus*), j'ai trouvé les avis partagés. Deux zoologues qui avaient essayé n'avaient jamais réussi. De ces deux martinets, le premier est mort de faim le sixième jour; il a refusé d'ouvrir le bec et a tout rejeté ce qu'on lui offrait. Le second a été gavé avec de la viande de bœuf crue (4 repas de 2 à 3 gr.) et il a augmenté de 4 gr. en 19 jours (32 gr.). Il s'est enfui par une porte de balcon. Le premier jour où je lui ai fait faire des vols (10 fois 6 à 7 m.), il a perdu 2 gr.

M. Feuillée-Billot, auquel la *Nature* a soumis mon article, confirme mes conclusions et dit que les hirondelles ouvrent le bec au bout de quelques jours et qu'on peut les élever en leur donnant la nourriture; selon lui, les martinets noirs sont plus farouches et ils refusent la nourriture. Il cite que M. Ploch, de La Roche-sur-Yon, en a gardé un quelques semaines plusieurs fois, mais il ne précise pas la façon dont il les a nourris.

Mme Bo.-Ta., de Vevey, m'a donné une observation détaillée sur l'élevage d'un martinet noir qu'elle garda du 28 juillet au 18 septembre. Il refusa la nourriture pendant quatre jours et elle dut le nourrir jusqu'au jour où il s'enfuit; il devint très familier et ouvrait le bec dans lequel elle mettait tous les insectes qu'elle trouvait, mais jamais il ne prit ceux qu'on posait devant lui. Un Lausannois a essayé d'en sauver un de 3 à 4 semaines, mais l'oiseau est mort le sixième jour sans avoir ouvert le bec ni poussé un cri de faim.

Donc, quand on veut sauver ces oiseaux, il vaut mieux attendre qu'ils ouvrent le bec; mais, dès le quatrième ou le cinquième jour, il faut passer à un gavage de force et intro-

duire avec une pincette des insectes, de la viande, de l'œuf cuit jusqu'au fond de la gorge. Le martinet que j'ai sauvé est devenu, malgré le gavage, d'une familiarité excessive.

Dr J. BONJOUR.

Voir articles sur les hirondelles et les martinets dans Buffon (édit. 1835); Guérin (Dict. des Sciences natur., Paris 1835); Fatio (Oiseaux de la Suisse); Frisch. Vorstell. d. Vögel Deutschlands 1743-48; Dr Girtanner Bericht. d. St-Gall. naturw. Ges. 1866-67; Feuillée-Billot, La Nature, 4 sept. 26.
