

**Zeitschrift:** Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera

**Herausgeber:** Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

**Band:** 2 (1903)

**Heft:** 1

  

**Artikel:** Le "boletus subtomentosus" de la région Genevoise

**Autor:** Martin, C.-E.

**Kapitel:** 2: Classification

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-821086>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 14.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## II.

## CLASSIFICATION.

Il est nécessaire, pour mettre un peu d'ordre dans la confusion, de tenter, avant d'aller plus loin, un classement en sous-espèces des individus dont je viens de résumer d'une manière générale les caractères.

Dans le tableau qui suit, les individus récoltés dans la plaine genevoise sont classés d'après leurs caractères. La diagnose se rapporte à l'individu le plus saillant du groupe, les autres individus tendant d'un côté vers le groupe précédent, de l'autre vers le groupe suivant, et l'ensemble formant une chaîne plus ou moins continue allant des formes naines des talus aux formes vigoureuses et amples des bois de chênes.

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Formes petites ou moyennes, solitaires ou cespiteuses; chap. de 1 à 5 cm. . . . .                                      | 2                       |
| Formes plus grandes, solitaires; chap. de plus de 5 cm. . . . .   | 3                       |
| 2. Chair du pied présentant à la base du vermillon orangé . . . . .   | 1. <i>declivatum</i>    |
| Pas de vermillon orangé à la base du pied; chap. de la couleur de <i>B. luridus</i> , au moins dans la jeunesse . . . . . | 2. <i>subluridus</i>    |
| 3. Pied lisse, sublisse, strié, ponctué, sillonné ou côtelé . . . . .   | 4                       |
| P. présentant un réseau à grandes mailles; formes moyennes . . . . .  | 7                       |
| P. finement réticulé; formes amples, robustes . . . . .   | 8                       |
| 4. P. lisse ou sublisse, grêle . . . . .  | 3. <i>sublevipes</i>    |
| P. ponctué . . . . .  | 5                       |
| P. strié, sillonné ou côtelé . . . . .  | 6                       |
| 5. Formes moyennes; chap. ne dépassant pas 6 cm. . . . .  | 4. <i>punctatipes</i>   |
| Formes très vigoureuses; chap. de 15 à 17 cm. . . . .   | 5. <i>validus</i>       |
| 6. Côtes peu anastomosées, ordinairement ponctuées . . . . .  | 6. <i>sulcatipes</i>    |
| Côtes anastomosées, formant une sorte de réseau à mailles en losange très allongées . . . . .                             | 7. <i>costatipes</i>    |
| 7. Ch. brun garance plus ou moins foncé . . . . .   | 8. <i>reticulatipes</i> |
| Ch. fauve doré . . . . .  | 9. <i>flavens</i>       |
| 8. Ch. brun garance plus ou moins foncé . . . . .   | 10. <i>irideus</i>      |
| Ch. d'un rouge plus ou moins vif . . . . .  | 11. <i>cerasinus</i>    |

Un autre classement, fondé sur l'habitat, concorde sensiblement avec celui qu'on vient de voir. Le voici:

<b>Habitat</b>		<b>Sous-espèces</b>		
I.	Sur la terre nue des talus de fossés. Individus petits	1. <i>declivitatum</i>		
II.	Dans l'herbe des prés et des bords de routes	couleur de <i>B. luridus</i> . . . . . 2. <i>subluridus</i>		
		ped grêle, lisse ou sublisse . . . . . 3. <i>sublevipes</i>		
		ped ponctué; ch. ne dépass. pas 6 cm. 4. <i>punctatipes</i>		
III.	Sous les chênes, aussi bien dans les prés que dans les bois; chap. de 15 à 17 cm.; ped ponctué . . . . . 5. <i>validus</i>			
IV.	Dans les forêts	de chênes	ped ayant des sillons, des côtes ou un réseau à grandes mailles; formes moyennes	p. sillonné . . . . . 6. <i>sulcatipes</i>
				réseau en losanges 7. <i>costatipes</i>
				réseau à gr. mailles 8. <i>reticulatipes</i>
				chap. fauve doré . 9. <i>flavens</i>
				chap. brun garance 10. <i>irideus</i>
				chap. rouge plus ou moins vif 11. <i>cerasinus</i>
	de conifères ou de hêtres	{ Le nombre trop restreint des individus ne permet pas de faire des groupements.		