

**Zeitschrift:** Eclogae Geologicae Helvetiae  
**Herausgeber:** Schweizerische Geologische Gesellschaft  
**Band:** 48 (1955)  
**Heft:** 2

**Artikel:** Zur Geologie der Oberen Meeresmolasse von St. Gallen  
**Autor:** Büchi, Ulrich P.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-161959>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 26.11.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Zur Geologie der Oberen Meeresmolasse von St. Gallen

Von Ulrich P. Büchi, Zürich

Mikropaläontologischer Beitrag von H. C. G. KNIPSCHER, München<sup>1)</sup>

Mit 6 Figuren und 14 Tabellen im Text und 1 Tafel XIII)

---

## Vorwort

Ausgangspunkt für die vorliegende Studie war die geologische Neubearbeitung der Siegfriedblätter (topographischer Atlas der Schweiz 1 : 25 000) Rorschach 78, St. Gallen 79, Heiden 80 (diese 3 Blätter sind auf dem neuen Blatt 1075 Rorschach der Landeskarte der Schweiz 1 : 25 000 enthalten), Bauried 81, Rheineck 82, Herisau 219 (= NE-Quadrat von Blatt 1094 Degersheim) und Teufen 222 (= NW-Quadrat von Blatt 1095 Gais). Zur Abklärung gewisser Detailfragen wurde die Kartierung teilweise im Maßstab 1 : 5 000 und 1 : 10 000 durchgeführt, für welchen Zweck mir die Vermessungsdirektion des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements in freundlicher Weise die betreffenden Übersichtspläne zur Verfügung stellte.

Grosser Dank gehört dem Regierungsrat des Kantons St. Gallen, welcher durch einen namhaften Beitrag die Veröffentlichung dieser Publikation ermöglichte.

Besonderes Augenmerk wurde faunistischen Problemen und deren Korrelation zur Fazies geschenkt. In diesem Zusammenhang wurde eine grössere Anzahl von Gesteinsproben gesammelt, welche auf ihre Mikrofauna untersucht wurden.

Näher auf petrographische und lithologische Details, sowie auf das Durchziehen der Leithorizonte einzutreten erübrigt sich, da die Obere Meeresmolasse von St. Gallen dank ihrem Fossilreichtum und den klassischen Aufschlüssen, Sitter-Urnäsch-, Goldach- und Rheintalprofil immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher Studien war. Ich möchte hier nur an die Arbeiten von A. ESCHER VON DER LINTH (1812, 1847), J. C. DEICKE (1851, 1852, 1854, 1859), A. GUTZWILLER (1870, 1871, 1873/74, 1883), A. LUDWIG & CH. FALKNER (1903/4), A. LUDWIG (1916, 1922, 1930), F. SAXER (1936, 1942, 1943), R. RUTSCH (1929), H. H. RENZ (1937/38) und andere erinnern.

---

<sup>1)</sup> Die Bestimmung der Ostracoden wurde in freundlicher Weise von Herrn Dr. FR. GOERLICH, in Firma Deilmann, Bentheim durchgeführt.

## Einleitung

Die Obere Meeresmolasse (Helvétien, Burdigalien) von St. Gallen bildet einen Teil des Hörnlischuttfächers, auch Ur-Rheinschüttung genannt, die mit ihren mächtigen Geröllschüben, deren Spitzen bis an den Bodensee im Osten, im Norden bis an den Rhein und im Westen über den Zürichsee hinaus reichen, die insubrischen Bewegungsphasen im Alpenkörper eindrücklich demonstriert (R. STAUB 1934 und U. BÜCHI 1950). Das vorliegende Untersuchungsgebiet befindet sich am E-Rand des Schuttfächers, wo Nagelfluhen generell zugunsten psammitischer und pelitischer Gesteine zurücktreten.

Mit der Transgression des Meeres zur Zeit des Burdigalien und Helvétien ins mittelländische Molassebecken wurden auch weite Teile des Hörnlifächers überflutet. Besonders das Gebiet von St. Gallen vermittelt uns ein eindrückliches Bild von den wechselvollen Beziehungen zwischen Schüttungen einerseits und Transgressionen bzw. Regressionen andererseits.

Zwischen Glatt (Fluss W-Herisau) und Rheintal wurde von U. BÜCHI & F. HOFMANN (1945) eine starke Mächtigkeitzunahme der marinen Bildungen in östlicher Richtung beschrieben, die auf Senkungsvorgänge im Rheintalquerschnitt beruht. Parallel zur Mächtigkeitzunahme verstärkt sich der marine und brackische Einschlag von der Glatt gegen Osten, wohingegen westlich der Glatt marine oder brackische Sedimente fehlen. Erst am Westrand der Hörnlischüttung im Gebiet zwischen Goldingertobel und Zürichsee treten wieder marine Bildungen auf, während im zentralen Schuttfächer zwischen Glatt und Goldingertobel das Burdigalien und Helvétien fluvioterrestrischen und limnischen Charakter besitzt (H. TANNER 1944, U. BÜCHI 1950, U. BÜCHI & G. WELTI 1951, G. WELTI 1952).

Durch den alpinen Schub wurde längs der von K. HABICHT (1943/45) beschriebenen Randunterschiebung (tektonische Grenze zwischen subalpiner und mittelländischer Molasse, s. U. BÜCHI 1950) die subalpine Molasse gegen und unter die starre Nagelfluhmasse des Hörnlischuttfächers gepresst. Als Folge dieser Unterpressung sind die Schichten der Oberen Meeresmolasse als zyklidartiger, nach oben konkaver Bogen aufgerichtet, mit grösstem nordwestlichem Schichtfallen bis zu 30° im S, das gegen N bis auf 15° abnimmt.

Die heutige Ausbisszone bildet ein bis zu 3 km breites Band, das generell mit N 60° E von der Glatt, südlich Herisau, St. Gallen, Goldach und Rorschach gegen das Rheintal hin durchstreicht.

## Lithologische Gliederung

Die stratigraphische Gliederung der Oberen Meeresmolasse in Burdigalien und Helvétien geht auf R. RUTSCH (1928) zurück, und alle späteren Untersuchungen haben diese Zweiteilung bestätigt.

Anhand vorzüglicher Leithorizonte, wie Dreilindennagelfluh, obere und untere Seelaffe, konnten sowohl das Burdigalien wie das Helvétien weiter unterteilt werden (siehe U. BÜCHI & F. HOFMANN 1945 und U. BÜCHI 1950). Die neuesten Untersuchungen haben gezeigt, dass sich gegenüber der Gliederung, wie sie vom Verfasser 1950 getroffen wurde, einige Modifikationen ergaben, welche in erster

Linie die oberen Teile des Burdigalien umfassen. Dies rechtfertigt, dass die modifizierte lithologische Gliederung auf nachstehender Tabelle nochmals wiedergegeben wird.

Die Zweiteilung des Helvétien in ein oberes und unteres Stockwerk, wobei die Trennungslinie an die Basis der Solitude-Dreilindennagelfluh gelegt werden muss, ergibt sich aus der Tatsache, dass wir zwei deutliche Sedimentationszyklen erkennen können:

1. Freudenbergnagelfluh und Zone der Schiefermergel, welche durch intensive Verkeilungen miteinander verbunden sind, und

2. Solitude-Dreilindennagelfluh, Zone der oberen Plattensandsteine und Obere Grenznagelfluh, die ebenfalls untereinander schöne Verkeilungsphänomene zeigen.

Zwischen der Dreilindennagelfluh und der Zone der Schiefermergel bestehen keine Verkeilungen; zudem lässt sich, besonders eindrücklich zwischen der Goldach und dem Bodensee feststellen, dass diese Nagelfluh, hier als Geröllschnur entwickelt, in transgressivem Kontakt den Schiefermergeln aufliegt. Lokal lassen sich Erosionsdiskordanzen erkennen, die auf einen, wenn auch kurzfristigen Hiatus in der Sedimentation schliessen lassen (siehe S. 310).

Der ganze marine Komplex unter der Freudenbergnagelfluh (Basis des Helvétien) muss aus paläontologischen Gründen (siehe Seite 288) vermutlich ganz ins untere Burdigalien gestellt werden.

Auch im Burdigalien ergibt sich eine deutliche Zweiteilung:

1. in ein oberes Stockwerk, dem fluvioterrestrischen im E brackischen Zwischenkomplex, wo gelbgraugefleckte Mergelserien vorherrschen, und

2. der tiefern, vorwiegend von Plattensandsteinen aufgebauten Zone, welche durch die beiden Seelaffen (subalpiner Muschelsandstein) weiter untergliedert werden kann.

Im Gegensatz zur Gliederung, die vom Verfasser 1950 publiziert wurde, bildet der Zwischenkomplex die höchste Stufe des Burdigalien, indem die Anlage eines Kliffs im Helvétien nicht im gleichen Masse von Erosionserscheinungen begleitet ist, wie damals postuliert wurde. Das sogenannte marine Oberburdigalien (U. BÜCHI 1950) ist lediglich ein westlicher Ausläufer des obersten Teiles der Zone der mittleren Plattensandsteine.

Auf die Details, die zu dieser neuen Konzeption führten, wird in anderem Zusammenhang zurückzukommen sein.

## Paläontologie

### DIE MAKROFOSSILIEN

Die Obere Meeressmolasse von St. Gallen zeichnet sich durch eine grosse Anzahl von Fossilfundstellen aus. Der Arten- und Individuenreichtum einzelner Lokalitäten, wie Muschelberg im Hagenbuch (SE St. Gallen), Felsenkeller an der Speicherstrasse (Strasse von St. Gallen nach Speicher-Trogen), Mühleggtunnel und Stocken-Kräzern (an der Sitter), um nur die wichtigsten zu nennen, ist enorm, konnten doch allein in diesen vier Fundstellen an Gastropoden und Pelecypoden



Tabelle 1

	Glatt	Sitter-Urnäsch	St. Gallen St. Georgen	Goldach	Wittenbach S-Rorschach	Rheintal
			Goldbrunnen-Schichten			
			Obere Grenzagnelfluh			
	Fluvioterrestrisches Helvétien		Zone der oberen Plattensandsteine			
			Solitude-Dreilinden-Nagelfluh			
			Zone der Schiefermergel			
			Freudenbergnagelfluh			Basis-Sandstein
			burdigaler fluvioterrestrischer, im Erackischer Zwischenkomplex			
			Nagelfluhdoppelbank = Biserhofnagelfluh Kamelenbergnagelfluh			
			fluvioterrestrisches Burdigalien			
			Zone der mittleren Plattensandsteine			
			Zone der oberen Flözgruppe			
			Nagelfluh mit seelaffähnlichen Bildungen an der Basis = Obere Seelaffe von Blatten-Staad			
			fluvioterrestrisches Burdigalien			
			Untere Plattensandsteine			
			Hautetennagelfluh = Untere Seelaffe			
			fluvioterrestrisches Burdigalien			
			Zone der untersten Plattensandsteine			
			Zone der unteren Flözgruppe			
			Burdigales Basiskonglomerat			
						Basis-Sandstein
Unteres Burdigalien						
Unteres Burdigalien						
[Oberes?] Unteres Helvétien						
Oberes Helvétien						

an die 100 Arten bestimmt werden. Immer wieder waren die Fossilien der st. gallischen Meeresmolasse Gegenstand eingehender Studien, und ich möchte hier nur an die Fossilisten von K. MAYER (1872), A. GUTZWILLER (1883), A. LUDWIG & CH. FALKNER (1901/3), A. FANCK (1929), R. RUTSCH (1929), H. H. RENZ (1937/38) und U. BÜCHI (1950) erinnern. Im einzelnen kann daher auf eine Aufzählung der Arten verzichtet werden.

Um sich ein Bild über die Verteilung der einzelnen Fossilfundstellen innerhalb des Schichtprofils machen zu können, dient das nachstehende Verzeichnis der Fundstellen, unter Angabe neuer Fossilfunde und Anzahl der bisher beschriebenen Arten.

#### Burdigales Basiskonglomerat

Nagelstein, Koord. 759,275/260,02, Seelaffe, geröllführend: *Pecten* sp. indet., *Cardium* sp. indet., *Ostrea (Crassostrea) gryphoides* SCHLOTH., *Odontaspis* sp. indet.

Station Tobel-Wienacht, Koord. 758,4/259,3, Nagelfluh mit Plattensandstein verkeilt: *Pecten* sp. indet. (H. H. RENZ 1937/38)

Wald E-Ladern, Koord. 748,34/253,675, grauer Mergel: *Heliciden* (U. BÜCHI 1950)

Steinbruch an der Strasse Riethüsli-Lustmühle, Koord. 745,15/251,975, graue Mergel reich an Kalkalgen:

Pelecypoda: 1 limnische Art

Gastropoda: 1 limnische, 2 terrestrische Formen

Mammalia: 1 terrestrische Art (U. BÜCHI 1950)

#### Zone der untersten Plattensandsteine

Nagelstein, Koord. 759,275/260,03, geröllführender Plattensandstein:

Pelecypoda: *Thracia* sp. indet., *Cardium* sp. indet.

Wittenbach, Koord. 754,285/257,175, Nagelfluh:

Pelecypoda: 1

Goldach, Koord. 750,55/255,775, Kohlenflöz innerhalb grauer Mergel:

Gastropoda: 2 limnische, 4 terrestrische Formen

Goldach, Koord. 750,8/255,83, Strandagglomerat:

Pelecypoda: 2

Gastropoda: 1 marine und 1 terrestrische Art

Reptilia: ca. 5 cm langer Zahn von *Crocodylus*

Wattwald, Koord. 745,25/252, 225, graugrüner Mergel, reich an Pyrit:

Pelecypoda: *Unio flabellatus* GOLDF.

#### Untere Seelaffe

Durchgehend führt dieser Leithorizont Cardien, Pecten und Ostreen, im einzelnen sind zu erwähnen:

Goldach, Koord. 750,5/255,86: Pisces: 2 (U. BÜCHI 1950)

Tannacker, Koord. 752,3/256,39: Pisces: 1 (U. BÜCHI 1950)

Pelecypoda: *Ostrea (Crassostrea) gryphoides* SCHLOTH.

Wittenbach, Koord. 754,2/257,45: Pisces: 1 (U. BÜCHI 1950)

### Zone der unteren Plattensandsteine

Rorschacherberg bis Rheintal, Seelaffehorizont, ca. 40 m unter der oberen Seelaffe:

Pelecypoda: *Ostrea* sp. indet., *Cardium* sp. indet., *Ostrea* sp. indet.

Goldach, Koord. 750,225/256,225, Plattensandstein:

Pelecypoda: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)

Goldach, Koord. 750,23/256,05, Plattensandstein:

Pelecypoda: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)

Goldach, Koord. 750,29/255,975, Geröllschnur, östlicher Ausläufer der Ringelsberg-nagelfluh:

Pelecypoda: *Cardium* sp. indet.

Kurzegg, Koord. 749,15/254,535, Ringelsberg-nagelfluh:

Pelecypoda: *Cardium* sp. indet.

Kapf, Koord. 748,875/254,225, seelaffeähnlicher Sandstein:

Pelecypoda: 1 (U. BÜCHI 1950)

Steingrübli, Koord. 747,125/253,475, Ringelsberg-nagelfluh:

Pelecypoda: *Cardium* sp. indet.

Steinbruch Beckenhalde, Koord. 746,825/253,8, Mergellinse innerhalb der Plattensandsteine:

Pelecypoda: 3

Gastropoda: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)

Napfwald, Koord. 746,0/252,65, Plattensandstein:

Pelecypoda: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)

Riethüsli, Koord. 745,725/252,7, 3 m grauer Kalkmergel innerhalb der Ringelsberg-nagelfluh:

Gastropoda: 1 terrestrische Form (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)

Wattwald, Koord. 743,75/251,75, geröllführender Sandstein:

Pelecypoda: *Cardium* (*Cerastoderma*) *edule* L. var. indet.

Wattwald, Koord. 744,725/252,125, Plattensandstein:

Pelecypoda: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)

Wattwald, Koord. 744,7/252,475, geröllführender Sandstein:

Pelecypoda: *Cardium* sp. indet., *Ostrea* (*Crassostrea*) *gryphoides* SCHLOTH.

Wattwald, Koord. 745,325/252,34, geröllführender Plattensandstein:

Pelecypoda: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)

Zweibruggen, Sitter, Koord. 743,4/251,675, Ringelsberg-nagelfluh in Plattensandstein verkeilt:

Pelecypoda: 1 (U. BÜCHI 1950)

Sitter, Koord. 743,075/251,61, Plattensandstein:

Pelecypoda: 1 (U. BÜCHI 1950)

### Obere Seelaffe

Blatten-Staad, Koord. 759,1/261,0:

Pelecypoda: 4

Pisces: 17

Reptilia: 2

Mammalia: 2 marin-litorale, 1 terrestrische Art (H. H. RENZ 1937/38)

Goldach, Koord. 750,2/256,3:

Crustacea: 1

Pelecypoda: 4

Gastropoda: 2

Pisces: 1

Mammalia: 1 terrestrische Art (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3;  
U. BÜCHI 1950)

Riethüsli, Koord. 745,525/252,65:

Pelecypoda: 3

Reptilia: 2 (U. BÜCHI 1950)

In der Held, Koord. 744,1/251,95:

Pelecypoda: 3

Pisces: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)

Sitter, Koord. 743,075/251,62, seelaffeähnlicher Plattensandstein:

Pelecypoda: 2 (U. BÜCHI 1950)

Urnäsch, Koord. 742,5/251,41, seelaffeähnlicher Plattensandstein:

Pelecypoda: 3 (U. BÜCHI 1950)

Sturzenegg, Koord. 742,3/251,05, seelaffeähnliche Bank, innerhalb der Nagelfluh:

Pelecypoda: *Cardium (Cerastoderma) edule* L. var. indet.

*Tapes (Callistotapes) vetulus* BAST.

Sturzenegg, Koord. 742,2/251,0, seelaffeähnlicher Plattensandstein:

Pelecypoda: 2

Gastropoda: 1

Pisces: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)

W-Sturzenegg, Koord. 742,0/250,72, seelaffeähnlicher Plattensandstein:

Pelecypoda: 1 (U. BÜCHI 1950)

#### **Zone der mittleren Plattensandsteine-Obere Flözgruppe**

Rorschach, Seelaffebank:

Pelecypoda: *Ostrea* sp. indet., *Pecten* sp. indet., *Cardium* sp. indet.

St. Georgen, Biserhof, Koord. 746,85/253,6, Plattensandsteine:

Pelecypoda: *Tapes (Callistotapes) vetulus* BAST.

*Cardium* sp. indet., *Ostrea* sp. indet.

*Solen* sp. indet.

St. Georgen, Weiher bei der Schokoladefabrik, Koord. 746,925/253,53, Plattensandstein:

Pelecypoda: 2 (U. BÜCHI 1950)

St. Georgen, Weiher bei der Schokoladefabrik, Koord. 747,0/253,58, Plattensandstein:

Pelecypoda: 1

Gastropoda: 1 (terrestrische Form) (U. BÜCHI 1950)

Riethüsli, Koord. 745,46/252,645, Plattensandstein:

Pelecypoda: 1 (U. BÜCHI & F. HOFMANN 1945)

Sitter, Koord. 743,025/251,65, Plattensandstein:

Pelecypoda: *Cardium* sp. indet.

Urnäsch, Koord. 742,475/251,47, Plattensandsteine:

Pelecypoda: 2

Gastropoda: 1 (U. BÜCHI 1950)

*Natica* sp. indet.

Obere Kohlenflözgruppe mit kohlig-kalkigem und kohlig-kieseligem Begleitgestein; durchgehender Horizont von St. Georgen bis Sturzenegg (siehe U. BÜCHI & F. HOFMANN 1945):

Gastropoda: *Planorben*, selten *Heliciden*

### Burdigaler Zwischenkomplex

Kräzerntobel bei Loch, Koord. 754,36/259,07, kohliger Kalk:

Gastropoda: 1 (limnische Form) (U. BÜCHI & F. HOFMANN 1945)

Goldach, Koord. 750,275/256,66, grauer etwas kohliger Mergel:

Gastropoda: 3 (terrestrische Formen)

Reptilia: 1 (terrestrische Form)

Mammalia: 6 (terrestrische Formen)

(U. BÜCHI & F. HOFMANN 1945)

Gitzibühl, Koord. 749,325/255,3, grauer Mergel:

Gastropoda: 2 terrestrische Formen

Reptilia: 1 terrestrische Form

Mammalia: terrestrische Formen (nicht näher untersucht)

Sitter, Koord. 742,3/251,7, grauer Mergel:

Gastropoda: 2 (U. BÜCHI 1950) (limnische Formen)

Bach W-Engelen, kohliger Kalk in grauen Mergeln:

Pelecypoda: 1 (limnische Form)

Gastropoda: 1 (limnische Form)

### Freudenbergnagelfluh, Helvétienbasis

Hurlibuck (Riff im See) Staad, Koord. 758,3/261,33, geröllführender Sandstein, lokal Seelaffe-Habitus:

Pelecypoda: *Pecten (Gigantopecten) gallicus* MAYER

*Chlamys (Aequipekten) seniensis* LAM. var. *elongatula* SACCO

*Meretrix (Callista) lilacinoides* SCHAFFER

*Ostrea* sp. indet.

Gastropoda: *Calliostoma* sp. indet.

Pisces: 1 (U. BÜCHI 1950)

Bach oberhalb Vogtleuten, Koord. 752,85/257,6, geröllführender Sandstein:

Pelecypoda: *Cardium (Cerastoderma) edule* L. var. indet.

*Cardium (Trachycardium) multicostatum* BROCCHI

*Ostrea* sp. indet.

Bach im Frauenwald, oberhalb Untereggen-Vorderhof, Koord. 752,2/257,4, geröllführender Sandstein:

Pelecypoda: *Ostrea tegulata* MUENSTER

*Ostrea* sp., kleine Art

*Cardium* sp. indet.

Goldach, Martinstobel, Koord. 750,275/256,65, Nagelfluh mit Sandstein ver-  
keilt:

Pelecypoda: *Ostrea* sp. indet.

Freudenberg, Pt. 826,1, Koord. 746,85/253,9, Sandsteine an der Basis der  
Nagelfluh:

Pelecypoda: 2 (U. BÜCHI 1950)

St. Georgen (Baugrube), Koord. 746,375/253,75, oberster Teil der Nagelfluh:

Pelecypoda: *Tapes (Callistotapes) vetulus* BAST.

*Meretrix (Cordiopsis) intercalaris* COSSM. & PEYROT

Gastropoda: *Nassa* sp. indet.

### Zone der Schiefermergel

Bach im Frauenwald, oberhalb Untereggen-Vorderhof, Koord. 752,0/257,525,  
geröllführender Sandstein. Zone der Schiefermergel:

Pelecypoda: *Pecten (Gigantopecten) gallicus* MAYER

*Tapes (Callistotapes) vetulus* BASTEROT

*Pholodomya* cf. *Alpina* MATHERON

*Cardium praecellens* MAYER

*Cardium (Trachycardium) multicoatum* BROCCHI

*Meretrix (Cordiopsis) intercalaris* COSSM. & PEYROT

Gastropoda: *Turritella (Haustator) doublieri* MATHERON

Bettlerenbach, Koord. 753,025/258,3, Schiefermergel:

Pelecypoda: *Tapes* sp. indet.

Bettlerenbach, Koord. 753,125/258,225, Schiefermergel:

Pelecypoda: *Cardium (Trachycardium) multicoatum* BROCCHI

*Tapes (Callistotapes) vetulus* BAST.

*Pecten* sp. indet.

*Ostrea* sp. indet.

Strässchen Untereggen-Eggersriet, ?, Schiefermergel:

Pelecypoda: 8 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)

Goldach, Martinstobel, Koord. 750,25/256,75, Schiefermergel:

Anthozoa: eine nicht näher bestimmbare Korallenart

Pelecypoda: 15

*Pecten Hornensis* DEPERET-ROMAN

*Meretrix (Callista) lilacinoides* SCHAFFER

Gastropoda: 9 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3, R. RUTSCH 1929, U.  
BÜCHI 1950)

Notkersegg, Koord. 748,0/254,55, Schiefermergel:

Crustacea: 2

Pelecypoda: 2

Gastropoda: 15 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)

Felsenkeller Speicherstrasse, 747,5/254,6, Schiefermergel:

Anthozoa: 1

Scaphopoda: 1

Pelecypoda: mindestens 30



- Gastropoda: mindestens 30  
 Bryozoa: 2  
 Brachiopoda: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3, R. RUTSCH 1929)
- Scheitlinsbüchel, Koord. 747,6/254,4, Schiefermergel:  
 Pelecypoda: 2  
 Gastropoda: 1 (U. BÜCHI 1950)
- Bavaria, Koord. 747,25/245,5, Schiefermergel:  
 Gastropoda: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)
- Totenweiher: 747,4/254,43, Schiefermergel:  
 Pelecypoda: 5  
 Gastropoda: 2 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3, U. BÜCHI 1950)
- Dreilinden, ?, wahrscheinlich Schiefermergel, evtl. Dreilindennagelfluh:  
 Anthozoa: 1  
 Annelida: 1  
 Pelecypoda: 1  
 Gastropoda: 18 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3, R. RUTSCH 1929)
- Mühlegg, St. Georgen, Koord. 746,5/253,9, Schiefermergel:  
 Annelida: 1  
 Crustacea: 1  
 Pelecypoda: mindestens 20  
 Gastropoda: mindestens 20 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3, R. RUTSCH 1929)
- Bernegg, Koord. 746,2/253,625, Plattensandsteine:  
 Pelecypoda: 2 (U. BÜCHI 1950)
- Neues Reservoir an der Teufenerstrasse, Koord. 745,325/253,34, Plattensandsteine:  
 Pelecypoda: 7  
 Gastropoda: 1 (U. BÜCHI 1950)
- Nest Reservoir, ?:  
 Pelecypoda: 12  
 Gastropoda: 6 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)
- Sitter-Kubel, Koord. 742,265/251,82, Schiefermergel:  
 Crustacea: 2  
 Scaphopoda: 1  
 Pelecypoda: über 20  
 Gastropoda: über 30 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3, R. RUTSCH 1929)
- Bach W-Engelen, Koord. 741,375/251,0, Schiefermergel:  
 Pelecypoda: 5  
 Gastropoda: 5 (U. BÜCHI 1950)  
*Trigonostoma (Ventrilia) acutangulum (Faujas de Saint Fond)*  
 var. indet.
- Walketobel, koord. 740,775/250,6, Schiefermergel:  
 Gastropoda: *Turritella turris* BAST. var. *Studeri* MAYER  
*Turritella (Haustator) doublieri* MATH.

Schloss an der Glatt, Koord. 738,2/249,2, Schiefermergel:  
 Pelecypoda: 2  
 Gastropoda: 1 (U. BÜCHI 1950)

**Solitude-Dreilindennagelfluh**

Wasserstollen Sulzberg, Koord. 754,0/259,1, Geröllschnur:  
 Pelecypoda: 3  
 Goldach, Koord. 750,2/256,76, Geröllschnur:  
 Pelecypoda: *Cardium (Cerastoderma) edule* L. var. indet.  
 Bavaria, Koord. 747,325/254,525, Nagelfluh:  
 Pelecypoda: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)  
 Hochwachtstrasse, Koord. 744,1/253,0, Nagelfluh:  
 Gastropoda: 3 (U. BÜCHI 1950)  
*Turritella turris* BAST. var. *Studerii* MAYER  
*Turritella (Haustator) doublieri* MATH.

**Zone der oberen Plattensandsteine**

Hagenbuch, Muschelberg, Koord. 747,95/254,925 (Hauptlokalität), die sandige Fossilbank lässt sich über einige hundert Meter verfolgen:  
 Anthozoa: 1  
 Crustacea: 3  
 Pelecypoda: über 50  
 Gastropoda: über 50  
 Bryozoa: 2  
 Echinozoa: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3, R. RUTSCH 1929, U. BÜCHI 1950)  
 Felsenkeller Hagenbuch, Koord. 747,96/254,84, Schiefermergel und Plattensandstein:  
 Pelecypoda: über 15 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)  
 Tivoli, Koord. 747,85/254,74, ?:  
 Pelecypoda: über 10  
 Steingrube, Koord. 747,3/254,65, wahrscheinlich Sandsteine, heute nicht mehr aufgeschlossen:  
 Spongiaria: 1  
 Anthozoa: 1  
 Annelida: 2  
 Crustacea: 2  
 Scaphopoda: 2  
 Pelecypoda: über 50  
 Gastropoda: über 50  
 Bryozoa: 3  
 Pisces: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3, R. RUTSCH 1929)  
 Mühleggtunnel, Koord. 746,4/254,0—254,15, bei den Fundortsangaben wird kein bestimmtes Niveau genannt. Ein Teil der Fossilien entstammt somit

auch der Dreilindennagelfluh und dem obersten Teil der Zone der Schiefermergel:

Annelida: 1

Crustacea: 1

Pelecypoda: über 30

Gastropoda: über 50 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3, R. RUTSCH 1929, U. BÜCHI 1950)

Mülitobel, Koord. 746,31/253,96, subaquatische Rutschung innerhalb der Plattensandsteine:

Pelecypoda: *Cardium* sp. indet.

*Tapes* sp. indet.

Menzeln, Koord. 744,1/252,4, Plattensandsteine:

Pelecypoda: 5

Gastropoda: 6 (U. BÜCHI 1950)

Menzeln, Koord. 744,03/252,475, Schiefermergel:

Pelecypoda: 2

Gastropoda: 3 (U. BÜCHI 1950)

*Pirula (Urosyca) burdigalensis* SOWERBY

Kräzern, Stocken, Koord. 742,25/251,925, Plattensandstein, z. T. Schiefermergel:

Anthozoa: *Madreporaria* nicht näher bestimmbar

Crustacea: 1

Pelecypoda: über 30

Gastropoda: über 40

Echinozoa: 2

Pisces: 2 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3, R. RUTSCH 1929, U. BÜCHI 1950)

Gübsenweiher, Koord. 742,075/251,635, Sandsteine z. T. mergelig:

Pelecypoda: 2

Gastropoda: 3 (U. BÜCHI 1950)

Bach W-Engelen, Koord. 741,31/251,125, Plattensandsteine:

Pelecypoda: *Cardium* sp. indet.

Moosbergbach, Koord. 740,1/250,275, Plattensandstein mit seelaffeähnlicher Fossilbank:

Pelecypoda: 6

Gastropoda: 1 (U. BÜCHI 1950)

Steinbruch SE-Herisau, Koord. 739,87/250,075, Plattensandstein mit seelaffeähnlicher Fossilbank:

Pelecypoda: 4 (U. BÜCHI 1950)

### Obere Grenznagelfluh

Steinbruch Hof Tablat, Koord. 748,62/255,44, Sandsteine mit Nagelfluh verkeilt:

Pelecypoda: 2 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3, U. BÜCHI 1950)

*Cardium (Cerastoderma) edule* L. var. indet.

*Cardium praecellens* MAYER

Mülitobel, Koord. 746,3/253,97, Nagelfluh mit Sandstein verkeilt:

Pelecypoda: 1 (U. BÜCHI 1950)

Goldbrunnen, Koord. 747,8/255,0, Schiefermergel:

Pelecypoda: 1 (A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3)

*Cardium (Trachycardium) multicosatum* BROCCHI

*Cardium (Cerastoderma) edule* L. var. indet.

*Cardium praecellens* MAYER

*Tapes (Callistotapes) vetulus* BAST.

*Ostrea* sp. indet.

*Pecten* sp. indet.

Gastropoda: *Turritella (Haustator) doublieri* MATHERON

*Natica* sp. indet.

Aus der Zusammenstellung der Fossilfundstellen (S. 270–272) geht deutlich hervor, dass artenreiche Fundlokalitäten auf das Helvétien beschränkt sind. Daraus darf jedoch ein mehr brackisches Ablagerungsmilieu für die Zeit des Burdigalien nicht abgeleitet werden, da litoral-marine Makrofossilien sich in fast allen Zonen des Burdigalien nachweisen liessen (siehe Tabelle 2, S. 270–272, und U. BÜCHI 1950).

Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass einzig der burdigale Zwischenkomplex keine litoralen oder marinen Makrofossilien führt, weshalb er seinerzeit als fluvio-terrestrische Bildung angesprochen wurde (U. BÜCHI & F. HOFMANN 1945, U. BÜCHI 1950). Erst die Untersuchung der Mikrofauna ergab (siehe S. 276), dass Teile dieser Zone in brackischem Milieu zur Ablagerung gelangten.

Allgemein fehlen im Burdigalien artenreiche Fundstellen, wofür die Ursache in den Ablagerungsbedingungen gesucht werden muss. Die Fundstellen beschränken sich fast ausschliesslich auf die Seelaffen<sup>2)</sup>, Geröllbänder, Basis der Nagelfluhbänke und die seltenen Mergelhorizonte, während die am Aufbau des Burdigalien massgebend beteiligten Plattensandsteine meist völlig steril sind. Die Ablagerung der Geröllhorizonte, wie auch die Seelaffen, die ja gegen Westen häufig in Nagelfluhen übergehen, ist auf Reaktivierung der Transportkraft der östlichen Deltaarme des Ur-Rheins, als Folge ruckartiger Senkungen im Rheintalquerschnitt, zurückzuführen. Dabei kam es zu einer Zusammenschwemmung und rascher Einbettung der Faunen.

Dagegen sind die Plattensandsteine Zeugen relativ ruhiger Sedimentation ohne nennenswerte ruckartige Senkungsvorgänge. Rippelmarken, Prielen, Kriechspuren u.a.m. sprechen für Wattenmeerverhältnisse zur Zeit ihrer Ablagerung (siehe hiezu auch J. SPECK 1946). Die geringe Zufuhr von Sand und Schlammmaterial vom Festlande her, sowie die Einwirkung der Gezeitenströmungen schuf Verhältnisse, die für die Fossilisierung denkbar ungünstig waren; so handelt es sich bei Fossilfunden in den Plattensandsteinen meist nur um schlecht erhaltene Einzelstücke.

Im Gegensatz zum Burdigalien zeichnet sich das Helvétien durch artenreiche Fundstellen aus, doch beschränken sich diese auf das Gebiet zwischen Herisau und der Goldach. Trotz ähnlicher lithologischer Ausbildung sind Fossilfunde in der Zone der Schiefermergel östlich der Goldach selten, und zudem lassen sich nur

<sup>2)</sup> Lokalname für die Muschelsandsteinhorizonte am Bodensee bei Staad.

Tabelle 2. Übersicht über das Auftreten der Fossilien in den einzelnen Zonen der Oberen Meeresmolasse

		Burdigalien					Helvétien					
		Burdigales Basiskonglomerat	Unterste Plattensandsteine	Oberer Seelaufe – Untere Plattensandsteine – Untere Seelaufe	Oberer Flözgruppe	Mittlere Plattensandsteine	Burdigaler Zwischenkomplex	Frendenbergnagelfluh	Zone der Schiefermergel	Dreilindennagelfluh	Oberer Plattensandstein	Oberer Grenznapelfluh
Spongiaria Kalkschwämme	oberste Meereszone, oft im Gezeitenbereich . . . . .											
Anthozoa . . . . .	marin. . . . .											
Echinoidea . . . . .	marin. . . . .											
Vermes Serpula . . . . .	marin. . . . .											
<b>MOLLUSCOIDEA</b>												
Bryozoa . . . . .	marin. . . . .											
Brachiopoda . . . . .	(Lingula) marin-litoral . . . . .											
<b>PELECYPODA:</b>												
Clavagellidae . . . . .	marin. . . . .											
Thraciidae . . . . .	marin. . . . .											
Pholadomyidae . . . . .	marin. . . . .											
Pholadidae . . . . .	litoral-marin . . . . .											
Teredidae . . . . .	marin. . . . .											
Gastrochaenidae . . . . .	marin. . . . .											
Myidae . . . . .	marin-litoral-brackisch . . . . .											
Glycymeridae . . . . .	marin-litoral . . . . .											
Solenidae . . . . .	marin-litoral-brackisch . . . . .											
Mactricidae . . . . .	marin-litoral-brackisch Seichtwasser, im Schlamm oder Sand eingegraben . . . . .											
Tellinidae . . . . .	marin-litoral-brackisch . . . . .											
Psammobiidae . . . . .	marin. . . . .											
Veneridae . . . . .	marin-litoral-brackisch . . . . .											
Cardiidae . . . . .	marin vorw.; ertragen grosse Änderung des Salzgehaltes, bis fast ausgesüsst . . . . .											
Chamidae . . . . .	marin, meist festgewachsen . . . . .											
Ungulidae . . . . .	marin. . . . .											
Carditidae . . . . .	marin. . . . .											
Nayadidae . . . . .	limnisch . . . . .											
Arcidae . . . . .	marin. . . . .											
Nuculidae . . . . .	marin. . . . .											
Mytilidae (Dreissensia) . . . . .	marin (brackisch-limnisch) . . . . .											
Aviculidae . . . . .	litoral, bevorzugte Tiefen von 8–20 m . . . . .											
Pernidae . . . . .	marin. . . . .											
Pinnidae . . . . .	litoral, kaum über 100 m Tiefe, stille Buchten mit Schlammgrund . . . . .											

Fundort nicht näher bezeichnet

Fundort nicht näher bezeichnet







wenige Arten nachweisen, vorwiegend Pelecypoden. Noch deutlicher kommt dieser Unterschied zwischen Ost- und Westgebieten in der Zone der Oberen Plattensandsteine zum Ausdruck. Während sich die arten- und individuenreichsten Fundstellen im Gebiet von Hagenbuch und Steingrube (S-Rand der Stadt St. Gallen) befinden, ist schon an der Goldach und von hier bis an den Bodensee der gesamte Komplex völlig steril. Einzig die Geröllschnur an der Basis der Plattensandsteine (Dreilindennagelfluh) führt vereinzelt *Ostreen*, *Cardien* und *Pecten*.

Während für diese Zone die Plattensandsteinfazies mitverantwortlich für die Fossilarmut gemacht werden kann, müssen für die Zone der Schiefermergel andere Faktoren bestimmend gewesen sein, da keine nennenswerten lithologischen Veränderungen von W nach E feststellbar sind. Das Überwiegen mergeliger Gesteine scheint somit nicht primär der Grund für die Fossilanhäufungen westlich der Goldach zu sein, sondern in erster Linie die Küstennähe der Westgebiete. Stille Buchten, die Ästuarien der Flüsse und die zeitweise geringe Zufuhr von Schwemmstoffen vom Festlande her schufen Verhältnisse, die eine üppige Entwicklung der Faunen begünstigten, andererseits aber durch plötzliche Veränderung des Salzgehaltes durch Zufuhr von Süßwasser bei Reaktivierung der Transportkraft der Deltaarme zu Massensterben der Faunen und rascher Einsedimentation führten.

#### DIE MIKROFAUNEN<sup>3)</sup>

(H. C. G. KNIPSCHER)

#### Zusammenstellung der untersuchten Gesteinsproben

- Probe V 211: Steinbruch an der Strasse Riethüsli-Lustmühle, Koord. 745,175/251,98. Graue Mergel reich an Kalkalgen, mit limnischer Makrofauna:  
Zwischen mittlerer und oberer Nagelfluhbank, des burdigalen Basiskonglomerates.  
Sehr spärliche Mikrofauna:  
*Rotalia beccarii* (L.)  
*Globigerina* sp.  
*Globorotalia* cf. *crassata* (CUSHM.) (umgelagert aus dem Eozän!).  
*Ostracoda*  
Im Schlämmrückstand Glaukonit. Brackisch-litorale Faunengemeinschaft.
- Probe V 212: Gleiche Lokalität, gleiches Gestein.  
Sehr spärliche Mikrofauna:  
*Globigerina* sp.  
*Globorotalia* cf. *crassata* (CUSHM.) } umgelagert aus dem Eozän.  
*Cibicides lobatulus* (W. & J.)  
*Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
*Cibicides* sp.  
Im Schlämmrückstand Glaukonit. Brackisch-litorale Faunengemeinschaft.
- Probe V 218: Strasse Grub-Wienacht, Koord. 756,93/258,27. Erstes graues Mergelband über dem burdigalen Basiskonglomerat.  
Zone der untersten Plattensandsteine.  
Sehr spärliche Mikrofauna:  
*Dentalina* sp.  
*Bolivinooides* aff. *concinna* KNIP. & MART.  
*Rotalia beccarii* (L.)

<sup>3)</sup> Belegmaterial der bearbeiteten Mikrofaunen, unter den aufgeführten Nummern, sind im Bayerischen Geologischen Landesamt München aufbewahrt.

- Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
*Echinidenstacheln*  
 Brackisch-marine Faunengemeinschaft (brachyhalines Meerwasser).
- Probe V 219: Gleiche Lokalität. Zweite graue Mergelzone über dem burdigalen Basiskonglomerat (bräunliche Mergel).  
 Zone der untersten Plattensandsteine.  
 Sehr spärliche Mikrofauna:  
*Rotalia* sp.  
*Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
*Echinidenstacheln*  
 Brackisch-litorale Faunengemeinschaft.
- Probe V 220/1: Gleiche Lokalität, gleiche Zone.  
 Mikrobefund wie in Probe 219, dazu Glaukonit im Rückstand.
- Probe V 214: Witenbach, Koord. 754,35/257,075. Gelb-grau gefleckter Mergel.  
 Zone der untersten Plattensandsteine.  
 Mikrofossilleer. Nach dem Schlämmrückstand limnisch.
- Probe V 215: Witenbach, Koord. 754,3/257,125. Grauer Mergel.  
 Zone der untersten Plattensandsteine.  
 Individuenreiche aber artenarme Mikrofauna:  
*Elphidium* cf. *minutum* (REUSS)  
*Rotalia beccarii* (L.)  
*Rotalia* sp.  
*Haplocytheridea dacica elegantior* GOERL.  
*Xestoleberis* sp.  
*Cytheromorpha* aff. *zinndorffi*  
 Brackische (litorale) Faunengemeinschaft.
- Probe V 217: Gleiche Lokalität und Zone.  
 Individuenreiche aber artenarme Mikrofauna:  
*Nonion* ? sp.  
*Elphidium* cf. *minutum* (REUSS)  
*Rotalia* sp.  
 Brackische (litorale) Faunengemeinschaft.
- Probe V 43: Goldach, Koord. 750,575/255,75. Grauer Begleitmergel der unteren Kohlenflözgruppe, limnische Makrofauna.  
 Zone der untersten Plattensandsteine.  
 Individuenreiche aber artenarme Mikrofauna:  
*Nonion* sp.  
*Elphidium* cf. *minutum* (REUSS)  
*Rotalia beccarii* (L.)  
*Rotalia* sp.  
*Kleingastropoden*  
 Brackische Faunengemeinschaft.
- Probe V 328: Wattbach, Koord. 745,25/252,225. Graugrüner Mergel, reich an Pyrit, mit limnischer Makrofauna.  
 Zone der untersten Plattensandsteine.  
 Mikrofossilleer.
- Probe V 41: Goldach, Koord. 750,275/256,05. Plattensandsteine.  
 Zone der unteren Plattensandsteine.  
 Spärliche Mikrofauna:  
*Cassidulina* sp.  
*Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
*Globigerina* sp.  
 Litorale Faunengemeinschaft.

- Probe V 183: Urnäsch, Koord. 742,525/251,35. Grauer Mergel.  
Zone der unteren Plattensandsteine.  
Sehr spärliche umgelagerte Mikrofauna.
- Probe V 184: Urnäsch, Koord. 742,525/251,325. Grauer feinsandiger Mergel.  
Zone der unteren Plattensandsteine.  
Sehr spärliche umgelagerte Mikrofauna aus dem Oligozän.  
*Echinidenstacheln* (primär).
- Probe V 185: Urnäsch, Koord. 742,5/251,4. Grauer feinsandiger Mergel.  
Niveau der oberen Seelaffe.  
Mikrofossilleer.
- Probe V 209: St. Georgen, Weiher bei der Schokoladenfabrik. Koord. 746,96/253,525. 5 m unter dem Kohlenflöz mit kohlig-kieseligem Begleitgestein.  
Grauer Mergel.  
Zone der mittleren Plattensandsteine.  
Mikrofauna nicht selten:  
*Coscinodiscus* sp.  
*Placopsilina* ? sp.  
*Nonion affine* (REUSS)  
*Elphidium* cf. *minutum* (REUSS)  
*Elphidium minutum* (REUSS)  
*Rotalia* ? sp.  
*Globigerinen* (u. a. *Globigerina triloba* REUSS)  
*Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
*Echinidenstacheln*  
Brackisch-marine Faunengemeinschaft.
- Probe V 210: Gleiche Lokalität. Grauer Mergel zwischen den beiden Flözchen.  
Reiche Mikrofauna, jedoch artenarm:  
*Nonion* sp.  
*Elphidium* cf. *minutum* (REUSS)  
*Rotalia beccarii* (L.)  
Brackische (litorale) Faunengemeinschaft.
- Probe V 188: Urnäsch, W-Ufer, Koord. 742,475/251,45. Grauer Mergel im unmittelbar Hangenden der oberen Kohlenflözgruppe.  
Zone der mittleren Plattensandsteine.  
Mikrofauna nicht selten:  
*Lagena* sp.  
*Elphidium crispum* (L.)  
*Elphidium* sp.  
*Entosolenia* sp.  
*Rotalia* sp.  
*Eponides* sp.  
*Globigerina triloba* REUSS  
*Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
*Cibicides lobatulus* (W. & J.)  
Marine Faunengemeinschaft.
- Probe V 189: Gleiche Lokalität und Zone.  
Reiche Mikrofauna, jedoch schlecht erhalten:  
*Nonion* sp.  
*Elphidium crispum* (L.)  
*Elphidium* sp.  
*Bulimina* sp.  
*Bolivina* sp. sp.  
*Bolivinoidea* aff. *concinna* KNIP. & MART.  
*Angulogerina* ? sp.  
*Rotalia* sp.

*Globigerina bulloides* D'ORB.  
*Globigerina triloba* REUSS  
*Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
*Cibicides lobatulus* (W. & J.)  
*Echinidenstacheln*  
 Marine Faunengemeinschaft.

- Probe V 187: Urnäsch, W-Ufer, südlich der gedeckten Holzbrücke, Koord. 742,475/251,55.  
 Braun-grau gefleckter Mergel.  
 Zone der mittleren Plattensandsteine.  
 Mikrofossilleer. Süswasserablagerung.
- Probe V 326: Biserhof, Koord. 746,825/253,65. Braun-grau gefleckter und gebänderter Mergel.  
 Mikrofossilleer. Wahrscheinlich fluviatil-terrestrische Bildung.
- Probe V 186: Sitter E-Ufer, Koord. 742,45/251,75. Grauer Mergel.  
 Burdigaler Zwischenkomplex.  
 Mikrofossilleer. Wahrscheinlich fluviatil-terrestrisch.
- Probe: E-Dreilinden, Koord. 747,65/254,2. Gelbgrau gefleckter Mergel.  
 Burdigaler Zwischenkomplex.  
 Mikrofossilleer. Wahrscheinlich fluviatil-terrestrisch.
- Probe V 42: Goldach, Koord. 750,275/256,66. Grauer plattiger Mergel.  
 Mit terrestrischer Makrofauna.  
 Burdigaler Zwischenkomplex.  
 Mikrofauna nicht selten:  
*Nonion* sp.  
*Elphidium antoninum* (D'ORB.)  
*Elphidium ortenburgense* (EGGER)  
*Rotalia* sp.  
*Globigerina bulloides* D'ORB.  
*Cibicides* cf. *aknerianus* (D'ORB.)  
 Brackische Faunengemeinschaft.
- Probe V 199: Bach W-Engelen, Koord. 741,45/250,54/Q. 810 m. Graubraun gefleckter Mergel (im unmittelbar Hangenden 2 Kohlenflöze und kohliges Kalk).  
 Burdigaler Zwischenkomplex (oberster Teil).  
 Sehr spärliche, schlecht erhaltene Mikrofauna:  
*Ostracoden* und *Planorben*.  
 Limnische Faunengemeinschaft.
- Probe V 40: Goldach, Koord. 750,275/256,675. Grauer Sandmergel mit Nagelfluh verkeilt.  
 Freudenbergnagelfluh.  
 Sehr spärliche, schlecht erhaltene Mikrofauna:  
*Rotalia* sp.  
*Cancris* ? sp.  
*Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
*Echinidenstachel*.
- Probe V 200: Bach W-Engelen. Graubrauner Mergel zwischen den beiden Nagelfluhhorizonten der Freudenbergnagelfluh.  
 Koord. 741,425/250,925/Q. 790.  
 Mikrofossilleer.
- Probe V 205: Bettlerenbach, Koord. 753,150/258,2. 2 m über der Freudenbergnagelfluh. Graubrauner feinsandiger Mergel.  
 Zone der Schiefermergel.  
 Mikrofossilleer.
- Probe V 206: Bettlerenbach, Koord. 753,125/258,225. Bräunlich-grauer feinsandiger Mergel.  
 Zone der Schiefermergel.  
 Spärliche Mikrofauna:  
*Rotalia* ? sp.

- Globigerina triloba* REUSS  
*Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
*Cibicides* sp.  
*Echinidenstacheln*  
 Brackisch (litorale) Faunengemeinschaft.
- Probe V 207: Gleiche Lokalität und Zone. Grauer feinsandiger Mergel.  
 Mikrofauna selten:  
*Nonion* ? sp.  
*Elphidium crispum* (L.)  
*Elphidium* sp.  
*Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
*Echinidenstacheln*  
 Brackische (litorale) Faunengemeinschaft.
- Probe V 208: Bettlerenbach, Koord. 753,13/258,23. Grauer Mergel.  
 Zone der Schiefermergel.  
*Echinidenstacheln* selten. Glaukonit im Rückstand.  
 Vermutlich litorale Bildung.
- Probe V 204: Bettlerenbach, Koord. 753,05/258,29. Bräunlich-grauer feinsandiger Mergel.  
 Zone der Schiefermergel.  
 Mikrofossilleer.
- Probe V 39: Goldach, Koord. 750,325/256,625. Schiefermergel.  
 Zone der Schiefermergel.  
 Umkristallisierte, zum grössten Teil umgelagerte Mikrofauna:  
*Elphidium* sp.  
*Uvigerina bononiensis primiformis* PAPP. & TOURN.  
*Discorbis* sp.  
*Rotalia* sp.  
*Globigerina cretacea* D'ORB. (umgelagert aus der Oberkreide)  
*Globigerina* sp.  
*Globorotalia* sp. (wahrscheinlich aus dem Eozän)  
*Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
*Cibicides* sp.  
*Echinidenstacheln*.
- Probe V 38: Goldach, Koord. 750,375/256,725. Schiefermergel.  
 Zone der Schiefermergel.  
 Mikrofossilleer.
- Probe V 190: Sitter E-Ufer, Koord. 742,35/251,825. Grauer feinsandiger Mergel.  
 Zone der Schiefermergel.  
 Ziemlich reiche Mikrofauna:  
*Nonion commune* (D'ORB.)  
*Nonion boueanum* (D'ORB.)  
*Elphidium macellum* (FICHTEL & MOLL)  
*Rotalia beccarii* (L.)  
*Cytheromorpha* aff. *zinndorffi* (LIENENKLAUS)  
*Loxoconcha* aff. *grateloupiana* (BOSQUET)  
*Loxoconcha* sp.  
*Echinidenstacheln*  
 Brackisch-marine (litorale) Faunengemeinschaft.
- Probe V 191: Gleiche Lokalität und Zone. Grauer feinsandiger Mergel.  
 Ziemlich reiche Mikrofauna:  
*Quinqueloculina* sp.  
*Nonion boueanum* (D'ORB.)  
*Elphidium macellum* (FICHTEL & MOLL)  
*Elphidium rugosum* (D'ORB.)



- Rotalia beccarii* (L.)  
*Cytheromorpha* aff. *zinndorffi* (LIENENKLAUS)  
*Loxoconcha* sp.  
*Haplocytheridea dacica elegantior* GOERL.  
*Cytheridea* aff. *perforata* (ROEMER)  
*Echinidenstacheln*  
 Brackisch-marine (litorale) Faunengemeinschaft.
- Probe V 192: Gleiche Lokalität und Zone. Grauer feinsandiger Mergel.  
 Mikrofauna nicht selten:  
*Elphidium macellum* (FICHTEL & MOLL)  
*Elphidium rugosum* (D'ORB.)  
*Rotalia beccarii* (L.)  
*Haplocytheridea dacica elegantior* GOERL.  
*Echinidenstacheln*  
 Brackisch-marine (litorale) Faunengemeinschaft.
- Probe V 193: Gleiche Lokalität und Zone. Grauer feinsandiger Mergel.  
 Mikrofauna selten:  
*Nonion boueanum* (D'ORB.)  
*Elphidium* cf. *ortenburgense* (EGGER)  
*Uvigerina bononiensis primiformis* PAPP & TOURN.  
*Rotalia beccarii* (L.)  
*Globigerina* sp. sp.  
*Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
 Brackisch-marine (litorale) Faunengemeinschaft.
- Probe V 201: Bach W-Engelen, Koord. 741,41/250,975. Schiefermergel im unmittelbar Liegenden des Turritellenmassengrabes.  
 Zone der Schiefermergel.  
 Ziemlich reiche Mikrofauna:  
*Nonion boueanum* (D'ORB.)  
*Elphidium macellum* (FICHTEL & MOLL)  
*Rotalia beccarii* (L.)  
*Loxoconcha* aff. *grateloupiana* (BOSQUET)  
*Loxoconcha* sp.  
*Cytheromorpha* aff. *zinndorffi* (LIENENKLAUS)  
*Echinidenstacheln*  
 Brackisch-marine (litorale) Faunengemeinschaft.
- Probe V 202: Bach W-Engelen, Koord. 741,36/251,03. Grauer, braun gefleckter Mergel innerhalb von Plattensandsteinen.  
 Zone der Schiefermergel.  
 Mikrofossilleer.
- Probe V 213: Schloss an der Glatt, Koord. 738,2/249,2. Grauer Mergel.  
 Zone der Schiefermergel.  
 Mikrofauna sehr selten:  
*Rotalia beccarii* (L.)  
*Ostracoden*.  
 Brackische, möglicherweise lagunäre Faunengemeinschaft.
- Probe V 37: Goldach, Koord. 750,4/256,775. Grauer Mergel.  
 Zone der oberen Plattensandsteine.  
 Mikrofossilleer.
- Probe V 224—227: Hagenbuch, Koord. 748,38/255,09. Gelblich-grauer Mergel im unmittelbar Liegenden des berühmten Fossilhorizontes.  
 Zone der oberen Plattensandsteine.  
 Mikrofauna nicht selten:  
*Nonion commune* (D'ORB.)  
*Nonion boueanum* (D'ORB.)

*Elphidium macellum* (FICHTEL & MOLL)  
*Elphidium* sp.  
*Elphidium* cf. *ortenburgense* (EGGER)  
*Spiroplectammia pectinata* REUSS  
*Rotalia beccarii* (L.)  
*Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
 Ostracoden  
 Echinidenstacheln  
 Brackisch-marine (litorale) Faunengemeinschaft.

Proben V 194—198: Sitter, Koord. 742,3/251,975—900.

Zone der oberen Plattensandsteine. Die Aufzählung der Probeentnahmestellen erfolgt im Profil von unten nach oben.

Probe V 195: Grauer sandiger Mergel.

Mikrofauna selten:

*Nonion* sp.

*Rotalia beccarii* (L.)

Echinidenstacheln

Brackische (litorale) Faunengemeinschaft.

Probe V 194: Grauer Mergel.

Spärliche korrodierte Mikrofauna:

*Nonion* sp.

*Elphidium* sp.

Wahrscheinlich brackische Faunengemeinschaft.

Probe V 196: Grauer Mergel mit Turritellen.

Mikrofauna nicht selten:

*Nonion boueanum* (D'ORB.)

*Rotalia beccarii* (L.)

Ostracoden

Echinidenstacheln

Brackische (litorale) Faunengemeinschaft.

Probe V 197: Grauer Mergel.

Ziemlich reiche, rekristallisierte Mikrofauna:

*Nonion* sp. sp.

*Elphidium macellum* (FICHTEL & MOLL)

*Rotalia beccarii* (L.)

Ostracoden

Echinidenstacheln

Brackische (litorale) Faunengemeinschaft.

Probe V 198: Grauer Mergel.

Mikrofauna nicht selten:

*Coscinodiscus* sp.

*Nonion* aff. *boueanum* (D'ORB.)

*Nonion* sp.

*Rotalia beccarii* (L.)

*Globigerina triloba* REUSS

*Cibicides* sp.

Echinidenstacheln

Brackische (litorale) Faunengemeinschaft.

Proben V 222—223: Goldbrunnen im Hagenbuch, Koord. 747,775/254,99. Grauer Mergel.

Zone der oberen Grenznagelfluh.

Mikrofauna nicht selten:

*Spiroplectammia* sp.

*Nonion boueanum* (D'ORB.)

*Nonion commune* (D'ORB.)

*Nonion* sp.

*Elphidium macellum* (FICHTEL & MOLL)  
*Rotalia beccarii* (L.)  
*Globigerina bulloides* D'ORB.  
*Globigerina* sp.  
*Cibicides cryptomphalus* (REUSS)  
*Cibicides* sp.  
*Echinidenstacheln*  
 Brackisch-marine (litorale) Faunengemeinschaft.

Im allgemeinen sind die Mikrofaunen der Oberen Meeresmolasse von St. Gallen schlecht erhalten, was eine spezifische Bestimmung oft erschwert; trotzdem ist es in den meisten Fällen möglich, die fazielle Herkunft des Sedimentes festzustellen. Ähnlich wie in der Makrofauna wird auch durch die Mikrofossilien der vorwiegend litorale Charakter der Sedimente bestätigt. Der in der Makrofauna einseitig auf das Helvétien beschränkte Artenreichtum findet in der Mikrofauna eine andere Verteilung, indem die mikrofossilreichsten Zonen vorwiegend im Burdigalien anzutreffen sind (Zone der oberen Flözgruppe) (siehe Tabelle 3, S. 281). Die stratigraphische Brauchbarkeit der Mikrofossilien beschränkt sich auf wenige Formen.

Die Molasse-Ablagerungen Süddeutschlands wurden durch die starke Tätigkeit der dortigen Erdölsuche in den letzten Jahren auch eingehend mikropaläontologisch untersucht (HAGN & HÖLZL 1952, KNIPSCHER 1952, FAHRION & STRAUB 1953, GOERLICH 1953). Das marine Miozän der dortigen Molasse-Ablagerungen kann im Ostteil Bayerns sehr gut gegliedert werden. Im Westen sind die Mikrofaunen der Oberen Meeresmolasse ärmer, jedoch kann auch in Südbaden das Burdigalien mikropaläontologisch sehr wohl gegen das Helvétien abgetrennt werden. Deswegen haben wir dann auch die Mikrofaunen aus der Oberen Meeresmolasse von St. Gallen in erster Linie mit der Mikrofauna der benachbarten Molasse-Ablagerungen Süddeutschlands verglichen.

In der süddeutschen Molasse treten die grosswüchsigen *Elphidien* mit breiten Septalbrücken (wie *E. crispum*, *E. macellum* und *E. rugosum*) erst ab oberem Burdigalien auf. In der Oberen Meeresmolasse von St. Gallen treten diese Formen oberhalb der oberen Kohlenflözgruppe und im Helvétien auf. Die als *Elphidium* cf. *minutum* (REUSS) bezeichnete Form repräsentiert die burdigale Varietät der vorwiegend oligozänen *Elphidium minutum* (REUSS), sie tritt in den tieferen Schichten des sanktgallischen Burdigalien auf und scheint sich ausschliesslich auf das Burdigalien zu beschränken: Witenbach (S-Rorschach), graue Mergel; Zone der untersten Plattensandsteine.

*Uvigerina bononiensis primiformis* tritt im Wiener Becken erst im Helvétien auf und scheint nur bis kurz ins Tortonien hinaufzureichen. Diese *Uvigerina* ist also gut brauchbar, um das Helvétien vom Burdigalien abzugrenzen. Da diese *Uvigerina* auch öfters in der bayerischen Molasse vorkommt, gibt sie uns in Verbindung mit anderen Arten die Möglichkeit, die Miozänstufen von der Ostschweiz bis ins Wiener Becken und umgekehrt zu korrelieren.

*Spiroplectamina pectinata* (REUSS) tritt in der süddeutschen Molasse erst im Helvétien auf. Bei *Bolivinoidea* aff. *concinna* handelt es sich um die burdigale Form der *Bolivinoidea concinna* KNIP. & MART.



Die häufig auftretende *Rotalia beccarii* (L.) ist charakteristisch für brackisches bis brackisch-marines Milieu. Diese an sich sehr variable und auch rezent noch sehr verbreitete Form zeigt vom Chattien über das Aquitanien und Burdigalien bis ins Helvétien eine morphologische Abänderung (Entwicklungsreihe). In der bayrischen Molasse wurde dies für das Chattien und Aquitanien durch KNIPSCHER (1952, S. 55 und Tafel 1) schon angedeutet. Die endgültige stratigraphische Brauchbarkeit der Abwandlungsformen dieser Art wird jedoch an Hand von umfangreichem Untersuchungsmaterial nachgeprüft; der Erhaltungszustand der Specimen aus der sanktgallischen Molasse ist dazu wenig geeignet.

Die aufgefundenen *Ostracoden* dürfen laut brieflicher Mitteilung von Herrn Dr. GOERLICH als typisch für brackisches Biotop gelten. *Haplocytheridea dacica elegantior* wurde durch GOERLICH (1953) aus dem Helvétien der niederbayerischen Molasse als neue Unterart beschrieben, sie kommt in der St. Galler-Molasse im Burdigalien und Helvétien vor. Die übrigen Ostracoden-Arten wurden bis jetzt in der Oberen Meeresmolasse noch nicht festgestellt.

Die Mikrofauna der oberen Flözgruppe (Zone der mittleren Plattensandsteine) zeigt weitgehende Übereinstimmung mit derjenigen der aquitanen-burdigalen Grenzschichten der Pechkohlenmulden Oberbayerns (Berghofschurf bei Peissenberg und Mangfalltal nördlich Miesbach). Die übrigen untersuchten Mikrofaunen lassen sich schwer direkt mit den betreffenden Mikrofaunen der Oberen Meeresmolasse Süddeutschlands vergleichen. Vom mikrofaunistischen Standpunkt hat die Obere Meeresmolasse von St. Gallen eine andere Fazies als die süddeutsche.

Sowohl im Burdigalien wie im Helvétien wurden umgelagerte Foraminiferen aus der Oberkreide, dem Eozän und dem Oligozän festgestellt (Probe V 211, V 212, V 183, V 184, V 39), was darauf hinweist, dass zur Zeit der Ablagerung der sanktgallischen Oberen Meeresmolasse im Hinterland Schichten der Oberkreide, des Eozäns und Oligozäns abgetragen wurden.

Der Gegensatz zwischen terrestrischer Makrofauna und brackischer Mikrofauna bei der Probe V 42 aus dem burdigalen Zwischenkomplex im Goldach-Profil ist entweder damit zu erklären, dass terrestrische und brackische Ablagerungen oft miteinander in einer sehr geringen Mächtigkeit wechsellagern, wie dies jüngst ZÖBELEIN (1953, S. 129—130) für die Cyrenenschichten bei Miesbach (Obb.) erneut nachwies, oder mit dem Eintritt von Landschnecken in einem brackischen Milieu (siehe HÜRZELER 1932, und ZÖBELEIN 1952, S. 31 und S. 48—49).

### **Zur Stratigraphie der Oberen Meeresmolasse von St. Gallen**

Die Trennung der Oberen Meeresmolasse der Schweiz in Burdigalien und Helvétien geht auf R. RUTSCH 1928 zurück. Diese Zweiteilung wurde von A. LUDWIG 1930 und 1931 übernommen, doch wurde in Übereinstimmung mit BAUMBERGER (Bestimmung der nicht-marinen Gastropoden) der von R. RUTSCH ins Helvétien gestellte, „limnische Zwischenkomplex“ zum Burdigalien geschlagen und die Freudenbergnagelfluh zur Basis des Helvétien gemacht. Diese Unterteilung, welche an Hand von Makrofossilien getroffen wurde, hat sich in allen späteren Untersuchungen bestätigt.

Auch im Gebiete der Oberen Meeresmolasse von St. Gallen lässt sich die Trennung in Burdigalien und Helvétien dank dem grossen Fossilreichtum durch-

Tabelle 4. Leitfossilien aus der Oberen Meeressmolasse von St. Gallen

— bisher bekannte stratigraphische Verbreitung ● Fundstellen ○ Fundstelle oder Bestimmung fraglich	Aquitania	Burdigalien						Unt. Vindob.		Höhere Stufen
		Unterstes Burdigalien	Untere Seclaffe	Untere Plattensandsteine	Obere Seclaffe	Mittlere Plattensandsteine	Zwischenkomplex	Unteres Helvétien	Oberes Helvétien	
<i>Meleagrina Studeri</i> MAYER . . . . .					○			●	●	
<i>Pecten (Gigantopecten) gallicus</i> MAYER . . . . .								●	●	
<i>Pecten (Flexopecten) palmata</i> LAMARCK . . . . .								●	●	
<i>Ostrea (Crassostrea) gryphoides</i> SCHLOTH. . . . .	●	●						●	●	
<i>Thracia (Cyathodonta) Dolfussi</i> COSSMAN & PEYROT . . . . .								●	●	
<i>Pholas Desmoulini</i> BENOIST . . . . .			●					●	●	
<i>Solen burdigalensis</i> DESHAYES . . . . .					●			●	●	
<i>Eastonia mitis</i> MAYER . . . . .								●	●	
<i>Tapes (Callistotapes) vetulus</i> BASTEROT . . . . .					●			●	●	
<i>Meretrix (Cordiopsis) intercalaris</i> COSSMAN & PEYROT . . . . .								●	●	
<i>Meretrix (Callista) lilacinoides</i> SCHAFFER . . . . .								●	●	
<i>Cardium (Ringicardium) Kunstleri</i> COSSMAN & PEYROT . . . . .								●	●	
<i>Discors spondyloides</i> v. HAUER . . . . .								●	●	
<i>Venericardia (Megacardita) Jouannetti</i> BAST. . . . .								●	●	
<i>Bolma baccata</i> (DEFRANCE) . . . . .								●	●	
<i>Theodoxus (Calvertia) crenulatus crenulatus</i> (KLEIN) . . . . .								○	○	
<i>Hydrobia semiconvexa</i> (SANDBERGER) . . . . .								●	●	
<i>Brotia escheri grossecostata</i> (KLEIN) . . . . .	●							●	●	
<i>Turritella terebralis</i> var. <i>gradata</i> MENKE . . . . .								●	●	
<i>Protoma cathedralis</i> (BRONG.) var. <i>paucicincta</i> SACCO . . . . .								●	●	
<i>Turritella (Peyrotia) desmarestina</i> (BAST.) var. <i>mediosubcarinata</i> MYLIUS . . . . .								●	●	
<i>Turritella (Zaria) subungulata</i> (BROCCHI) var. <i>spirata</i> (BROCCHI) . . . . .								●	●	
<i>Pirula (Urosyca) burdigalensis</i> SOW. . . . .								●	●	
<i>Latrunculus (Peridipsaccus) eburnoides</i> (MATH.) . . . . .								●	●	
<i>Tudicula rusticula</i> (BASTEROT) . . . . .				●				●	●	
<i>Ellobium (Ellobium) grateloupi grateloupi</i> (TOURNOUER) . . . . .								●	●	
<i>Ellobium (Ellobium) oblongum</i> (DESH.) . . . . .								●	●	
<i>Nealexia pisolina pisolina</i> (DESH.) . . . . .								●	●	
<i>Bolivinoides</i> aff. <i>concinna</i> KNIPSCHER & MART. . . . .					●			●	●	
<i>Elphidium crispum</i> D'ORB. . . . .					●			●	●	
<i>Elphidium</i> cf. <i>minutum</i> REUSS . . . . .	●				●			●	●	
<i>Elphidium minutum</i> REUSS . . . . .					●			●	●	
<i>Elphidium macellum</i> EGGER . . . . .								●	●	
<i>Spiroplectamina pectinata</i> REUSS . . . . .								●	●	
<i>Uvigerina bononiensis primiformis</i> PAPP. & TOURN. . . . .								●	●	
<i>Haplocytheridea dacica elegantior</i> GOERL. . . . .	●							●	●	

führen. Tabelle 4, S. 283, gibt eine Übersicht über jene Fossilien, denen ein gewisser Leitwert zukommt. In bezug auf die Gastropoden sind generell die Resultate von R. RUTSCH, „Die Gastropoden des subalpinen Helvétien der Schweiz und des Vorarlbergs“ wiedergegeben worden.



### Abgrenzung des Burdigalien gegen das liegende Aquitanien

(siehe Tabelle 4)

*Ostrea (Crassostrea) gryphoides* SCHLOTH. sp.

Stratigraphische Verbreitung: Burdigalien, Vindobonien und höhere Stufen.

Diese Form tritt in der Oberen Meeresmolasse von St. Gallen bereits im Seelaffehorizont etwa 2 m über dem burdigalen Basiskonglomerat bei Nagelstein auf. Ferner wurde sie am Witenbach in der Zone der untersten Plattensandsteine, in der unteren Seelaffe bei Tannacker, in der oberen Seelaffe an der Goldach und im Wattwald, Niveau der Ringelsberg Nagelfluh, gefunden.

*Tapes (Callistotapes) vetulus* BAST.

Stratigraphische Verbreitung: Burdigalien, Helvétien.

Mit Sicherheit konnte diese Art (ausser im Helvétien) einzig bei Kamelenberg-St. Georgen in der Zone der mittleren Plattensandsteine und in der oberen Seelaffe bei Sturzenegg nachgewiesen werden.

*Chlamys (Flexopecten) palmata* LAM.

Stratigraphische Verbreitung: Burdigalien, Helvétien Kt. Bern, R. RUTSCH 1928.

Als einziger bisheriger Fundort ist die Obere Seelaffe bei Blatten-Staad bekannt.

*Tudicula rusticula* (BAST.).

Stratigraphische Verbreitung: Burdigalien, Vindobonien.

Obwohl von A. LUDWIG & CH. FALKNER 1901/3 der Fundort nur mit Martinsbrücke bezeichnet wird, darf doch mit einiger Sicherheit angenommen werden, dass mit dieser Ortsbezeichnung das Niveau der Oberen Seelaffe gemeint wurde.

*Brotia escheri grossecostata* (KLEIN).

Stratigraphische Verbreitung: Chattien, Aquitanien.

Durch das Auftreten von *Brotia escheri grossecostata* (KLEIN) in den grauen Mergeln zwischen dem mittleren und oberen Nagelfluhhorizont des burdigalen Basiskonglomerates, im Steinbruch an der Strasse Riethüsli-Lustmühle, stellt sich die Frage, wie das Nebeneinander von aquitanen limnischen Gastropoden und mariner burdigaler Mollusken im untersten Burdigalien zu werten ist. Schon H. H. RENZ (1937) hat darauf hingewiesen, dass von einem gewissen Zeitpunkt an (Transgression des burdigalen Meeres) aquitane Leitformen nur noch die Bedeutung von Faziesfossilien besitzen, sich weiterentwickeln und erst im Moment, wo das Helvétien-Meer verschwindet, wieder zu effektiven Leitformen werden. Ebenfalls vermutet H. H. RENZ (1937), dass die Fossilfundstelle Hombergtobel mit ihrer nicht-marinen aquitanen Fauna ins Burdigalien zu stellen ist. Die Untersuchungen von U. BÜCHI (1950) haben dies bestätigt, indem diese Lokalität unmittelbar ins Hangende des burdigalen Basiskonglomerates zu liegen kommt.

In den grauen Mergeln an der Basis der Freudenbergnagelfluh auf dem linken Sitterufer wurde eine *Melania* gefunden, welche grosse Ähnlichkeit mit *Brotia escheri grossecostata* (KLEIN) besitzt. Möglicherweise handelt es sich hier um eine solche Weiterentwicklung, wie sie von H. H. RENZ vermutet wurde.

Das Persistieren aquitaner, terrestrischer oder limnischer Gastropoden bis ins Burdigalien ist somit nicht von der Hand zu weisen, womit die stratigraphischen Grenzen, die mittels limnischer oder mariner Mollusken gezogen werden, nicht korrespondieren.

### **Abgrenzung des Burdigalien gegen das hangende Helvétien**

(siehe Tabelle 4)

Im burdigalen Teil der Oberen Meeresmolasse von St. Gallen konnten bis heute keine marinen Mollusken nachgewiesen werden, die nur für das Burdigalien und tiefere Stufen leitend sind, wodurch eine direkte Abgrenzung gegen das Helvétien erschwert wird.

In Übereinstimmung mit E. BAUMBERGER hat A. LUDWIG den „limnischen Zwischenkomplex“ ins Burdigalien gestellt, was durch die säugetierpaläontologischen Untersuchungen von J. HÜRZELER (siehe U. BÜCHI 1950) bestätigt wurde. Schon damals wurde darauf hingewiesen, dass möglicherweise das gesamte ostschweizerische Burdigalien das untere, wenn nicht unterste Burdigalien repräsentiert.

Der mikropaläontologische Befund hat dies nun weitgehend bestätigt.

*Elphidium crispum* (D'ORB.) und *Elphidium macellum* (FICHTEL & MOLL), welche im schwäbisch-bayerischen Raum erst in den obersten Teilen des Burdigalien aufzutreten beginnen, lassen sich mit einer einzigen Ausnahme erst in den Schichten des Helvétien nachweisen.

Zudem zeigt die Mikrofauna der oberen Flözgruppe weitgehende Übereinstimmung mit derjenigen der Pechkohlenmulden Oberbayerns aus den aquitanen-burdigalen Grenzsichten.

Obwohl sich auf Grund der vorgängigen Resultate die Frage erhebt, ob Teile der Oberen Meeresmolasse von St. Gallen vielleicht ins obere Aquitanien zu stellen sind, kann wiederum an Hand der Mikrofauna durch das Auftreten von *Bolivinoidea* aff. *concinna* KNIP. & MART. und *Elphidium* cf. *minutum* (REUSS) der gesamte Schichtkomplex zwischen Basiskonglomerat und Freudenbergnagelfluh dem Burdigalien zugewiesen werden.

### **Abgrenzung des Helvétien gegen das liegende Burdigalien**

(siehe Tabelle 4)

Dank dem grossen Fossilreichtum gestaltet sich die Abgrenzung des Helvétien bedeutend einfacher, als dies im Burdigalien der Fall war.

*Meleagrina Studeri* MAYER.

Stratigraphische Verbreitung: Vindobonien und höhere Stufen.

Fundorte: Felsenkeller Hagenbuch; Steingrube; Mühleggtunnel; Stocken.

Ferner wird *Meleagrina Studeri* MAYER von A. LUDWIG & CH. FALKNER (1903/4) in Übereinstimmung mit A. GUTZWILLER aus der Seelaffe im Martins-tobel beschrieben. In den nachfolgenden Jahren sind keine ähnlichen Funde aus dem Burdigalien verzeichnet worden, und eine Überprüfung jener ersten Funde

war nicht möglich. Es ist daher zu vermuten, dass es sich bei der beschriebenen Art entweder um schlecht erhaltene Exemplare oder um eine Vorläuferin der *Meleagrina Studeri* MAYER des Helvétien gehandelt hat.

*Pecten (Gigantopecten) gallicus* MAYER.

Stratigraphische Verbreitung: Helvétien.

Fundorte: Hurlibuck (Felsriff im See) bei Staad, Freudenbergnagelfluh, Hagenbuch, Zone der Oberen Plattensandsteine. Bach im Frauenwald, Zone der Schiefermergel.

*Cardium (Ringicardium) Kunstleri* COSSMANN & PEYROT.

Stratigraphische Verbreitung: Vindobonien.

Fundorte: Zone der Oberen Plattensandsteine: Menzlen, Hagenbuch, Mühlegg, Felsenkeller an der Speicherstrasse, Tivoli, Sitter-Stocken, Steingrube. Zone der Schiefermergel: Goldach, Strässchen von Untereggen nach Eggersriet, Mühlegg.

*Discors spondyloides* v. HAUER.

Stratigraphische Verbreitung: Vindobonien.

Fundorte: Zone der Oberen Plattensandsteine: Sitter-Kräzern, Hagenbuch, Steingrube, Felsenkeller an der Speicherstrasse, Mühlegg, Tunnel.

Zone der Schiefermergel: Goldach, Mühlegg, Bach bei Engelen.

*Venericardia (Megacardita) Jouanneti* BASTEROT.

Stratigraphische Verbreitung: Vindobonien.

Fundorte: Zone der Oberen Plattensandsteine: Hagenbuch, Sitter-Kräzern, Mühlegg, Tunnel.

Zone der Schiefermergel: Totenweiher bei Dreilinden, Reservoir an der Teufenerstrasse.

*Bolma baccata* (DEFRANCE).

Stratigraphische Verbreitung: Vindobonien, evtl. höhere Stufen.

Fundorte: Zone der Oberen Plattensandsteine: Steingrube.

*Turritella (Zaria) subangulata* (BROCCHI) var. *spirata* (BROCCHI).

Stratigraphische Verbreitung: Vindobonien und höhere Stufen.

Fundorte: Zone der Oberen Plattensandsteine: Steingrube, Felsenkeller an der Speicherstrasse.

*Hydrobia semiconvexa* (SANDBERGER).

Stratigraphische Verbreitung: Vindobonien.

Fundort: Stocken-Sitter. Möglicherweise handelt es sich bei dieser Fundstelle bereits um Tortonien, wie ja bekanntlich die gelbgrau-gefleckten Mergel im unmittelbar Hangenden der Oberen Grenznagelfluh im Gebiete der Sitter sich durch z. T. reiche Gastropodenfaunen auszeichnen.

*Theodoxus (Calvertia) crenulatus crenulatus* (KLEIN).

Stratigraphische Verbreitung: Tortonien.

Fundort: Von W. WENZ (1923–30) wird diese Form von der Fundstelle Steingrube beschrieben, welche ins oberste Helvétien zu liegen kommt.

*Nealexia pisolina pisolina* (DESHAYES).

Stratigraphische Verbreitung: Vindobonien-Pontien.

Fundort: Zone der Oberen Plattensandsteine: Steingrube.

**Abgrenzung des Helvétien gegen das Tortonien**

(siehe Tabelle 4)

*Pecten (Gigantopecten) gallicus* MAYER wurde bereits auf S. 286 erwähnt.

*Thracia (Cyathodonta) Dollfussi* COSSMANN & PEYROT.

Stratigraphische Verbreitung: Aquitanien-Burdigalien; Helvétien des Kantons Bern (R. RUTSCH 1928).

Fundort: Hagenbuch, Zone der Oberen Plattensandsteine.

*Pholas Desmoulinsi* BENOIST.

Stratigraphische Verbreitung: Aquitanien-Burdigalien; Helvétien des Kantons Bern (R. RUTSCH 1928).

Fundorte: Zone der Schiefermergel: Kubel-Sitter, Schloss an der Glatt, Walketobel bei Herisau.

*Solen burdigalensis* DESHAYES.

Stratigraphische Verbreitung: Aquitanien-Helvétien.

Fundorte: Zone der Oberen Plattensandsteine: Kräzern-Sitter, Mühleggtunnel, Hagenbuch, Steingrube, Felsenkeller an der Speicherstrasse.

*Eastonia mitis* MAYER.

Stratigraphische Verbreitung: Aquitanien-Helvétien.

Fundorte: Zone der Oberen Plattensandsteine: Steingrube, Stocken-Sitter.

*Tapes (Callistotapes) vetulus* BASTEROT.

Stratigraphische Verbreitung: Burdigalien-Helvétien.

Fundorte: Zone der Oberen Plattensandsteine: Stocken-Sitter, Hagenbuch, Steingrube, Mühleggtunnel, Menzeln, Steinbruch SE Herisau, Felsenkeller Speicherstrasse.

Zone der Schiefermergel: Moosbergbach bei Herisau, Bach bei Engelen (S-Gübsenweiher), Goldach, Mühlegg, Totenweiher bei Dreilinden, Tivoli, neues Reservoir an der Teufenerstrasse, Bettlerenbach.

*Meretrix (Cordiosis) intercalaris* (COSSMANN & PEYROT).

Stratigraphische Verbreitung: Aquitanien-Helvétien.

Fundorte: Zone der Oberen Plattensandsteine: Hagenbuch, Mühleggtunnel, Steinbruch SE Herisau.

Zone der Schiefermergel: Bach im Frauenwald.

*Meretrix (Callista) lilacinoides* SCHAFFER.

Stratigraphische Verbreitung: Burdigalien (Wienerbecken), Helvétien des Kantons Bern (R. RUTSCH 1928).

Fundorte: Zone der Schiefermergel: Goldach.

Freudenbergnagelfluh: Hurlibuck (Riff im See) bei Staad.

*Turritella terebralis* LAMARCK var. *gradata* MENKE.

Stratigraphische Verbreitung: Burdigalien, Helvétien.

Fundorte: Zone der Oberen Plattensandsteine: Hagenbuch, Mühleggtunnel.

*Turritella terebralis* LAMARCK wird von A. LUDWIG und CH. FALKNER 1903/4 noch von den folgenden Lokalitäten erwähnt: Felsenkeller Speicherstrasse, Steingrube, Stocken-Sitter und aus der Zone der Schiefermergel bei Mühlegg. Ob es sich dabei um die obgenannte Varietät handelt, kann leider nicht entschieden werden.

*Protoma cathedralis* (BRONGNIART) var. *paucicincta* SACCO.

Stratigraphische Verbreitung: Burdigalien-Helvétien.

Fundort: Zone der Oberen Plattensandsteine: Mühleggtunnel.

*Turritella (Peyrotia) desmarestina* BASTEROT var. *mediosubcarinata* MYLIUS.

Stratigraphische Verbreitung: Burdigalien-Helvétien.

Fundort: Kubel-Sitter, wahrscheinlich aus der Zone der Schiefermergel.

*Pirula (Urosyca) burdigalensis* SOWERBY.

Stratigraphische Verbreitung: Burdigalien-Helvétien.

Fundorte: Zone der Oberen Plattensandsteine: Stocken-Sitter, Hagenbuch, Steingrube, Mühleggtunnel.

Zone der Schiefermergel: Mühlegg, Notkersegg.

*Latrunculus (Peridipsaccus) eburnoides* (MATHERON).

Stratigraphische Verbreitung: Burdigalien-Helvétien.

Fundorte: Zone der Oberen Plattensandsteine: Hagenbuch, Eisenbahnbrücke-Sittertobel.

*Ellobium (Ellobium) grateloupi grateloupi* (TOURNOUER).

Stratigraphische Verbreitung: Aquitanien-Helvétien.

Fundort: Zone der Oberen Plattensandsteine: Steingrube.

*Ellobium (Ellobium) oblongum* (DESHAYES).

Stratigraphische Verbreitung: Burdigalien-Helvétien.

Fundort: Zone der Oberen Plattensandsteine: Steingrube.

An Mikrofossilien, welche für das Helvétien des bayerisch-schwäbischen Raumes leitend sind, konnten im sanktgallischen Helvétien *Spiroplectamina pectinata* REUSS und *Uvigerina bononiensis primiformis* PAPP. & TOURN. nachgewiesen werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sowohl die makro- wie mikropaläontologischen Untersuchungen der Faunen eine Zuordnung der marinen Schichten von St. Gallen zum Burdigalien resp. Helvétien gestatten, sowie auch die Abgrenzung des Burdigalien gegen das Helvétien. Der Säugetier- und der mikropaläontologische Befund sprechen dafür, dass zwischen der Helvétienbasis (Freudenbergnagelfluh) und dem burdigalen Zwischenkomplex eine beträchtliche Schichtlücke existiert, die jedoch lithologisch nicht oder nur unwesentlich in Erscheinung tritt.

### **Zur Paläogeographie am Ostrande des Hörnischuttfächers während des Burdigalien und Helvétien**

Durch die mikropaläontologischen Resultate, sowie durch neue detaillierte geologische Aufnahme der Oberen Meeresmolasse (siehe Tafel XIII) war es möglich, in paläogeographischer Hinsicht zum Teil neue Gesichtspunkte zu gewinnen, vor allem aber die Resultate früherer Arbeiten (H. H. RENZ 1937/38; U. BÜCHI & F. HOFMANN 1945; U. BÜCHI 1950) zu verfeinern. Ferner wurde versucht, anhand einer tabellarischen Übersicht die paläogeographischen Daten darzustellen und im Textteil nur die besonders erwähnenswerten Details hervorzuheben.



Die nachstehenden Faktoren haben dem E-Hörnlichuttfächer sein Gepräge gegeben (U. BÜCHI 1950):

1. Senkungserscheinungen im Molassetrog, zeitweise gefolgt von Meereseinbrüchen.
2. Stetige Verlagerung der Vorlandsenke gegen Norden.
3. Entwicklung eines starken Senkungsfeldes im Gebiete des unteren St. Gallischen Rheintales und des Bodensees.
4. Lage der zentralen Schüttungsachse des Hörnlichfächers auf der Linie Sargans-Wattwil.
5. Ablenkung starker Schüttungsarme aus der Hauptachse in Richtung des Senkungsfeldes Rheintal-Bodensee.
6. Wechselbeziehung zwischen Ur-Rhein und Ur-Ill-System.
7. Tektonische Vorgänge im Alpenkörper.

Als neuer Gesichtspunkt für die paläogeographische Beurteilung tritt der von deutschen Geologen (K. LEMCKE, W. v. ENGELHARDT & H. FÜCHTBAUER 1953) festgestellte W-E gerichtete Materialtransport auf, welcher vom Chattien bis ans Ende der Oberen Meeresmolasse dauerte. Diese W-E gerichtete Strömung kommt am Ende der Oberen Meeresmolasse zum Erliegen als Folge einer positiven Krustenbewegung W des Lech. Schon im Oberen Helvétien zeichnet sich eine E-W gerichtete Strömung ab (Graupensandrinne), welche sich im Tortonien noch verstärkt.

## BURDIGALER TRANSGRESSIONSZYKLUS

### **Die Transgression des burdigalen Meeres und die Schüttung des Basiskonglomerates**

(siehe Tafel XIII und Tabelle 5)

Die Transgression des burdigalen Meeres am E-Rande des Hörnlichfächers fällt mit einer starken Schüttung des Ur-Rheines zusammen, wobei es erstmals zu Geröllschüttungen bis ins Rheintal hinaus kam. (3 m mächtige Nagelfluhbank bei Weinhalde, N Rheineck.) Die Ablagerung des Basiskonglomerates erfolgte in drei durch Phasen geringer Schüttungsintensität getrennte Geröllschübe. Diese 5-Phasigkeit kann nur im Gebiet zwischen Stösselbach (Urnäsch) und St. Georgen beobachtet werden, während in den E-Gebieten maximal nur 2 Schüttungsphasen zu erkennen sind. Ob es sich dabei um ein primäres Fehlen eines der 3 Geröllschübe handelt, oder um eine Verschmelzung einzelner Schüttungen miteinander, ist nicht abzuklären. E von Grub fehlen zudem die tieferen Geröllschübe, und es kam lediglich zur Ablagerung mariner Plattensandsteine. Erst die letzte Nagelfluhschüttung erreichte dann das Rheintal. In diesem Gebiet wird der fluviatile Gerölltransport durch marine Strömungen abgelöst, wofür die prächtigen Auskeilphänomene sprechen, die von H. H. RENZ 1937/38 beschrieben wurden. (Ähnliche Auskeilungen fehlen den rein fluviatilen Sedimenten der Ostschweiz völlig. Das Auskeilen fluviatiler Nagelfluhen erfolgt jeweils stromrinnenartig längs Erosionsrändern (U. BÜCHI 1950).)

Im Gebiet von St. Gallen erkennt man deutlich 3 Mündungsarme, einen an der Urnäsch, einen anderen E Lustmühle (an der Strasse St. Gallen-Teufen), beide

Tabelle 5. Burdigales Basiskonglomerat

	W-Urnäsch	Urnäsch	Sitter	E-Lustmühle	St. Georgen	Goldach	Witenbach	Grub	Station Tobel	Rheintal
5. Phase Lithologie	N a g e l f l u h		gelb-grau gefleckte Mergel und Sandsteine			N a g e l f l u h				Nagelfluh, verkeilt mit Plattensandstein Pectiniden und Ostreen
Fazies	f l u v i a t i l			fluviatil-litoral-brackisch		fluviatil-terrestrisch		l i t o r a l		
Morphologie	gegen W an- steigender Schuttfächer	Trompeten- mündung S-N orientiert	Landrücken	Trompeten- mündung S-N orientiert	Landrücken	Mündungsgebiet SW-NE orientierte Schüt- tungsrichtung		Rheintalbucht Wattenmeercharakter		
4. Phase Lithologie	gelb-grau gefleckte Mergel- Sandstein- Serien	Schiebfuge	gelb-grau gefleckte Mergel- Sandstein- serien	vorwiegend graue Mergel unterlagert von gelb-grau gefleckten Mergeln limnische Makrofauna litorale Mikrofauna	gelb-grau gefleckte z.T. bunte und graue Mergel Heliciden	Schiebfuge ? ?		Plattensandsteine		
Fazies	f l u v i a t i l			brackisch-litoral		fluviatil-terrestrisch		l i t o r a l		
Morphologie				wie in der 5. Phase						



<i>3. Phase</i> Lithologie	N a g e l f l u h	gelb-grau gefleckte Mergel-Sandstein-Serien	Nagelfluh	gelb-grau gefleckte z. T. bunte und graue Mergel Heliciden	Schichtfuge	Plattensandsteine
Fazies	f l u v i a t i l		limnisch fluviatil-terrestrisch		l i t o r a l	
Morphologie	w i e i n d e r 5. P h a s e					
<i>2. Phase</i> Lithologie	gelb-grau gefleckte Mergel-Sandstein-Serien	Schichtfuge	gelb-graugefleckte und rote Mergel-Sandstein-Serien, lokal bunte knollige Kalke		Schichtfuge	Plattensandsteine
Fazies	f l u v i a t i l - t e r r e s t r i s c h					
Morphologie	w i e i n d e r 5. P h a s e					
<i>1. Phase</i> Lithologie	N a g e l f l u h	gelb-grau gefleckte Mergel-Sandstein-Serien	N a g e l f l u h		Plattensandsteine	
Fazies	f l u v i a t i l - t e r r e s t r i s c h					
Morphologie	w i e i n d e r 5. P h a s e					
Fazies	l i t o r a l					
Morphologie	w i e i n d e r 5. P h a s e					




Fig. 1. Mutmassliche Entwicklung des Reliefs am E Rande des Hörnlichuttfächers zur Zeit der Oberen Meeresmolasse.

- 1 Schüttung des Burdigalen Basiskonglomerates.
- 2 Bildung der unteren Kohlenflözgruppe mit kieseligem Begleitgestein.
- 3 Ablagerung des Strandagglomerates an der Goldach.
- 4 Sedimentation der Unteren Sealaffe.
- 5 Schüttung der Ringelsberg nagelfluh.
- 6 Ablagerung der Oberen Sealaffe.
- 7 Ablagerung der oberen Kohlenflözgruppe mit kieseligem Begleitgestein.
- 8 Sedimentation der Cardienbank.
- 9 Nach der Schüttung der Kamelenberg nagelfluh.
- 10 Sedimentation des Burdigalen Zwischenkomplexes.
- 11 Helvétientransgression und Schüttung der Freudenberg nagelfluh.
- 12 Schüttung der Dreilindennagelfluh.
- 13 Vor Beginn der Hauptschüttungsphase der Oberen Grenznagelfluh.

S—N gerichtet, und einen dritten im Gebiet der Goldach mit einer SW—NE Strömungsrichtung (s. Fig. 1).

Die Transgression des Meeres erfolgte schon in der ersten Phase bis ins Gebiet von Tobel/Wienacht. Bis zur dritten Phase der Basiskonglomerat-Bildung verlagerte sich die Küste nur wenig gegen W, und erst in der vierten Phase kam es zu einer weiteren Senkung des Untergrundes, gefolgt von einer Verlagerung der Küsten gegen W, wobei das Meer in die Mündungsgebiete der beiden W Schüttungsarme eindrang, was durch die litoral-brackische Mikrofauna in den grauen Mergeln im Steinbruch an der Strasse Riethüsli—Lustmühle bewiesen wird, obwohl diese Mergel eine limnische Makrofauna führen. Es erhebt sich nun die Frage, wie dieses Nebeneinander von limnischen Makro- und litoralen Mikrofossilien zu werten ist. Der Erhaltungszustand der *Unien* und *Melanien*, die teilweise von Süßwasser-Kalkalgen (*Rivularia*) überkrustet sind (siehe auch U. BÜCHI & F. HOFMANN 1945), ist meist vorzüglich. So enthalten die *Unien* hie und da schöne Perlen, und oft umschliessen sie kohlige Resten, besonders im Bereich der Scharniere, welche als ehemalige Weichteile gedeutet werden müssen. Dies schliesst einen langen Transportweg der limnischen Petrefakten aus, und möglicherweise wurde die Süßwasserfauna an Ort und Stelle durch das eindringende Salzwasser vernichtet und in der Folge einsedimentiert.

#### Unterste Plattensandsteine und Hauteten-Nagelfluh im W = Untere Seelaffe im E

(siehe Fig. 1, Tafel XIII und Tabelle 6)

Die Zone der untersten Plattensandsteine ist eine der interessantesten Stufen des Burdigalien, in welcher sich das langsame Vordringen des Meeres gegen W dokumentiert. Im untersten Teil dieser Stufe drang das Meer periodisch bis ins Gebiet der Goldach vor. Regressionen schufen hier lokal lagunäre Verhältnisse, die zur Bildung der unteren Kohlenflözgruppe im Schaugentobel<sup>4)</sup> führten. Das oberste Flöz mit limnischer Makrofauna wird von grauen, zum Teil sandigen Mergeln unter- und überlagert, in welchen eine brackische Mikrofauna nachgewiesen werden konnte. Eine erneute Senkungsphase, gefolgt von einer Schüttung, deren Spitzen bis ins Gebiet des Witenbaches (S-Rorschach) reichen, ist an der Goldach durch ein Transgressions-Agglomerat dokumentiert. Dieses führt neben einer Häufung verkieselter Baumstämme und anderer pflanzlicher Reste, Gerölle und eine gemischte marin-terrestrische Fauna (*Heliciden*, *Turritellen*, Zähne von *Crocodilus*). Darüber folgen typische marine Plattensandsteine.

W der Goldach in den beiden Mündungsbuchten steigt der Anteil der Plattensandsteine, und zudem überflutete das Meer periodisch die Schwellenzone im Gebiete von St. Georgen.

Während der Schüttung der Hauteten-Nagelfluh<sup>5)</sup> und der Bildung der unteren Seelaffe fanden keine wesentlichen Küstenverschiebungen statt. Erwähnenswert ist der veränderte lithologische Habitus der Seelaffe im Gebiet E von Grub, welcher von H. H. RENZ (1937/38) mit Strömungserscheinungen in Zusammenhang

<sup>4)</sup> Goldachschlucht oberhalb der Martinsbrücke.

<sup>5)</sup> Benannt nach einer Lokalität SE des Zusammenflusses der Sitter und des Wattbaches.

Tabelle 6. Unterste Plattensandsteine – Hautetennagelfluh im W = Untere Seelaffe im E

	W-Urnäsch	Urnäsch	Sitter	Wattbach	St. Georgen	Goldach	Witenbach	Grub	E-Grub bis Rheintal
<i>Untere Seelaffe Hautetennagelfluh</i>	H a u t e t e n n a g e l f l u h								
Lithologie									
Fazies	fluviatil-terrestrisch	fluviatil-terrestrisch evtl. brackisch	fluviatil-terrestrisch	fluviatil-terrestrisch	l i t o r a l - n e r i t i s c h				
Morphologie	gegen W ansteigender Schuttfächer	Mündungsgebiet. Möglicherweise kurzfristiges Eindringen des Meeres	schwach ausgeprägter Landrücken	Flussrinne	überfluteter Landrücken	breiter muschelreicher Küstensaum		tiefere Meeresbucht mit Anzeichen starker Strömung	
<i>Oberer Teil der untersten Plattensandsteine</i>	gelb-grau gefleckte Mergel-Sandstein-Serien	plattige Sandsteine und bunte Mergel wechselnd mit Nagelfluhbänken	gelb-grau gefleckte und bunte Mergel-Sandstein-Serien und plattige Sandsteine im Wechsel mit Nagelfluhbänken	im unmittelbarer Liegenden der Hautetennagelfluh grüne Mergel mit Unio, darunter Sedimente wie an der Sitter	untergeordnet gelb-grau gefleckte Mergel-Sandstein-Serien	Plattensandsteine an der Basis Strandbildung mit gemischter Fauna, reich an verkie-selten Baumstämmen		P l a t t e n s a n d s t e i n e an der Basis Geröllbank mit Ostreen	
Lithologie									

Fazies		fluviatil-terrestrisch	fluviatil-terrestrisch z. T. brakisch	fluviatil-terrestrisch bis brakisch	limnisch, dar- unter fluviatil- terrestrisch bis brakisch- litoral	litoral- seltener fluviatil- terrestrisch	litoral-brackisch-neritisch?	
Morphologie		gegen W an- steigender Schuttfächer	Mündungs- gebiet. Kurz- fristige Meeres- einbrüche	zeitweise überfluteter Landrücken	Flussrinne mit zeit- weisem Eindringen des Meeres	meist über- fluteter alter Land- rücken	schwach abfallende Strandplatte W a t t e n m e e r	
Unterer Teil der untersten Platten- sandsteine		gelb-grau gefleckte Mergel- Sandstein- Serien	gelb-grau gefleckte und bunte Mergel-Sandstein-Serien mit Einschaltungen von plattigen und Platten-Sand- steinen			gelb-grau gefleckte und graue Mergel mit brackischer Mikrofauna Einlagerung von Kohlen- flözen mit limnischer Makrofauna	graue Mergel mit brackisch- litoraler Mikrofauna gelb-grau gefleckte Mergel, Mikrobefund limnisch- terrestrisch Plattensand- steine	Plattensandsteine An der Basis lokal Seelaffe
Fazies		Wie zur Zeit der Ablagerung des oberen Teils der untersten Plattensandsteine						
Morphologie		gegen W an- steigender Schuttfächer	wie zur Zeit der Ablagerung des oberen Teils der untersten Plattensandsteine					

gebracht wurde. Dass bei der Bildung der Seelaffen Strömungen mitbestimmend gewesen sein müssen, geht daraus hervor, dass diese durchgehend Gerölle, seltener verkieselte Baumstämme und Reste von Landsäugetern führen. Vermutlich handelte es sich um W—E gerichtete Strömungen, die aus der Küstenzone Schalenreste und Gerölle ins Meer hinaus verfrachteten. Bezeichnenderweise fehlen daher am W-Rande des Hörnlifächers (Gebiet zwischen Zürichsee und Goldingertobel) typische Seelaffen völlig (G. WELTI, Manuskript), indem hier diese W—E Strömungen vom offenen Meer gegen den Schuttfächer (Küste) hin gerichtet waren.

**Zone der Unteren Plattensandsteine und der Nagelfluh mit seelaffeähnlichen  
Bildungen an der Basis, im Westen = Obere Seelaffe im Osten**

(siehe Fig. 1, Tafel XIII und Tabelle 7)

Bis zur Ablagerung der Ringelsbergnagelfluh<sup>6)</sup> veränderten sich die paläogeographischen Verhältnisse nur wenig. Periodisch drang das Meer in die ehe-




Fig. 2. Ringelsbergnagelfluh (Wattbach). Geröllgefüllte Priele in Plattensandsteinen.

maligen westlichen Mündungsgebiete, die schon während der Schüttung des Basis-konglomerates angelegt wurden.

Im Gebiet des Wattbaches (rechter Nebenbach der Sitter) ist der Wechsel zwischen marinen und terrestrischen, seltener limnischen Sedimenten besonders

<sup>6)</sup> Benannt nach dem Ringelsberg etwa 1 km SW St. Georgen bei St. Gallen.



gut zu beobachten. Erst mit der Schüttung der Ringelsberg-nagelfluh transgredierte das Meer bis zur Urnäsch, wofür graue, plattige Sandsteine, die mit der Nagelfluh verkeilt sind, sprechen. An der Sitter führt die Basis der Ringelsberg-nagelfluh marine Fossilien (*Cardien*), und zudem lassen sich hier schöne Verkeilungsphänomene mit Plattensandsteinen beobachten. Einzelne Schichtflächen der Plattensandsteine sind übersät mit etwa 1 cm hohen warzenähnlichen Erhebungen mit einem Durchmesser von 2–3 cm. Im Kern derselben erkennt man meist einen kohligen Rest, seltener auch etwas Pyrit. Vermutlich handelt es sich um Sandanhäufungen an der Stengelbasis von Wasserpflanzen. Etwas weiter E am Wattbach sind einzelne Prielen in den Plattensandsteinen zu beobachten, die von der nachfolgenden Nagelfluhschüttung ausgefüllt wurden.

Zur Zeit der Ablagerung der Plattensandsteine im Hangenden der Ringelsberg-nagelfluh verschob sich die Küste noch weiter gegen W. Die beiden Schwellenzonen an der Sitter und im Gebiet von St. Georgen waren fast ständig überflutet. Bereits zu dieser Zeit machte sich ein sekundäres Senkungsfeld im Gebiet der




Fig. 3. Untere Plattensandsteine an der Goldach. Prielen von massigem (rechts) in dünnplattigem Sandstein (links). (Photo G. Welti.)

Sitter bemerkbar, indem die westliche Mündungsbucht sowie die Schwellenzone an der Sitter fast ständig vom Meer überflutet waren.

Einzig ein roter knolliger Kalk an der Sitter deutet eine kurzfristige Emersionsphase an. In der mittleren Bucht im Gebiet E Lustmühle hingegen wechseln marine und terrestrische Sedimente in vermehrtem Masse, obwohl durch die Schüttung der Ringelsberg-nagelfluh gerade in diesem Abschnitt eine starke Aus-



Tabelle 7. Untere Plattensandsteine — Nagelfluh im Liegenden der oberen Flözgruppe im W = Obere Seelaffe im E

	Glatt	Herisau-Wilen	Sturzenegg	Urnäsch	Sitter	Wattbach-Rietbüsli	St. Georgen Kapf	Goldach	E-Goldach bis Rheintal
<i>Obere Seelaffe</i> Lithologie	Nagelfluh, unterlagert von gelb-grau gefleckten Mergeln	Nagelfluh, plattige Sandsteine	Nagelfluh, im oberen Teil Einlagerung einer typischen Seelaffe	Nagelfluh z. T. reich an verkieselten Hölzern	Nagelfluh unterlagert von Plattensandsteinen und seelaffeähnlichen Bildungen	Nagelfluh unterlagert von Plattensandsteinen und grauen Mergeln	Plattensandstein Cardien, Heliciden, reich an verkieselten Hölzern. Darunter Nagelfluh mit Seelaffe an der Basis	Seelaffe reich an verkieselten Hölzern	Seelaffe verkieselte Hölzer selten. Im Burgtobel zwei Horizonte, getrennt durch einige Meter Plattensandstein
Fazies	fluviatil-terrestrisch	brackisch-litoral							
Morphologie	gegen W ansteigender Schuttächer	breite Flussrinne kurzfristiger Meeres-einbruch	Meeresbucht, Einmündung eines oder mehrerer Flussarme			schwach ausgeprägte Schwellenzone		gegen das Rheintal hin schwach geneigte Strandplatte grosse Küstennähe	
<i>Zone zwischen oberer Seelaffe und Ringelsbergnagelfluh</i> Lithologie	nichtmarine Nagelfluh-Sandstein-Mergel-Serien		Plattensandsteine, Basis reich an Spiralsteinen	Plattensandsteine, Basis reich an Spiralsteinen	Plattensandsteine, lokal Schiefermergel, Geröllnester und Geröllschnüre	Plattensandsteine, lokal Schiefermergel, Geröllnester und Cardien, Ostreen	Plattensandsteine	Plattensandsteine Fossilhorizont	Plattensandsteine Seelaffe Plattensandsteine
			unterlagert von rotem knolligem Kalk, Nagelfluhbänken, gelb-grau gefleckten Mergeln, seltener plattigen Sandsteinen	unterlagert von rotem Kalk verkeilt in Nagelfluh und Plattensandsteinen Cardien Pholaden Ostreen, Tapes	Mächtigkeit etwa 80 m	Mächtigkeit etwa 30 m		etwa 10 m tiefe Priele in feinplattigem Sandstein, ausgefüllt mit grobgebanktem Sandstein	

l i t o r a l

		l i t o r a l - n e r i t i s c h			
Fazies	fluviatil-terrestrisch	im oberen Teil litoral im unteren Teil fluviatil- terrestrisch seltener brackisch	litoral, kurzfristige Emerision (roter Kalk)	relativ tiefe Meeresbucht. Sukzessive Auffüllung	Rheintalbucht Wattenmeer Senkung und sukzessive Auffül- lung halten sich die Waage
Morphologie	gegen W ansteigender Schuttfächer	schwach ausgeprägte Flussrinne, Meeresbucht	Schwellenzone	ständig überflutete Schwellenzone	
<i>Ringelsberg- nagelfluh</i>	N a g e l f l u h	Basisver- keilungen mit plattigen Sand- steinen	Nagelfluh, die unteren paar Meter schöne Verkeilungen in Platten- sandstein, Cardien verkieselte Hölzer	Nagelfluh z. T. Seclaffe- Charakter	Geröllschnur Cardien Platten- sandsteine
Lithologie					
Fazies	fluviatil-terrestrisch	brackisch	l i t o r a l - n e r i t i s c h		
Morphologie	geröllfreier Landrücken	gegen W ansteigender Schuttfächer	überflutete Schwellenzone	Anlage einer Bucht durch Vertiefung und Verbreiterung einer alten Flussrinne	Breite überflutete Schwelle Wattenmeer gegen die Rheintalbucht hin schwach geneigte Strandplatte Wattenmeer
<i>Zone zwischen Ringelsberg- nagelfluh und unterer Seclaffe</i>	Nagelfluh-Sandstein- Mergel-Serien	Nagelfluh- Sandstein- Mergel-Serien mit lokalen Einlagerungen von plattigen Sandsteinen	Nagelfluh- Sandstein- Mergel-Serien plattige Sand- steine selten	plattige Sand- steine und Plattensand- steine, Geröll- bänke, Cardien gelb-grau gefleckte Mergelserien seltener	Plattensandsteine lokal fossilführend
Lithologie					
Fazies	fluviatil-terrestrisch	fluviatil- terrestrisch z. T. brackisch	fluviatil- terrestrisch z. T. brackisch	litoral, unter- geordnet fluviatil- terrestrisch	litoral - neritisch
Morphologie	gegen W ansteigender Schuttfächer, geröllfreier Landrücken	breite Wanne kurzfristige Brackwasser- einbrüche	seltener über- fluteter Land- rücken	alte Flussrinne, meist unter Meeresbe- deckung	gegen das Rheintal hin schwach geneigte Strandplatte Wattenmeer breite meist überflutete ehemalige Landschwelle

räumung und Vertiefung stattfand. In der Folge wurden die beiden erwähnten Buchten bis zur Ablagerung der Oberen Seelaffe fast völlig aufgefüllt.

In der Zone der Unteren Plattensandsteine an der Goldach im Hangenden der Ringelsberg Nagelfluh, welche hier nur noch als Geröllschnur entwickelt ist, lässt sich ein bemerkenswerter lithologischer Gesteinswechsel beobachten, der bereits anhand einer Photographie von A. LUDWIG & CH. FALKNER (1903/4) festgehalten wurde und als Priele gedeutet werden muss. Feingeplatteter Sandstein im S stösst längs einer mit etwa 40° gegen N geneigten Fläche an grob gebankten Sandstein im N (siehe Fig. 3). Nur die S-Begrenzung der Priele ist aufgeschlossen, während die N-Grenze infolge des Schichtfallens unter das Niveau der Goldach zu liegen kommt.

Die Priele verläuft ungefähr in W—E-Richtung und besitzt eine Tiefe von über 10 m. Ähnliche Phänomene in diesem Ausmass sind im Untersuchungsgebiet nirgends sonst festgestellt worden. Es rechtfertigt sich daher, diese interessante Lokalität anhand einer Photographie (Fig. 3) nochmals wiederzugeben.

Mit der Schüttung der Nagelfluh mit seelaffeähnlichen Bildungen an der Basis und der Ablagerung der Oberen Seelaffe, als deren E-Fortsetzung, findet die grösste nach W reichende Transgression des Burdigalien statt. Marine, fossilführende Plattensandsteine sind etwa 1 km W von Sturzenegg<sup>7)</sup> in einem kleinen Bach anstehend, und plattige, vermutlich marine bis brackische Sandsteine sind kurz E Wilen (bei Herisau) aufgeschlossen (siehe Tafel XIII).

Auch die Bildung der Oberen Seelaffe, deren allmähliche Entwicklung aus einer Nagelfluhbank heraus beobachtet werden kann, spricht für eine W—E gerichtete Meeresströmung. So finden sich in den Aufschlüssen bei Blatten-Staad noch reichlich Gerölle, Reste von Landsäugern, Nesterkohle und seltener kleine Fragmente verkieselter Hölzer. Erwähnenswert ist ein bei Blatten-Staad gefundenes Asphaltstück, welches von *Teredo* angebohrt wurde. Das isolierte Vorkommen spricht gegen Autochthonie, gibt jedoch einen Hinweis, dass zur Zeit der Ablagerung der Oberen Meeresmolasse oberflächliche Asphaltvorkommen der Erosion anheimfielen, wobei es zur Verfrachtung von schwimmenden Asphaltbrocken durch die Meeresströmungen kam.

### BURDIGALER REGRESSIONSZYKLUS

Mit der Ablagerung der Oberen Seelaffe fand der burdigale Transgressionszyklus seinen Abschluss, und Regressionen beherrschten das Ablagerungsbild der höheren burdigalen Schichten.

#### **Zone der mittleren Plattensandsteine und der oberen Flözgruppe mit kohlig-kieseligen und kohlig-kalkigen Schichten**

(siehe Fig. 1, Tafel XIII und Tabelle 8)

Während im Gebiet der Goldach und E daran anschliessend bis zum Rheintal eine monotone Serie von Plattensandsteinen abgelagert wurden, zeichnen sich die

<sup>7)</sup> 1 km S des Zusammenflusses der Sitter und der Urnäsch, W der Urnäsch.

W-Gebiete durch eine äusserst interessante Gesteinsfolge aus. Unmittelbar über der Nagelfluh mit seelaffeähnlichen Bildungen an der Basis folgen einige Meter lokal fossilführende Plattensandsteine, die bei St. Georgen reich an verkieselten Hölzern sind (siehe Tafel XIII). Sie werden von grauen Mergeln überlagert, in welchen sich die von U. BÜCHI & F. HOFMANN (1945) beschriebene obere Kohlenflözgruppe befindet. Damals wurden von den beiden Autoren die Flöze und die grauen Mergel als limnische Bildung angesehen und in paläogeographischer Hinsicht als Ablagerung in einem breiten Küstensumpfe gedeutet. Durch die mikropaläontologischen Untersuchungen gelangt man heute zu einer etwas modifizierteren Auffassung. Dank dem massenweisen Auftreten von *Planorben* (meist nur kleine Individuen) steht der limnische Charakter der Flöze selbst über jedem Zweifel. Die grauen Mergel im Liegenden und Hangenden der Flöze, wie auch jene zwischen den Flözen bei St. Georgen selbst, führen eine reiche litorale Mikrofauna. Dieser rasche mehrmalige Wechsel zwischen litoralen und ausgesprochen limnischen Sedimenten kann nicht durch Ablagerung in einem Küstensumpf allein erklärt werden, es muss noch ein weiterer Faktor hinzutreten, für welchen aber keine direkten Beobachtungen vorliegen. Die Meeresbucht, welche zur Zeit der Ablagerung der Oberen Flözgruppe den Raum zwischen dem gegen W ansteigenden Schuttfächer (E Sturzenegg) und der Schwellenzone bei St. Georgen einnahm, wurde vermutlich kurz nach der Schüttung der liegenden Nagelfluh durch eine W—E-Strömung abgeschnürt und haffartig geschlossen. Starke Süswasserzufuhr oder ein periodisches Schliessen des Haffs führte zur raschen Aussüssung und Entwicklung der limnischen Faunen. Dieser Vorgang hat sich mindestens zweimal abgespielt.

Auf diese erste Regression folgte eine kurzfristige, doch weit gegen W reichende Transgression. Es kam zur Sedimentation von Plattensandsteinen mit einer Cardienbank an der Basis, die durchgehend von St. Georgen bis nach Sturzenegg die Flözgruppe im Hangenden begleitet. Lokal führt die Cardienbank (Urnäsch) *Tapes*, *Turritella* und *Natica*.

Über den Plattensandsteinen folgen an der Urnäsch gelbe Mergelserien, in welchen einzelne *Heliciden* gefunden wurden. An der Sitter kann schon im unteren Teil dieser Mergelzone eine Verkeilung und Wechsellagerung mit Plattensandsteinen beobachtet werden. In den höheren Teilen dieser Zone verlagert sich das Gebiet der seitlichen Verzahnungen zwischen gelben Mergeln und Plattensandsteinen immer weiter gegen E und deutet eine sukzessive Regression des Meeres an. Bis zur Ablagerung der Kamelenbergnagelfluh<sup>8)</sup> verschob sich die Küste bereits bis ins Gebiet des Falkenwaldes<sup>9)</sup>. Nach der Schüttung der genannten Nagelfluh fanden keine wesentlichen Regressionen statt, und im Gebiet des Falkenwaldes selbst wurden bis zur nächsten Schüttung (Biserhofnagelfluh<sup>8)</sup>) Plattensandsteine abgelagert, die im obersten Teil reich an Pflanzenresten sind. Etwas weiter E bei Kamelenberg (Gebiet der Schwellenzone von St. Georgen) sind marine, fossilführende Sandsteine, überlagert von fluvioterrestrischen Mergeln, anstehend. Mit der Schüttung der Biserhofnagelfluh fand die erste Phase des burdigalen Regressionszyklus ihren Abschluss.

<sup>8)</sup> Biserhof und Kamelenberg kurz E St. Georgen.

<sup>9)</sup> W St. Georgen.

Tabelle 8. Mittlere Plattensandsteine — Zone der oberen Flözgruppe

	Herisau	Sturzenegg	Urnäsch	Sitter	Riechüsi Falkenwald	St. Georgen	Goldach	Witenbach	E-Wittenbach bis Rheintal
<i>Oberer Teil der Nagelfluhdoppel- bank = Biserhof- nagelfluh</i> Lithologie	Nagelfluh								
Fazies	fluviatil-terrestrisch				Pflanzen- führende Sandstein- linsen	evtl. brackisch bis litoral	evtl. brackisch bis litoral	litoral	bis neritisch
Morphologie	gegen W ansteigender Schuttfächer		Schüttungs- zentrum	gegen E schwach abfallende Strandplatte, Wattenmeer, geringe Wassertiefe					
<i>Schichten zwischen den beiden Nagel- fluhbänken</i> Lithologie	gelb-grau gefleckte, seltener bunte Mergel-Sandstein-Serien		Schichtfuge	Schichtfuge	Plattensand- steine, reich an Pflanzen	gelb-grau gefleckte Mergel unterlagert von Plattensand- stein. Ostreen, Tapes, Cardien, Solen. Pflanzen			Plattensandstein
Fazies	fluviatil-terrestrisch		Ausräumung durch nach- folgende Nagelfluhschüttung			litoral bis neritisch schwach ausge- prägte Schwelle			
Morphologie	gegen W ansteigender Schuttfächer		-- --			gegen E schwach abfallende Strandplatte, Wattenmeer, geringe Wassertiefe			
<i>Unterer Teil der Nagelfluhdoppel- bank = Kamelen- bergnagelfluh</i> Lithologie	Nagelfluh								
Fazies	fluviatil-terrestrisch				evtl. brackisch			litoral bis neritisch	
Morphologie	gegen W ansteigender Schuttfächer		Schüttungs- zentrum	gegen E flach abfallende Strandplatte, Wattenmeer, geringe Wassertiefe					

<p><i>Zone zwischen Kamelenberg-nagelfluh und Cardienbank</i></p> <p>Lithologie</p>	<p>gelb-grau gefleckte Mergel</p> <p>N a g e l f l u h</p> <p>gelb-grau gefleckte Mergel</p>	<p>kleines Kohlenflöz</p> <p>Plattensandstein</p>	<p>gelb-grau gefleckte Mergel, im untern Teil wechselnd mit Plattensandstein. Zunahme gegen E</p> <p>Plattensandstein</p> <p>Cardienbank</p>	<p>Plattensandstein</p> <p>Seelaffe</p>	
<p>Fazies</p>	<p>fluviatil-terrestrisch</p> <p>im unteren Teil litoral, gegen E auch höhere Komplexe litoral</p>			<p>litoral bis neritisch</p>	
<p>Morphologie</p>	<p>gegen W ansteigender Schuttfächer</p>	<p>Zone starker Küstenschwankungen, von unten nach oben generell regressiv</p> <p>Cardienbank = typischer Transgressionshorizont</p>			<p>gegen E flach abfallende Strandplatte, Wattenmeer geringe Wassertiefe</p>
<p><i>Zone der oberen Flözgruppe</i></p> <p>Lithologie</p>	<p>fluviatile Mergel-Sandstein-Serien</p>	<p>graue Mergel mit 1 Kohlenflöz, begleitet von kohligem Kalk und kohlig-kieseligem Gestein und 1 Kohlenflöz mit kohligem Kalk (Planorben)</p>	<p>graue Mergel mit 1 Kohlenflöz, begleitet von kohligem Kalk und kohlig-kieseligem Gestein (Planorben)</p> <p>im grauen Mergel litorale brackische Mikrofauna</p>	<p>Plattensandstein</p>	
<p>Fazies</p>	<p>litorale Sedimente im Wechsel mit limnischen Ablagerungen</p>			<p>litoral bis neritisch</p>	
<p>Morphologie</p>	<p>gegen W ansteigender Schuttfächer</p>	<p>ruhige Meeresbucht, geringe Zufuhr von psammitischem Material. Marine Mikrofauna, jedoch keine marine Makrofossilien. Vermutlich haftartig geschlossene Bucht. Zeitweise völlige Aussüssung und Bildung von Küstensümpfen mit üppigem Pflanzenwuchs und limnischer Fauna, Zufuhr von Kieselsäure durch thermale Quellen, deren Austritte im unmittelbar südlich gelegenen Schuttfächer teil zu lokalisieren sind</p>			<p>gegen E schwach abfallende Strandplatte, Wattenmeer</p>



Tabelle 9. Burdigaler fluvioterrestrischer, im E brackischer Zwischenkomplex

	W Urnäsch Bach E Engelen	Sitter W-Ufer	Sitter E-Ufer	Freudenberg	Goldach	Bettleren- bach	Kräzertobel	Rheintal
<b>Lithologie</b>	2 Kohlenflöze begleitet von kohligem Kalk (Planorben, Ostracoden) in gelben Mergeln Nagelfluh gelb-grau- gefleckte Mergel-Sand- stein-Serien	graue Mergel (Limnaea, Brotia), wenig W im Stollen des Kraft- werkes kleines Kohlenflöz Nagelfluh- Sandsteinzone (Delta- schichtung) untergeordnet bunte Mergel	gelb-grau gefleckte und bunte Mergel-Sand- stein-Serien	gelb-grau gefleckte Mergel	gelb-grau gefleckte Mergel mit grauem schwach koh- ligem Mergel- band Heliciden, Schildkröten, Säugetiere, brackische Mikrofauna	gelb-grau gefleckte Mergel Heliciden	gelb-grau gefleckte Mergel mit kleinem Kohlenflöz begleitet von kohligem Kalk (Planorben)	Aufschlüsse fehlen
<b>Fazies</b>	im oberen Teil limnisch im unteren Teil fluviatil- terrestrisch		fluviatil-terrestrisch				z. T. durch Freudenbergnagelfluh-Schüttung ausgeräumt	
<b>Morphologie</b>	flaches Flußschwemmland mit ausgedehntem Süßwassertümpel							seichte Küstenzone mit häufigen Emerisionen und Anlage lokaler Süßwassertümpel



### **Burdigaler Zwischenkomplex**

(siehe Fig. 1, Tafel XIII und Tabelle 9)

Mit der Ablagerung der gelbgraugefleckten Mergelserien im burdigalen Zwischenkomplex kam es zum endgültigen Rückzug des Meeres aus dem Untersuchungsgebiet. In den Mergelserien konnten nirgends marine Makrofossilien gefunden werden. An der Goldach und E davon führen die Mergel eine brackische Mikrofauna, und lokal z. B. am Bach im Frauenwald (S-Untereggen) treten in den gelbgrauen Mergelserien graue sandige Mergellagen auf, die an marin-brackische Serien erinnern. Ob diese brackischen Zonen noch mit dem offenen Meer in Verbindung standen oder ob es sich um lokale Salzwassertümpel gehandelt hat, die langsam ausgesüsst wurden und verlandeten, kann nicht entschieden werden. Im Gebiete zwischen Bach W-Engelen (E-Herisau) und der Sitter und im untern Kräzerntobel bei Loch S-Rorschach sind ausserdem limnische fossilführende Schichten anstehend.

Die stratigraphische Auswertung des Fossilinhaltes, besonders der Säugetiere, ergab für den burdigalen Zwischenkomplex ein unterburdigales Alter und eine beträchtliche Schichtlücke gegen das hangende Helvétien. Weder lithologisch noch durch Diskordanzen kommt dies zum Ausdruck. Wohl besteht eine gewisse Abnahme der Mächtigkeit des Zwischenkomplexes in östlicher Richtung, doch ist diese auf Erosionsvorgänge und Anlage eines Kliffs im Gebiete E des Freudenberges während der Helvétientransgression zurückzuführen.

## DER UNTERHELVETISCHE SEDIMENTATIONSZYKLUS

### **Transgression des Helvétienmeeres und Ablagerung der Freudenbergnagelfluh<sup>10)</sup>**

(siehe Fig. 1, Tafel XIII und Tabelle 10)

Eine weitere starke Senkungsphase des Molassetroges bewirkte, dass das Meer erneut in das Untersuchungsgebiet eindrang, und gleichzeitig wurden wieder starke Schüttungsarme des Ur-Rheines aus der Hauptachse in das Senkungsfeld des unteren st. gallischen Rheintales und Bodensees abgelenkt. Gegenüber dem Burdigalien fand im Helvétien eine Verbreiterung dieser Senkungszone gegen W statt bis ins Gebiet zwischen Freudenberg und Goldach. Es kam hier primär schon zu einer tektonischen Anlage eines Kliffs (Schwellenzone von St. Georgen), welches durch teilweise Erosion des burdigalen Zwischenkomplexes zur Zeit der Helvétientransgression noch erhöht wurde. Die Kliffhöhe betrug etwa 70–80 m.

Die Schüttung der Freudenbergnagelfluh (Helvétienbasis) zeichnet sich durch einen vorerst schwachen, lokal von Plattensandsteinen unterlagerten Geröllschub aus, gefolgt von einer ruhigen Sedimentationsphase mit Ablagerung von grauen Mergeln und fossilführenden Plattensandsteinen, an welche nun die Hauptschüttungsphase anschloss. Schon der erste Geröllschub machte sich bis ins Bodenseegebiet geltend, wobei wieder eine starke W—E-Strömung den Transport der Gerölle aus der Küstenzone ins Meer hinaus begünstigte. Lokal besitzt die Freudenbergnagelfluh ausgesprochenen Seelaffe-Charakter, so etwa 1 km E der Goldach und

<sup>10)</sup> Benannt nach dem Freudenberg, Anhöhe S der Stadt St. Gallen.

Tabelle 10. Freudenbergnagelfluh

	W-Herisau	Walketobel Bach E Engelen	Sitter	Mühleek	Freudenberg	Scheitlins- büchel	Goldach	Bettleren- bach	E-Rorschach	Staad
<b>4. Phase</b> Lithologie	N a g e l f l u h		verschmolzen mit 2. Phase	im obersten Teil fossil- reich		fehlt oder nur rudimentär entwickelt	Geröllbänder, lokal seelaffähnlich	Schnüre und -Nester	Geröll- führender fossilreicher Sandstein seelaffe- ähnlich	
<b>Fazies</b>	fl u v i a t i l		evtl. litoral- brackisch	l i t o r a l b i s n e r i t i s c h						
<b>Morphologie</b>	gegen W ansteigender Schuttfächer		Schüttungs- zentrum Völlige Aus- räumung der Sedimente der 3. Phase	Strandplatte	Klifftrand	Kliff- böschung	Rorschacherbucht = gegen W erweiterte Rheintalsenke			
<b>3. Phase</b> Lithologie	Sandsteine und Mergel	gelbliche Sandsteine und Mergel limnischer Mikrobefund	fehlt infolge Erosion	nicht auf- geschlossen	graue Mergel und Platten- sandstein Ostreen, Teredobohr- gänge in Kohle	fehlt oder nur rudimentär vorhanden	Plattensandsteine			
<b>Fazies</b>	fl u v i a t i l - l i m n o t e r r e s t r i s c h		evtl. litoral- brackisch	l i t o r a l b i s n e r i t i s c h						
<b>Morphologie</b>	w i e i n d e r 4. P h a s e									

<p><b>2. Phase</b> Lithologie</p>	<p>N a g e l f l u h</p>			<p>Erosion</p>	<p>Geröllbänder, -Schnüre und -Nester lokal seelaffähnlich  Ostreabank</p>	<p>gering- mächtige Nagelfluh- bank</p>	
<p><b>Fazies</b></p>	<p>fluviatil-terrestrisch</p>			<p>l i t o r a l b i s n e r i t i s c h</p>			
<p><b>Morphologie</b></p>	<p>gegen W ansteigender Schuttfächer</p>	<p>Schüttungs- zentrum</p>	<p>Strandplatte</p>	<p>Kliffwand</p>	<p>Kliff- böschung</p>	<p>Rorschacherbucht = gegen W erweiterte Rheintalsenke</p>	
<p><b>1. Phase</b> Lithologie</p>	<p>Ablagerungen fehlen primär oder infolge Erosion zur Zeit der Schüttung der Nagel- fluh der 2. Phase</p>			<p>nicht auf- geschlossen</p>	<p>Erosion</p>	<p>Plattensandsteine  Ostreen brackische Mikrofauna</p>	
<p><b>Fazies</b></p>	<p>fluviatil-terrestrisch</p>			<p>litoral bis brackisch  vorwiegend litoral, lokal brackisch</p>			
<p><b>Morphologie</b></p>	<p>gegen W ansteigender Schuttfächer</p>			<p>gegen Ende der 1. Phase überflutete Strandplatte</p>			<p>Starke Senkungsvorgänge im Gebiete des Rheintales, Trans- gression des Helvétienmeeres. Bildung einer Abrasionsplatte durch teilweise Erosion des burdigalen Zwischenkomplexes. Bildung eines Kliffs zwischen Freudenberg und Goldach: primär infolge Senkungsvorgänge, sekundär durch Erosionsvorgänge verstärkt</p>

Tabelle 11. Zone der Schiefermergel

	W-Glatt	Glatt	Herisau	Bach E-Engelen	Sitter	St. Georgen	Goldach	E-Goldach
Lithologie	Nagelfluh bunte und gelb-grau-gefleckte Mergel-Sandsteinserien	Schiefermergel mit durch Pholaden angebohrten Geröllrollen brackische Mikrofauna	Plattensandsteine unterlagert von Schiefermergeln mit durch Pholaden angebohrten Geröllrollen	Plattensandsteine unterlagert von Schiefermergeln	Plattensandsteine unterlagert von Schiefermergeln mit durch Pholaden angebohrten Geröllrollen	Plattensandsteine unterlagert von Schiefermergeln	Plattensandsteine unterlagert von Schiefermergeln, lokal Geröllschnüre und -Bänder z. T. wechselnd mit Plattensandsteinen, besonders an der Basis	
Fazies	fluviatil-terrestrisch	brackisch-litoral	litoral bis neritisch					
Morphologie	gegen W ansteigender Schuttfächer		Strandplatte			Schwelle, östlich daran anschliessend Kliff	Rorschacherbucht, relativ grosse Wassertiefe bis zu ca. 100 m sukzessive Auffüllung: z. Z. der Schüttung der Dreilindennagelfluh weitgehend abgeschlossen	

relativ arten- und individuen-arm

arten- und individuenreiche Fossilfundstellen

am Hurlibuck (Felsriff im Bodensee) bei Staad. Im Frauenwald, S-Untereggen, ist sie als geröllführende Austernbank entwickelt.

W des Kliffs, welches schon zur Zeit der Schüttung der Freudenbergnagelfluh überflutet wurde, schloss sich eine flache Strandplatte an, die W der Menzeln (Höhenzug SW St. Gallen) muldenförmig eingesenkt war, mit tiefstem Punkt im Sitterquerschnitt. Längs der Klifflinie fanden während des ganzen Helvétien Hebungen statt; die Schwellenzone von St. Georgen, welche während des ganzen Burdigalien wirksam war, erhält sich somit auch noch während des Helvétien.

### Zone der Schiefermergel

(siehe Tafel XIII, Tabelle 11)

Im gesamten Untersuchungsgebiet zeichnet sich das Untere Helvétien durch eine monotone Gesteinsfolge aus, die sog. Schiefermergel (Wechsel von wenig mm dicken Sandstein- und Mergellagen). Lokal, besonders aber im basalen und obern Teil dieser Zone, treten vermehrt Plattensandsteine auf. Einzelne Geröllschnüre, meist ausgesprochene Fossilhorizonte, lassen sich oft über mehrere Kilometer verfolgen. Nennenswert sind zwei Geröllbänder, die sich von der Glatt bis an die Sitter verfolgen lassen, deren Kalkgerölle von *Pholaden* durchlöchert sind. Auch hier muss eine relativ starke W—E gerichtete Strömung zur Ausbreitung der angebohrten Gerölle aus der Strandzone im W, ins Meer hinaus beigetragen haben. Fossilanhäufungen (Turritellenmassengräber, Pectenhorizonte usw.) lassen darauf schliessen, dass Änderungen des Salzgehaltes in Nähe der Ästuarrien lokal zu Massensterben der Faunen führte.

Zur Zeit der Sedimentation der Schiefermergel fand die am weitesten gegen das Schuttfächerzentrum hin reichende Transgression des Miozänen Meeres statt (Schloss an der Glatt). Die Rheintal-Bodensee-Bucht und das Senkungsfeld im Sitterquerschnitt wurden während der Ablagerung der Zone der Schiefermergel fast völlig aufgefüllt, und der oberhelvétische Sedimentationszyklus traf auf ein im Grossen nur wenig differenziertes Relief.

## OBERHELVÉTISCHER SEDIMENTATIONSZYKLUS

### Schüttung der Dreilindennagelfluh<sup>11)</sup>

(siehe Fig. 1, Tafel XIII und Tabelle 12)

Der oberhelvétische Sedimentationszyklus beginnt mit einer Nagelfluhschüttung und einer neuen Transgression, die lokal von Erosionserscheinungen begleitet ist. An der Goldach (siehe Fig. 4) erkennt man auf der Oberfläche der Schiefermergel prielentartige parallel verlaufende Rinnen, in welchen bei der nachfolgenden Schüttung der Dreilindennagelfluh Gerölle abgelagert wurden. Diese Rinnen verlaufen ungefähr von S gegen N und stehen somit beinahe senkrecht zur Strömungsrichtung, welche in der Folge die Gerölle aus dem Küstengebiet ins Meer hinaus verfrachteten. Die Anlage dieser Rippen und Rinnen muss somit schon vor Ablagerung der Dreilindennagelfluh stattgefunden haben, gefolgt von einer starken

<sup>11)</sup> Dreilinden, Geländerippe S St. Gallen (N-Hang des Freudenbergs).

diagenetischen Verfestigung der Schiefermergel, da die quer zur Strömung verlaufenden Rippen während der Nagelfluhschüttung nicht zerstört wurden. Weiter im E am Bettlerenbach, im Stollen S-Sulzberg und bei Mariaberg (Rorschach) liegt die als Geröllschnur ausgebildete Dreilindennagelfluh (siehe Fig. 5),




Fig. 4. Detailprofil an der Grenze zwischen oberem und unterem Helvétien an der Strasse Martinsbrücke–Untereggen (Martinstobel–Goldach). (Gez. nach Photo.)




Fig. 5. Bettlerenbach S Rorschach. Kontakt zwischen oberem und unterem Helvétien. PL Zone der Oberen Plattensandsteine; DN Dreilindennagelfluh (als Geröllschnur entwickelt); SCH Zone der Schiefermergel.

welche von Plattensandsteinen überlagert wird und teilweise mit diesen verkeilt ist, in scharfem Kontakt auf den Schiefermergeln. Dieser plötzliche Fazieswechsel deutet auch auf eine rasche Änderung der Ablagerungsverhältnisse, wie sie nur durch einen Sedimentationsunterbruch zu erklären sind. Obwohl sich nirgends Verwitterungshorizonte feststellen lassen, kann mit Sicherheit angenommen werden, dass nach Ablagerung der Schiefermergel Regressionen stattgefunden haben, verbunden mit einer Sedimentationspause, in welcher die Sand- und Schlamm-Massen des Unteren Helvétien weitgehend diagenetisch verfestigt wurden. Durch Erosion kam es dann lokal zur Anlage der genannten prielen-



Table 12. Zone der oberen Plattensandsteine und Dreiländennagelfluh

<i>Plattensandsteine oberer Teil</i> Lithologie	Glatt	Herisau	Moosbergbach	Bach W Engelen	W Sitter E	Menzeln	Steinach	Hagenbuch	Grütli	Goldach	E-Goldach
	Nagelfluh Mergel und Sandstein	nicht aufgeschlossen	plattige Sandsteine	nicht aufgeschlossen	bunte Mergel, Sandsteine, knollige Kalke	Schiefermergel Plattensandstein	subaquatische Rutschung	Geröllband	Plattensandsteine	subaquatische Rutschung	keine Fossilien
Fazies	fluviatil-terrestrisch	fluviatil-terrestrisch z.T. brackisch-litoral		l i t o r a l							
Morphologie	gegen W ansteigender Schuttfächer	breite Flussrinne, zeitweise kurzfristige Meeresinbrüche		Schwellenzone	flache Wanne	Schwellenzone	Strandplatte, Wattenmeer monotone Sedimentation				
<i>Plattensandsteine unterer Teil</i> Lithologie	Nagelfluh Mergel und Sandstein	roter Mergel unterlagert von Platten-sandstein, see-laffähnliche Fossilbank	Plattensandstein und Schiefermergel, Einlagerung von see-laffähnlichen Bänken	Schiefermergel und Plattensandstein	Plattensandstein	Plattensandstein	Plattensandstein und Schiefermergel Plattensandstein				
Fazies	fluviatil-terrestrisch	l i t o r a l									
Morphologie	gegen W ansteigender Schuttfächer	Strandplatte, durch Buchten und Becken gegliedert. Artenarme, jedoch individuenreiche Fossilfundstellen		stärker überflutete Strandplatte. Arten- und individuenreiche Fossilfundstellen	Wattenmeer mit monotoner Sedimentation						
<i>Dreiländennagelfluh</i> Lithologie	N a g e l f l u h	Plattensandstein	N a g e l f l u h		fossilführend	z.T. Fossilagglomerat		Geröllschnur, Peecten, Cardien, Ostreen			
Fazies	fluviatil	l i t o r a l									
Morphologie	Flussrinne	Sandbarre Strandwall	breite Mündungsbucht eines Flussarmes		Wattenmeer, Gerölle durch Gezeiten und Strömungen aus den Westgebieten verfrachtet und flächenhaft ausgebreitet liegende Schichten teilweise erodiert vermutlich kurzfristige Regression gefolgt von erneuter Transgression						



artigen Rinnen. Eine subaquatische Rutschung im Gebiet der Sitter, von welcher die Geröllmassen der Dreilindennagelfluh erfasst wurden, dürfte ebenfalls auf Anlage einer Terrainböschung in der erwähnten Regressionsepoche zurückzuführen sein. Mit der Schüttung der Dreilindennagelfluh transgredierte das Meer wieder weit gegen W bis ins Gebiet von Herisau.

Eine ähnliche Zweiteilung des Helvétien wird aus dem Hochrheingebiet zwischen Zurzach und Eglisau (E. v. BRAUN 1953) beschrieben. Es lassen sich dort an der Grenze zwischen den beiden Sedimentationszyklen lokal Verwitterungshorizonte beobachten, sowie eine diagenetische Verfestigung und teilweise Aufarbeitung der tieferen Stufe.

### **Zone der Oberen Plattensandsteine**

(siehe Tafel XIII und Tabelle 12)

Die Zone der Oberen Plattensandsteine lässt sich W der Goldach in ein unteres und oberes Stockwerk gliedern: Im Zusammenhang mit einer erneuten Senkung im Gebiete der Rheintal-Bodensee-Bucht kam es wieder zu Geröllschüttungen in die Ostgebiete und zur Ablagerung einer Nagelfluhbank zwischen Glatt und Sitter und einem lokalen Geröllband im Hagenbuchwald<sup>12</sup>). An der Goldach und an der Steinach findet sich im gleichen Niveau innerhalb der Plattensandsteine eine subaquatische Rutschung, deren Ursache mit den genannten Senkungsvorgängen zusammenhängen muss (stark verfälschte Sandsteine auf ebener Unterlage).

Während im tiefern Teil der Plattensandsteine keine Anzeichen für eine Küstenverschiebung gegen E zu beobachten sind, zeichnet sich das höhere Stockwerk durch starke Regressionen aus, die zeitweise bis zur Sitter reichten. So stehen am W-Ufer im Liegenden der Oberen Grenznagelfluh bunte Mergel, Sandsteine und rote, knollige Kalke an. Bereits am E-Ufer treten an ihre Stelle fossilführende Plattensandsteine, wechselnd mit grauen Mergeln. Die Zone der Oberen Plattensandsteine weist im Gebiet von St. Georgen eine starke Reduktion der Mächtigkeit auf. Diese ist auf Hebungen in dieser alten Schwellenzone zurückzuführen.

### **Ablagerung der Oberen Grenznagelfluh und Regression des Helvétienmeeres aus dem Untersuchungsgebiet**

(siehe Fig. 1, Tafel XIII und Tabelle 13)

Die Schüttung der Oberen Grenznagelfluh lässt sich in drei Phasen gliedern, in eine tiefere, schwache Schüttungsphase, eine mittlere Phase ruhiger Sedimentation und teilweiser Emersion, gefolgt von der Hauptschüttungsphase.

In der tiefsten Phase war die Verteilung von Land und Meer ähnlich wie zur Zeit der Ablagerung des höheren Teils der Zone der Oberen Plattensandsteine. Die Nagelfluh und die mit ihr verzahnten Sandsteine führen lokal (Steinach, Menzeln<sup>13</sup>) marine Petrefakten. Lokal, besonders aber im Gebiete des Müllitobels (Steinachschlucht zwischen St. Georgen und St. Gallen), lassen sich schöne Übergußschichten beobachten (siehe F. SAXER 1929/30).

<sup>12</sup>) Hagenbuch, Quartier im E-Teil der Stadt St. Gallen; Hagenbuchwald südlich davon.

<sup>13</sup>) Hügelzug S St. Gallen.

Table 13. Obere Grenznagelfluh

	W-Sitter	Sitter	Menzeln	Steinach	Goldbrunnen	Grütli	Goldach	Bettleren- bach
3. Phase Lithologie		N a g e l f l u h			Schiefermergel und Platten- sandstein fossilreich	innerhalb der Basis Cardien	N a g e l f l u h	
Fazies	f l u v i a t i l							
Morphologie	schiefer Schnitt durch eine Flussrinne		Schüttungs- zentrum		Meeresbucht im toten Winkel zwischen den beiden Schüt- tungsarmen		schiefer Schnitt durch eine Flussmündung	
	H a u p t s c h ü t t u n g s p h a s e d e r O G N							
2. Phase Lithologie	graue und gelb- graugefleckte Mergel und Sandsteine	fehlt infolge Erosion durch die 3. Phase	gelb-grau gefleckte und bunte Mergel	bunte Sand- steine und Mergel, z. T. erodiert durch die 3. Phase	Schiefermergel und Platten- sandstein fossilreich	Plattensand- stein und graue Mergel Cardien, Tapes Pecten	graue Kalk- mergel	fehlt primär oder infolge Erosion
Fazies	f l u v i a t i l t e r r e s t r i s c h							
Morphologie	gegen W flach ansteigendes Delta							
1. Phase Lithologie	Nagelfluh	Nagelfluh mit 3. Phase verschmolzen	Nagelfluh und marine Plattensand- steine	Nagelfluh, rote Sandsteine und Mergel Plattensand- steine (Car- dien). Pracht- volle Delta- schichtung	Nagelfluh	Nagelfluh und fossil- führende Sandsteine	Nagelfluh	fehlt primär oder Verschmel- zung mit 3. Phase
Fazies	f l u v i a t i l							
Morphologie	gegen W ansteigender Schuttfächer							
	l i t o r a l							
	l i t o r a l							
	relativ flache Strandplatte							

In der zweiten Phase fand eine Hebung des Meeresgrundes statt, besonders im Gebiete der Steinach und der Menzeln, in welchem Anzeichen einer Emersion festgestellt werden können. Es kam zur Ablagerung von roten Mergeln und Sandsteinen. Der darauf folgende Geröllschub stellt die eigentliche Hauptschüttungsphase der Oberen Grenznagelfluh dar (Mächtigkeit bis über 20 m). Es lassen sich zwei deutliche Schüttungszentren erkennen, eines im Gebiet der Bernegg mit SSW—NNE-, das andere an der Goldach mit SW—NE bis ENE-Schüttungsrichtung, d. h. je eines E und W der Schwellenzone von St. Georgen. Im Schüttungsschatten (toten Winkel) kam es nicht zur Ablagerung von Geröllen, und so finden wir im Gebiet von Goldbrunnen—Hagenbuch<sup>14)</sup> fossilführende Schiefermergel und Plattensandsteine anstehend. W der Schwellenzone besitzt die Nagelfluh fluviatilen Schüttungscharakter (Kegelwülste an der Basis, lokal rötliches Bindemittel, Fehlen jeglicher Verkeilungen mit dem Liegenden). Im E sich daran anschliessenden Raume können Verkeilungen mit den liegenden Plattensandsteinen beobachtet werden, und zudem führt die Nagelfluh in ihrem unteren Teil marine Fossilien (Steinbruch bei Hof Tablat an der Strasse St. Gallen—Rehetobel).

Mit der Schüttung der Oberen Grenznagelfluh zog sich das Meer endgültig aus dem Untersuchungsgebiet zurück, und schon die unmittelbar über der Nagelfluh liegenden gelb-grau-gefleckten Mergelserien besitzen den typischen tortonen fluvioterrestrischen Habitus und führen zudem an der Sitter eine tortone Schneckenfauna.

### Zusammenfassung der paläogeographischen Resultate

Im Untersuchungsgebiet lassen sich zwei Senkungsfelder erkennen, eine Haupt-senkungszone im Rheintal—Bodensee-Gebiet und ein sekundäres Senkungsfeld im Sitter—Urnäsch-Raum. Die Anlage der Rheintal—Bodensee-Senke besitzt vorburdigales, eventuell voraquitanes Alter, da sich in den aquitanen Schichten der Gäbriszone eine deutliche Mächtigkeitszunahme von W gegen E feststellen lässt. Betrachtet man das Längsprofil (Fig. 6) zur Zeit des Helvétien, so ergibt sich aus den Schichtmächtigkeiten folgendes Bild, von W nach E:

1. Rasches Absinken der Terrainoberfläche bis zum tiefsten Punkt der Senkungszone an der Sitter.
2. Langsamer Anstieg von der Sitter gegen die Schwellenzone von St. Georgen.
3. Starkes Absinken auf relativ kurzer Distanz (Klifflinie).
4. Schwach geneigter bis horizontaler Untergrund bis zum Rheintal.

Es ist zu vermuten, dass die Zonen mit starker Terrainneigung Bruchsystemen in der Tiefe entsprechen, deren Anlage mindestens vorburdigales Alter besitzen. Brüche vormiozänen Alters wurden ebenfalls im bayerischen Molasseraum durch seismische Untersuchungen und Bohrungen festgestellt (H. HEERMANN 1954). Das Bild, wie es sich uns in der Ablagerung der Oberen Meeresmolasse zeigt, spricht für eine gegen E absinkende antithetische Bruchschollentreppe in der Tiefe (siehe Fig. 1 und 6).

Entsprechend den beiden Senkungsfeldern finden wir die Mündungsgebiete seit dem untersten Burdigalien im Raume der Sitter—Urnäsch und an der Goldach.

<sup>14)</sup> Gefasste Quelle im Hagenbuchquartier.

Das Durchziehen der Geröllhorizonte innerhalb der marinen Ablagerungen über viele Kilometer lassen auf eine W—E gerichtete Strömung schliessen. Auch die Bildung der Seelaffen steht mit diesen in direktem Zusammenhang.




Fig. 6. Schematisches Längsprofil durch die Obere Meeresmolasse am E-Rand des Hörnli Schuttfächers.

Aus der Gegenüberstellung der einzelnen Schichtmächtigkeiten und deren Schwankung zwischen den Leithorizonten lässt sich die relative Senkung der einzelnen Zonen ermitteln. In Tabelle 14 wurde jeweils die geringste Mächtigkeit zwischen zwei Leithorizonten auf den Nenner 1 gebracht und die andern Werte entsprechend ins Verhältnis gesetzt.

Versuchen wir diese Zahlen auszuwerten bei Annahme, dass die Mächtigkeitsunterschiede mehr oder weniger proportional zur individuellen Senkung der einzelnen Zonen stehen, gelangen wir zu folgenden Schlüssen:

Das Senkungsfeld im Rheintal-Raum bestand bereits zur Zeit der Schüttung des burdigalen Basiskonglomerates und vertiefte sich noch wesentlich während der Ablagerung der untersten Plattensandsteine. Die Kippungsachse lag im

Gebiet E der Goldach. Später, in der Zeit der Sedimentation der Unteren Plattensandsteine, verschob sich dieselbe in Richtung gegen die Goldach, um an der Wende zu den mittleren Plattensandsteinen im Gebiet der Goldach selbst zu liegen. Gleichzeitig machte sich auch W der Goldach das sekundäre Senkungsfeld stärker geltend, das zur Anlage einer mehr als 5 km breiten Bucht Anlass gab. Beim Zuendegehen der Ablagerung der mittleren Plattensandsteine war die durch die Senkungen erfolgte Terraingliederung durch Auffüllung der Buchten mehr oder weniger nivelliert, woraus sich die relative Konstanz in der Mächtigkeit des Zwischenkomplexes ergab, wenn man von der geringeren Mächtigkeit im E absieht, die auf Erosion zur Zeit der Helvétien-Transgression zurückzuführen ist.

Tabelle 14

m = Mächtigkeit in Metern r = reduzierte Verhältnis- werte	Sitter-Urnäsch		St. Georgen		Goldach		Rheintal	
	m	r	m	r	m	r	m	r
Oberes Helvétien . . . . .	84	1.72	49	1.00	72	1.47	64	1.31
Unteres Helvétien . . . . .	46	1.15	40	1.00	93	2.32	130	3.25
Burdigaler Zwischen- komplex . . . . .	36	1.13	35	1.10	41	1.28	32	1.00
Mittlere Plattensandsteine .	92	1.54	94	1.57	60	1.00	134	2.24
Untere Plattensandsteine .	104	1.00	132	1.27	154	1.48	184	1.77
Unterste Plattensandsteine	30	1.00	36	1.20	46	1.53	199	6.63
Basiskonglomerat und Basissandstein . . . . .	40	1.82	22	1.00	34	1.55	47	2.14
Total Helvétien . . . . .	130	1.46	89	1.00	165	1.85	194	2.18
Total Burdigalien . . . . .	302	1.00	319	1.06	335	1.11	596	1.97
Total Obere Meeresmolasse	432	1.04	408	1.00	500	1.23	790	1.94

Im unteren Helvétien macht sich eine neue starke Senkungstendenz geltend, wobei die Kippungsachse eindeutig W der Goldach zu liegen kommt. Auch das sekundäre Senkungsfeld im Sitterquerschnitt tritt besonders im Oberen Helvétien wieder in Erscheinung.

Die kontinuierliche Verlagerung der Hauptkippungsachse von E nach W vom Unteren Burdigalien bis zum Oberen Helvétien lässt auf eine E-Neigung der Störungszone in der Tiefe schliessen. Betrachtet man die Gesamtwerte des Helvétien und des Burdigalien, so lässt sich deutlich erkennen, dass die Senkungsbeträge im Helvétien bedeutend grösser waren als im Burdigalien, obwohl einzelne Stufen des Burdigalien die höchsten Werte überhaupt zeigen.

### Zur Frage der Verkieselungserscheinungen

(siehe Fig. 1 und 5)

Das Vorkommen verkieselter Hölzer und Kohlenflöze mit kohlig-kieseligen Schichten beschränkt sich mit einer einzigen Ausnahme auf das unter dem Zwischenkomplex liegende Burdigalien. Anhäufungen verkieselter Baumstämme sind



ausschliesslich auf das Gebiet zwischen Sitter–Urnäsch und der Goldach beschränkt. Bei den Funden E der Goldach handelt es sich um kleine Einzelstücke, die aus den W-Gebieten eingeschwehmt wurden (siehe Fig. 1 und 5).

Die Verkieselungserscheinungen wurden von U. BÜCHI & F. HOFMANN (1945) auf thermale Zufuhr von Kieselsäure und Verkieselung der Bäume zu Lebzeiten zurückgeführt, wofür Vergleiche mit rezenten analogen Erscheinungen sprechen. Der Ort der Verkieselung kann aus der Schüttungsrichtung der einzelnen Delta-Arme (SW–NE-Richtung) ermittelt werden. Würde der Ort der Verkieselung weit von den heutigen Lagerstätten liegen, müsste auch in den W-Gebieten ein Auftreten verkieselter Hölzer beobachtet werden. Nun aber sind W der Urnäsch bis heute keinerlei Funde bekannt geworden. So muss der Austritt der Kieselsäure und der Standort der Laurazeenhaine nicht weit S der heutigen Fundlokalitäten gelegen haben.

Es lassen sich zwei Zonen festhalten, in welchen sich reiche Fundstellen verkieselter Hölzer und Kohlenflöze mit kieseligen Schichten befinden, eine westliche im Gebiet zwischen Schwellenzone von St. Georgen und Sitter–Urnäsch und eine östliche zwischen Schwellenzone und Goldach. Prinzipiell können für die Entstehung dieser zwei Zonen zwei Möglichkeiten ins Auge gefasst werden:

1. Aufstieg der kieselsäurehaltigen Lösungen längs einer Störungszone = Hauptkippsachse.

2. Aufstieg längs zwei Störungszone: a) längs der Hauptkippsachse; b) längs der Kippsachse des sekundären Senkungsfeldes an der Urnäsch–Sitter. Aus den Feldbeobachtungen heraus möchte ich der ersten Möglichkeit den Vorzug geben:

a) Im untersten Burdigalien finden sich die Verkieselungserscheinungen in Kohlenflözen und reiche Fundstellen verkieselter Hölzer an der Goldach.

b) Mit der Verschiebung der Kippsachse gegen W in den höheren Teilen des Burdigalien geht eine Verlagerung der Fundstellen verkieselter Hölzer parallel ebenfalls in W-Richtung.

c) Zudem lassen sich in der oberen Kohlenflözgruppe im Gebiet zwischen Riethüsli und St. Georgen zwei durch Mergel getrennte Kieselhorizonte feststellen, während an der Urnäsch nur noch ein Kieselhorizont auftritt.

Diese erwähnten Punkte lassen auf eine Austrittszone der kieselführenden Lösungen schliessen, die im Gebiet der Hauptstörungszone am Rand der Bodensee–Rheintal-Bucht erfolgte.

Versucht man nun diese Störungszone in den Rahmen der ostschweizerischen Geologie zu stellen, so ergeben sich folgende Korrelationen:

Die Kippsachsen und die Vorkommen der Verkieselungserscheinungen liegen auf einem etwa 10–15 km breiten Band, in welchem vom Aquitanien bis in die nachtortone Zeit immer wieder Phänomene auftreten, die mit Bewegungen des Untergrundes in Zusammenhang standen. Zu erwähnen sind hier folgende Beobachtungen:

1. Verkieselungserscheinungen: verkieselte Hölzer bei Weissbad im oberen Aquitanien, evtl. Burdigalien (siehe U. BÜCHI 1950), verkieselte Palmen bei Ramschwag an der Sitter im Tortonien (siehe F. HOFMANN 1951).



2. Vulkanische Auswürflinge an der Sitter und vulkanischer Tuff bei Bischofszell (U. BÜCHI & F. HOFMANN 1945 und F. HOFMANN 1951).

3. Bruchzone an der unteren Sitter und bei Bischofszell (F. HOFMANN 1951).

4. Telemagmatische Gänge W des Äschers im Säntisgebirge (U. BÜCHI und F. HOFMANN 1954).

5. Rasches W-Auskeilen (sedimentär und tektonisch) der Sommersbergzone bei Gais.

6. Starke Mächtigkeitzunahme der Gäbriszone E des Rotbaches gegen das Rheintal hin (Trogbildung).

7. Axialgefälle der nördlichen subalpinen Antiklinalzone gegen E bei Berneck (H. H. RENZ 1937/38).

8. Richtung und Lage des Sax-Schwendi-Bruches im Alpstein und staffelbruchartiges Absinken der Hohen Kasten-Kette gegen E.

Alle diese Phänomene, die auf eine relativ schmale Zone zu liegen kommen, deuten auf Bewegungen längs einer alten Störungslinie, die möglicherweise hercynisch schon angelegt war und sich im alpinen Paroxysmus reaktivierte, und zur Anlage einer Rheintal-Bodensee-Senke und später zur Bildung des sanktgallischen Rheintales führte.

Diese Betrachtungen mögen als Arbeitshypothese für spätere Forschungen gelten.

## Literaturverzeichnis

- ANDRÉE, K. (1911): *Die Diagenese der Sedimente, ihre Beziehungen zur Sedimentbildung und Sedimentpetrographie*. Geol. Rundschau 2, Heft 3, 61—130.
- (1916): *Wesen, Ursachen und Arten der Schichtung*. Geol. Rundschau 6, Heft 7/8, 351—397.
  - (1924): *Das Meer und seine geologische Tätigkeit*. In: SALOMON, W.: *Grundzüge der Geologie*. 1. Bd. (Stuttgart), S. 361—533.
- BAUMBERGER, E. (1925): *Versuch einer Umdeutung der Profile durch die subalpine Molasse der Zentral- und Ostschweiz*. Eclogae geol. Helv. 19.
- (1930): *Vorläufige Mitteilung über die Altersbestimmung der subalpinen Süßwassermolassen in der Ostschweiz*. Eclogae geol. Helv. 23.
  - (1930): *Profile durch die subalpine Molasse der Ostschweiz*. Publiziert anlässlich der Exkursion der S.N.G. im st. gallisch-appenzellischen Molasse-Land.
  - (1933): *Vorläufige Mitteilung über die Altersbestimmung der subalpinen Süßwassermolassen in der Ostschweiz*. Eclogae geol. Helv. 26, Nr. 2.
  - (1934): *Die Molasse des schweizerischen Mittellandes und Juragebirges*. Geol. Führer der Schweiz, Bd. 1 (Basel).
- V. BRAUN, E. (1953): *Geologische und sedimentpetrographische Untersuchungen im Hochrheingebiet zwischen Zurzach und Eglisau*. Eclogae geol. Helv. 46, Nr. 2.
- BÜCHI, U., & HOFMANN, F. (1945a): *Die obere marine Molasse zwischen Sitter-Urnäsch und dem Rheintal*. Eclogae geol. Helv. 38, Nr. 1.
- (1945b): *Über das Vorkommen kohlig-kieseliger Schichten und verkieselter Baumstämme in der oberen marinen Molasse von St. Gallen*. Eclogae geol. Helv. 38, Nr. 1.
  - (1945c): *Spuren vulkanischer Tätigkeit im Tortonien der Ostschweiz*. Eclogae geol. Helv. 38, Nr. 2.
- BÜCHI, U. P. (1950): *Zur Geologie und Paläogeographie der südlichen mittelländischen Molasse zwischen Toggenburg und Rheintal*. Inaug.-Diss. (Bücherfabrik Bodan, Kreuzlingen).
- BÜCHI, U., & WELTI, G. (1950): *Zur Entstehung der Degersheimer Kalknagelfluh im Tortonien der Ostschweiz*. Eclogae geol. Helv. 43, Nr. 1.
- BÜCHI, U. P., & WELTI, G. (1951): *Zur Geologie der südlichen mittelländischen Molasse zwischen Goldingertobel und Toggenburg*. Eclogae geol. Helv. 44, Nr. 1.
- BÜCHI, U. P., & HOFMANN, F. (1954): *Telemagmatische Gänge in der untern Kreide des Säntisgebirges*. Eclogae geol. Helv. 47, Nr. 2.
- DEICKE, J. C. (1851): *Lagerung und Mächtigkeit der Molasseschichten in St. Gallens Nähe*. Verh. Schweiz. Naturf. Ges. Glarus, S. 178.
- (1852): *Beiträge über die Molasse der Schweiz*. Neues Jb. Mineralogie usw.
  - (1854): *Das Molassegebilde in der östlichen Schweiz*. Verh. der st. gall.-appenzell. gemeinnützigen Ges. an der Hauptvers. in Berneck, S. 67—90.
  - (1859): *Geologische Skizze über die Kantone Appenzell, St. Gallen und Thurgau*. Öff. Vortrag (Scheitlin & Zollikofer, St. Gallen).
- ESCHER VON DER LINTH, A. (1812): *Notizen XIV und XIX*. Auszüge aus dem Tagebüchlein des Herrn Konrad Escher von der Linth. Deponiert im Geol. Institut der ETH. und Universität Zürich.
- *Tagebücher I, II, IIIb, IV*. Deponiert im Geol. Institut der ETH. und Universität Zürich.
  - (1847): *Bemerkungen über das Molassegebilde der östlichen Schweiz*. Mitt. Naturf. Ges. Zürich 1, Nr. 7.
- FAHRION, H., & STRAUB, E. W. (1953): In: LEMCKE, K., und Mitarbeiter: *Geologische und sedimentpetrographische Untersuchungen im Westteil der ungefalteten Molasse des süddeutschen Alpenvorlandes*. Beih. geol. Jb. 11 (Hannover).
- FANCK, A. (1929): *Die bruchlose Deformation von Fossilien durch tektonischen Druck und ihr Einfluss auf die Bestimmung der Arten*. Inaug.-Diss. Univ. Zürich.
- GUTZWILLER, A. (1870): *Über die Nagelfluh der Ostschweiz*. Jb. st. gall. naturf. Ges.
- (1871): *Über die Molasse der Kantone St. Gallen und Appenzell*. Verh. schweiz. naturf. Ges., S. 62—63.

- GUTZWILLER, A. (1875): *Über die bei St.Gallen und Rorschach ausgeführten Bohrversuche zur Herstellung artesischer Brunnen*. Jb. st.gall. naturf. Ges. 1873/74 (St. Gallen), S. 370—418.
- (1877): *Molasse und jüngere Ablagerungen, enthalten auf Blatt IX des eidg. Atlas*. Beitr. geol. Karte Schweiz, 14. Lfg., 1. Abteilung.
  - (1881): *Entwurf eines geologischen Profils durch die Nekaralpen*. Jb. st.gall. naturf. Ges. 1879/80, S. 290—304.
  - (1883): *Molasse und jüngere Ablagerungen, enthalten auf Blatt IV und V des eidg. Atlas mit Ausnahme des Gebietes nördlich vom Rhein und vom Bodensee*. Beitr. geol. Karte Schweiz, 19. Lfg., 1. Teil.
- GOERLICH, FR. (1953): *Ostrakoden der Cytherideinae aus der Tertiären Molasse Bayerns*. Senckenbergiana 34, Nr. 1—3, 117—148.
- HABICHT, K. (1943): *Zur Geologie der subalpinen Molasse zwischen Zugersee und Rheintal*. Eclogae geol. Helv. 36.
- (1945): *Geologische Untersuchungen im südlichen st.gallisch-appenzellischen Molassegebiet*. Beitr. geol. Karte Schweiz [N. F.], 83. Lfg.
- HAGN, H., & HÖLZL, O. (1952): *Geologisch-paläontologische Untersuchungen in der subalpinen Molasse des östlichen Oberbayerns zwischen Prien und Sur mit Berücksichtigung des im Süden anschliessenden Helvetikums*. Geol. Bavarica, Nr. 10 (München).
- HEERMANN, H. (1954): *Erdölgeologische Grundlagen der Aufschlussarbeiten im ostbayerischen Molassebecken*. Bull. Ver. Schweiz. Petrol.-Geol. u. -Ing. 21, Nr. 60.
- HOFMANN, F. (1950): *Zur Stratigraphie und Tektonik des st.gallisch-thurgauischen Miozäns (Obere Süsswassermolasse) und zur Bodenseegeologie*. Jb. st.gall. naturf. Ges. 74.
- HÖLZL, O. (1953): *Ein neues Profil durch das Unter- und Mittel-Miozän der oberbayerischen Molasse bei Peissenberg und deren Fauna*. Geol. Bavarica, Nr. 17, 181—215 (München).
- HÜRZELER, J. (1932): *Die Helvétien-Tortonien-Grenze im aargauischen Mittelland*. Eclogae geol. Helv. 25, 266—269.
- KNIPSCHER, H. C. G. (1952): *Die Gliederung der ungefalteten Molasse im östlichen Teil Bayerns auf Grund mikropaläontologischer Untersuchungen*. Geol. Bavarica Nr. 14, 48—68 (München).
- LEMCKE, K., v. ENGELHARDT, W., & FÜCHTBAUER, H. (1953): *Geologische und sedimentpetrographische Untersuchungen im Westteil der ungefalteten Molasse des süddeutschen Alpenvorlandes*. Beih. geol. Jb. (Hannover).
- LETSCH, E. (1899): *Die schweizerischen Molassekohlen östlich der Reuss*. Beitr. geol. Karte Schweiz, Geotechn. Serie, Lfg. 1.
- LUDWIG, A., & FALKNER, CH. (1903/04): *Beiträge zur Geologie der Umgebung St.Gallens*. 1. Teil: Jb. st.gall. naturf. Ges. 1901/02; 2. Teil: idem 1902/03.
- LUDWIG, A. (1917): *Über die Entstehung des Rheintales und des Bodensees (mit 3 Tafeln)*. Jb. st.gall. naturf. Ges. 54, 1914—1916.
- (1922): *Nachträge zur Kenntnis der st.gallisch-appenzellischen Molasse*. Jb. st.gall. naturf. Ges. 58, II. Teil.
  - (1925): *Zur Stratigraphie und Tektonik der Molasse zwischen Neckar und Rhein*. Eclogae geol. Helv. 19, Nr. 1.
  - (1926): *Aus dem ostschweizerischen Molassegebiet*. Jb. st.gall. naturf. Ges. 62.
  - (1930): *Profile durch die ostschweizerische Molasse*. Für die Exkursion der S.G.G. anlässlich der Hauptversammlung der S.N.G., 9.—11. September 1930.
  - (1930): *Erläuterung zu Atlasblatt 4 (Blätter Flawil–Herisau–Brunnadern–Schwellbrunn)*. Geol. Atlas Schweiz 1 : 25000.
  - (1930): *Geologisches über die Gegend von Herisau*. In: *Die Gemeinde Herisau, Ortsbeschreibung und Geschichte* (Buchdruckerei Schläpfer, Herisau).
- LUDWIG, A., EUGSTER, H., & BÄCHLER, E. (1931): *Bericht über die Exkursion der Schweiz. Geol. Ges. im st.gall.-appenzell. Molasseland, im Fähnern- und Wildkirchligebiet*. Eclogae geol. Helv. 24, Nr. 1.
- MAYER, K. (1872): *Systematisches Verzeichnis der Versteinerungen des Helvetian der Schweiz und Schwabens*. Beitr. geol. Karte Schweiz, Lfg. 11.
- RENZ, H. H. (1937): *Die subalpine Molasse zwischen Aare und Rhein*. Eclogae geol. Helv. 30.
- (1937/38): *Zur Geologie der östlichen st.gall.-appenzellischen Molasse*. Jb. st.gall. naturf. Ges. 69.

- RUTSCH, R. (1927): *Geologie des Belpberges*. Mitt. naturf. Ges. Bern.
- (1929): *Die Gastropoden des subalpinen Helvétien der Schweiz und des Vorarlberges*. Abh. Schweiz. paläont. Ges. 49 (Basel).
  - (1945): *Neue Auffassung über die Entstehung von Molassesedimenten*. Eclogae geol. Helv. 38, Nr. 2.
  - (1946): *Molasse und Quartär im Gebiete des Siegfriedblattes Rüeggisberg*. Beitr. geol. Karte Schweiz [N. F.] Lfg. 87.
- SAXER, F. (1936): *Das Molasseprofil an der Sitter*. Eclogae geol. Helv. 29.
- (1929/30): *Geologische Beobachtungen aus dem Gebiet von St. Gallen*. Jb. st. gall. naturf. Ges. 65.
  - (1942): *Quartäre Krustenbewegungen in der Gegend von St. Gallen*. Eclogae geol. Helv. 35.
  - (1948): *Alter und Dauer der Molassezeit*. Ber. st. gall. naturf. Ges. 72.
- SAXER, F., EUGSTER, H., HÜBSCHER, J., & SCHLATTER, L. (1943): *Bericht über die Exkursionen der Schweiz. Geol. Gesellschaft in der Nord- und Nordostschweiz*. Eclogae geol. Helv. 36.
- SPECK, J. (1949): *Blualgenknollen im subalpinen Aquitanien am Zugersee*. Eclogae geol. Helv. 42, Nr. 1.
- STAUB, R. (1934): *Grundzüge und Probleme alpiner Morphologie*. Denkschr. schweiz. naturf. Ges. 69, Abh. 1.
- STEHLIN, H. G. (1903): *Über die Grenze zwischen Oligozän und Miozän in der Schweizer Molasse*. Eclogae geol. Helv. 7, Nr. 4.
- (1914): *Übersicht über die Säugetiere der schweiz. Molasseformation, ihre Fundorte und ihre stratigraphische Verbreitung*. Verh. naturf. Ges. Basel 25.
- TANNER, H. (1944): *Beitrag zur Geologie der Molasse zwischen Ricken und Hörnli*. Mitt. Thurg. naturf. Ges. 33.
- WAHRENBERGER, J. (1928): *Beiträge zur Heimatkunde von Rorschach. Materialien zum Heimatkund-Unterricht im Kt. St. Gallen*. 16. Jb. Kt. Lehrerverein St. Gallen.
- WELTI, G. (1950): *Zur Geologie, Stratigraphie und Paläogeographie der südlichen mittelländischen Molasse am oberen Zürichsee*. Diss. Manuskript.
- WENZ, W. (1923—30): *Gastropoda extramarina*. Bd. I—XI. Fossilium Catalogus.
- ZÖBELEIN, H. K. (1952): *Die Bunte Molasse bei Rottenbuch (Obb.) und ihre Stellung in der Subalpinen Molasse*. Geol. Bavarica, Nr. 12 (München).
- (1953): *Zur Altersdeutung der Cyrenenschichten in der Subalpinen Molasse des westlichen Oberbayerns*. Geol. Bavarica, Nr. 17, 113—134 (München).

## KARTEN

- GUTZWILLER, A. (1875): *Geologische Karte der Schweiz 1:100 000, Blatt IX*.
- (1879): *Geologische Karte der Schweiz 1:100 000, Blatt IV*.
- FALKNER, CH., & LUDWIG, A. (1903/04): *Geologische Karte von St. Gallen und Umgebung*.
- LUDWIG, A. (1930): *Geologischer Atlas der Schweiz 1:25 000, Blatt 4*.
- SAXER, F. (1949): *Geologischer Atlas der Schweiz 1:25 000, Blatt 23*.

