

**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique  
**Herausgeber:** Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique  
**Band:** 8 (1906)  
**Heft:** 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

**Artikel:** DÉMONSTRATION DE LA FORMULE DE CORIOLIS  
**Autor:** Bertrand, Emile  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-9272>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 02.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

$h$  et  $k$  étant deux constantes fixes pour tous les points de la droite, tandis que  $\rho, \rho', \dots$  peuvent varier d'un point à l'autre. On prouve alors facilement que l'on a

$$AB = \frac{\rho\rho'}{hk.OO'} (a_1b_2 - a_2b_1) = \frac{\rho\rho'}{hk.OO'} (ab) .$$

En substituant dans l'*identité de Pappus* qui contient chaque lettre A, B, C, D une fois dans chaque terme, on fait disparaître le facteur commun  $\rho\rho'\rho''\rho'''$  et l'on a l'identité fondamentale de la théorie des formes binaires,

$$(da)(bc) + (db)(ca) + (dc)(ab) = 0 .$$

Mais toutes les identités du type (11) ont chaque lettre le même nombre de fois dans chaque terme et fournissent donc des identités analogues entre déterminants à deux lignes.

Ainsi toute identité entre points en ligne droite qui se transporte sur le cercle par vecteurs réciproques donne aussi une identité entre déterminants à deux lignes.

M. STUYVAERT (Gand).

## DÉMONSTRATION DE LA FORMULE DE CORIOLIS

1.  $\bar{v}_a, \bar{v}_r$  et  $\bar{v}_e$  représentant les vitesses absolue, relative et d'entraînement d'un point mobile, on a

$$\bar{v}_a = \bar{v}_e + \bar{v}_r ,$$

et, le signe D indiquant la dérivée géométrique prise dans l'observatoire absolu :

$$D\bar{v}_a = D\bar{v}_e + D\bar{v}_r .$$

Il reste à chercher les significations des trois termes compris dans cette égalité.

2.  $D\bar{v}_a$  est l'accélération absolue  $\bar{j}_a$  du mobile.



l'instant  $t + \Delta t$ , auquel les deux observateurs mènent des vecteurs  $\overline{O_1 I_1}$  et  $\overline{O' I'}$  équipollents à la nouvelle vitesse relative. Par définition




Fig. 2.

$$D\overline{v}_r = \lim \frac{\overline{H_1 I_1}}{\Delta t} \quad \overline{j}_r = \lim \frac{\overline{H' I'}}{\Delta t}$$

Menons  $\overline{O'K} = \overline{O_1 H_1}$ ; il vient

$$\frac{\overline{H_1 I_1}}{\Delta t} = \frac{\overline{KI'}}{\Delta t} = \frac{\overline{KH'}}{\Delta t} + \frac{\overline{H' I'}}{\Delta t}.$$

Passons à la limite en remarquant que  $\lim \frac{\overline{KH'}}{\Delta t}$  n'est autre que la vitesse du point  $V_r$  dans le mouvement de rotation de l'observatoire relatif autour de  $O$ , c'est-à-dire  $\text{Mom}_{V_r} \overline{\omega}$ ; nous aurons

$$D\overline{v}_r = \text{Mom}_{V_r} \overline{\omega} + \overline{j}_r.$$

5. Par conséquent

$$\overline{j}_a = \overline{j}_e + \overline{j}_r + 2 \text{Mom}_{V_r} \overline{\omega}.$$

Mars 1906.

Emile BERTRAND (Bruxelles).