

**Zeitschrift:** Hebamme.ch = Sage-femme.ch = Levatrice.ch = Spendrera.ch  
**Herausgeber:** Schweizerischer Hebammenverband  
**Band:** 110 (2012)  
**Heft:** 10

**Artikel:** Sterben am Lebensanfang  
**Autor:** Fleming, Valerie  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-949399>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 17.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Bedeutung

In der Schweiz existieren zwischen den neun Perinatalzentren erhebliche Unterschiede in den Überlebensraten extrem Frühgeborener.<sup>[1,2]</sup> Es ist wichtig, die Gründe für diese Unterschiede besser zu verstehen, um daraus Massnahmen zur Qualitätsverbesserung ableiten zu können. Entscheidungen über den Einsatz lebenserhaltender Massnahmen bei extrem Frühgeborenen müssen primär anerkannte ethische Grundprinzipien be-

rücksichtigen und bezüglich prognostischer Überlegungen möglichst evidenzbasiert sein. Der Ort der Betreuung sollte bei diesen Entscheidungen eine untergeordnete Rolle spielen.

## Referenzen

- [1] Fischer N., Steurer MA., Adams M., Berger TM. Swiss Neonatal Network. Survival rates of extremely preterm infants (gestational age <26 weeks) in Switzerland: impact of the Swiss guidelines for the care of infants born at the limit of viability. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2009 Nov; 94(6): F407–13. Epub 2009 Apr 8.
- [2] Berger TM., Steurer MA., Woerner A., Meyer-Schiffer P, Adams M. for the Swiss Neonatal Network. Trends and centre-to-centre variability in survival rates of very preterm infants (< 32 weeks) over a 10-year-period in Switzerland. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2012 Jan 12. (Epub ahead of print).
- [3] Berger TM. Decisions in the gray zone: evidence-based or culture-based? J Pediatr 2010; 156: 7–9.

## Sterben am Lebensanfang

Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Fehlgeburt und perinataler Kindstod, Bern



**Prof. Dr. Valerie Fleming** RM, PhD, Consultant, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), emeritierte Professorin der Glasgow Caledonian University, Grossbritannien. Registered Nurse (Scotland, 1977), Registered Midwife (Scotland, 1979). Hebammenarbeit in Schottland, Indien, Neuseeland. Beraterin für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit 1997. Professortitel 2001, Glasgow Caledonian University. Seit 2002 Leitung von Entwicklungs- und Forschungsprojekten im Kosovo, in Palästina und in Malawi. Leiterin der EU MSc Midwifery 2007–2010, Regional Adviser for Nursing and Midwifery WHO Europa 2011–2012.  
E-Mail: flem@zhaw.ch  
www.gesundheit.zhaw.ch

## Ausgangslage

Werdende Eltern, welche die Diagnose erhalten, dass ihr ungeborenes Kind nicht lebensfähig ist, stehen einer enormen Herausforderung gegenüber. Nach der Diagnose, werden Eltern in der Regel mit der Entscheidung konfrontiert, die Schwangerschaft vorzeitig zu beenden oder das Kind auszutragen, bis es spontan während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verstirbt. Diese Entscheidung wird unter den Begriffen des «chosen loss<sup>[1]</sup>» bzw. des «lost choice<sup>[2]</sup>» diskutiert, welche die Unaus-

weichlichkeit des Verlusts eines gewünschten Kindes verdeutlichen. Nach einem solchen Schwangerschaftsabbruch treten oft Trauerreaktionen, aber auch psychische und psychiatrische Erkrankungen auf<sup>[3,4]</sup>.

In der Schweiz wird ein Mangel an Optionen für die betroffenen Familien sowie an orientierenden Grundlagen für die Information, Beratung und Betreuung festgestellt. Dies wirft die Frage auf, welche Versorgungsangebote derzeit in der Schweiz gegeben sind, wie diese von den betroffenen Familien erfahren werden und welche Anpassungen erforderlich sind, um eine bedürfnisorientierte und interdisziplinäre Versorgung leisten zu können. Studien haben nämlich gezeigt, dass eine bedürfnisorientierte Versorgung der Eltern zu deren Entlastung beiträgt und sie darin unterstützt, den Sterbeprozess des Kindes zu begleiten<sup>[5]</sup>.

## Ziel und Methoden

Das Projekt erstellt eine Bestandesaufnahme der Versorgungsangebote in der Schweiz und klärt ab, wie die vorhandenen Angebote hin zu einer bedürfnisorientierten Versorgung weiterentwickelt werden können.

Das Projekt zielt darauf ab, den Umgang mit dem Sterben des Kindes aus der Perspektive der Eltern und Fachpersonen zu untersuchen. Zu diesem Zweck werden qualitative Interviews mit mindestens 30 Eltern sowie 30 Fachleute durchgeführt. Daten werden thematisiert und mittels Inhaltsanalyse kategorisiert.

## Bedeutung

Die Ergebnisse des Projekts tragen dazu bei, die bestehende Praxis vor dem Hintergrund der Erfahrungen betroffener Eltern und Fachpersonen zu reflektieren. Auf dieser Grundlage können Empfehlungen abgeleitet werden, wie das Handeln und die Zusammenarbeit des Gesundheitspersonals zu verbessern ist. Insgesamt soll ein Beitrag zur Prävention schwerwiegender gesundheitlicher Spätfolgen bei den betroffenen Familien geleistet werden.

**Links:** [www.nfp67.ch](http://www.nfp67.ch)

Fachstelle Fehlgeburt und perinataler Kindstod: [www.fpk.ch](http://www.fpk.ch)

## Referenzen

- [1] Sandelowski M., Barroso J. The travesty of choosing after positive prenatal diagnosis. JOGNN: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing. 2005; 34(3): 307–18.
- [2] Wool C. Systematic review of the literature: parental outcomes after diagnosis of fetal anomaly. Advances in Neonatal Care. 2011; 11(3): 182–92.
- [3] Korenromp MJ., Christiaens GCML., van den Bout J., Mulder EIJH., Hunfeld JAM., Bilardo CM., et al. Long-term psychological consequences of pregnancy termination for fetal abnormality: a cross-sectional study. Prenatal Diagnosis. 2005; 25(3): 253–60.
- [4] Kersting A., Kroker K., Steinhard J. Psychiatric morbidity after termination of pregnancy for fetal anomaly. American Journal of Obstetrics & Gynecology. 2010; 202(4): e6; author reply e-7.
- [5] Cignacco E. Between professional duty and ethical confusion: midwives and selective termination of pregnancy. Nursing Ethics. 2002; 9(2): 179–91.