

Zeitschrift: Intercura : eine Publikation des Geriatriischen Dienstes, des Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik der Stadt Zürich

Herausgeber: Geriatriischer Dienst, Stadtärztlicher Dienst und Psychiatrisch-Psychologische Poliklinik der Stadt Zürich

Band: - (1999-2000)

Heft: 67

Rubrik: Altersmythos XLIII : Halluzinationen und Wahnvorstellungen sind bei Personen mit M. Parkinson die Folge der zur Behandlung der motorischen Störungen eingesetzten Medikamente

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 13.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Altersmythos XLIII

Halluzinationen und Wahnvorstellungen sind bei Personen mit M. Parkinson die Folge der zur Behandlung der motorischen Störungen eingesetzten Medikamente

Wirklichkeit:

Zwar können hochdosierte Anti-Parkinsonmedikamente bei sonst gesunden Parkinsonpatienten Halluzinationen und Wahnvorstellungen verursachen. Meist treten diese jedoch bei Patienten auf, die zusätzlich eine Demenz entwickelt haben.

Begründung:

Bei einer Untersuchung von 96% der in neun norwegischen Gemeinden lebenden, medikamentös behandelten Parkinsonpatienten ergaben sich bei

138 Personen keine Denkstörungen

60 Personen (26%) zeigten lebhaftere Träume

23 Personen (10%) zeigten Halluzinationen mit erhaltener Einsicht

14 Personen (16%) zeigten Halluzinationen mit Wahnvorstellungen

Personen mit Halluzinationen oder Wahnvorstellungen

- waren älter (0.003; 77 ± 7 vs 73 ± 7 Jahre),
- waren öfter dement (0.001; 70 ± 7 vs $73\% \pm 20\%$ Jahre),
- aber mit gleich hohen L-Dopadosen behandelt ($p = 0.6$, 510 vs 460 mg/d).

D. Aarstand et al, Arch Neurol 56, 595-601, 1999
Prevalence and clinical correlates of psychiatric symptoms in Parkinson disease. A community based study.