

Zeitschrift: Intercura : eine Publikation des Geriatriischen Dienstes, des Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik der Stadt Zürich

Herausgeber: Geriatriischer Dienst, Stadtärztlicher Dienst und Psychiatrisch-Psychologische Poliklinik der Stadt Zürich

Band: - (2003-2004)

Heft: 83

Rubrik: Altersmythos CXLIX : leichte kognitive Beeinträchtigungen ohne Demenz sind ohne wesentliche Relevanz für die betroffenen Betagten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 29.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ALTERSMYTHOS CXLIX

Leichte kognitive Beeinträchtigungen ohne Demenz sind ohne wesentliche Relevanz für die betroffenen Betagten.

Wirklichkeit

Betagte mit leichter kognitiver Beeinträchtigung ohne Demenz haben höhere 5-Jahres-Mortalität (49% vs. 30% bei intakter Kognition), höhere Heimplatzierungsrate (29% vs. 14%) und höhere Rate, dement zu werden (47% vs. 15%).

Begründung

Die 5-Jahres-Nachuntersuchung von 883 (79±7 J.) Betagten mit intakter Kognition (ik) und 801 (81±7 J) Betagten mit leicht beeinträchtigter Kognition (lbk) ohne Demenz im Rahmen der kanadischen Alters- und Gesundheitsstudie ergab:

	ik	lbk	Odd-ratio für lbk
Tod	30%	49%	2.3 (1.9-2.8)
Heimplatzierung	14%	29%	2.5 (1.9-3.3)
Demenzdiagnose	48%	43%	5.3 (3.8-7.4)

Folgende Faktoren sind mit einem erhöhten Demenzrisiko innert 5 Jahren assoziiert (Resultat der logistischen Regressionsanalyse von 424 Betagten mit ik 238 mit lbk

Odd-ratio für Demenz

Klinisch beobachtete Gedächtnisstörung	3.2 (2.1-5.0)
Klinisch beobachtete Hirnleistungsschwäche	1.4 (0.9-2.1)=n.s.
Angehörige beobachteten Gedächtnisstörung	2.1 (1.3-3.2)
Angehörige beobachtete Hirnleistungsschwäche	1.6 (1.0-2.5)=n.s.
Berichtige Defizite im Alltag (pro Bereich)	1.2 (1.05-1.5)

- ± Standardabweichung
- n.s. nicht signifikant
- () 95% Zuverlässigkeitsintervall

H. Tuokko et al: Five-Year Follow-up of Cognitive Impairment with No Dementia. Arch Neurol 2003; 60: 577-582