

**Zeitschrift:** Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène

**Herausgeber:** Bundesamt für Gesundheit

**Band:** 42 (1951)

**Heft:** 4

**Artikel:** Über die Bestimmung von Pektinstoffen und Alginaten in Mischung

**Autor:** Pilnik, W. / Rothschild, G.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-982465>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 15.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Über die Bestimmung von Pektinstoffen und Alginaten in Mischung

Von *W. Pilnik* und *G. Rothschild*

(Aus dem Central Citrus Products Research Laboratory, Rehovot, Israel)

In seiner Arbeit über «Prüfung von Lebensmitteln auf Verdickungsmittel»<sup>1)</sup> stellt *Wyler* mit Recht fest, dass Alginat von Pektinstoffen nur schwer zu unterscheiden und zu trennen sind. Tatsächlich verhalten sich Alginsäure (Polymannuronsäure) und Pektinsäure (Polygalakturonsäure) weitgehend ähnlich. Pektin (partiell mit Methylalkohol veresterte Polygalakturonsäure) ist in seiner Reaktionsfähigkeit vom Veresterungsgrad abhängig. Ein sehr niedrig verestertes Pektin vermag auch weitgehend mit den gleichen Kationen wie ein Alginat auszufallen. Die im hiesigen Laboratorium angewandte Bestimmungsmethode beruht auf der Möglichkeit, in einer Lösung von Pektinstoffen und Alginaten Pektin spezifisch enzymatisch abzubauen und derart abzutrennen. Die Ausgangssubstanz wird in Wasser gelöst. Ein aliquoter Teil wird mit dem doppelten Volumen Alkohol oder Aceton gefällt. Der Niederschlag wird filtriert und dekarboxyliert<sup>2)</sup>. Der erhaltene Wert an Uronsäure entspricht dem Pektin- plus Alginsäuregehalt der Lösung. Ein zweiter aliquoter Teil der Lösung wird mit einem Pektinase-Extrakt versetzt und nach einigen Stunden Einwirkungszeit wie beschrieben gefällt. Pektin ist nun zu niedermolekularen Bruchstücken abgebaut und fällt nicht mehr aus. Der Niederschlag enthält nur Alginat. Er wird dekarboxyliert; der gefundene Wert an Uronsäure entspricht dem Gehalt an Alginsäure. Schliesslich kann in einem dritten aliquoten Teil der Lösung der Veresterungsgrad titrimetrisch<sup>3)</sup> oder durch Methanolbestimmung, z. B. nach *von Fellenberg*<sup>4)</sup>, ermittelt werden. Das pH der Untersuchungslösung soll zwischen 4 und 5 liegen. Dadurch ist gewährleistet, dass die Polyuronsäuren stabil in Lösung bleiben und andererseits die Pektase noch wirken kann. Eventuell müssen beim Herstellen der Lösung störende Kationen mit HCl ausgewaschen oder in der Lösung komplex gebunden werden (z. B. Zusatz von Polyphosphat bei Calciumgehalt). Pektinase wird als wässriger Extrakt eines der im Handel zur Fruchtsaftklärung erhältlichen Präparate angewendet. Es muss viskosimetrisch geprüft werden, ob das Enzympräparat Alginat nicht angreift. In Mischung mit Pektin kann mit zu verschiedenen Zeiten durchgeführten Fällungen die notwendige Minimaleinwirkungszeit bestimmt werden. Die Niederschläge lassen sich leicht mit einem feinen Tuch abfiltrieren und nach dem Auspressen auch quantitativ ablösen.

Apparaturen zur Dekarboxylierung sind häufig beschrieben worden<sup>2)</sup>. In unserer Apparatur dient Luft als Trägergas. Diese wird mit einer Wasserstrahlpumpe durch die Apparatur gesogen und durch Passieren einer Waschflasche mit KOH 1 : 1 vom Eigengehalt an CO<sub>2</sub> befreit. Als Adsorptionsgefäss dient

eine schräg gelagerte Bürette, und als Adsorptionsmittel wird n/4 NaOH verwendet. Der Bürette ist ein Titriergesäß vorgeschaltet (Saugflasche), in welches nach beendeter Reaktion die Natronlauge hineinfließen kann. Dadurch ist eine halbkontinuierliche Arbeitsweise gewährleistet, da nach jeder Bestimmung jeweils nur Dekarboxylierkolben und Titriergesäß abmontiert und gewaschen werden müssen. Es wird während 2 Stunden mit 19 %iger Salzsäure dekarboxyliert.

Die Menge des zu dekarboxylierenden Musters hängt von der Empfindlichkeit der Analysenmethode ab. Unter hiesigen Verhältnissen bewährt sich zur Dekarboxylierung eine Einwaage von 400 mg Polyuronsäure, so dass etwa 100 mg CO<sub>2</sub> entwickelt werden. Der Analysenfehler beträgt 2,0 %. Als Ausführungsbeispiel wird nachfolgend eine Kontrollbestimmung eines bekannten Pektin-Alginat-Gemisches angegeben. Alle Werte sind Durchschnitte von Doppelbestimmungen mit einer Genauigkeit von 1 %. Als Pektinpräparat wurde ein amerikanisches Citruspektin von 200 Geliereinheiten, als Alginat das Präparat «Manucol» der englischen Firma Albright & Wilson verwendet. Sie wurden zuerst einzeln bestimmt.

*Pektin:* 1,4466 g wurden in 250 cm<sup>3</sup> Wasser gelöst. Davon wurden 100 cm<sup>3</sup> mit der doppelten Menge Alkohol gefällt, mit einem Tuch abfiltriert, abgepresst und dekarboxyliert. Weitere 100 cm<sup>3</sup> wurden in Wasser aufgenommen, und nach Neutralisation wurde der Veresterungsgrad titrimetrisch bestimmt. Als Indikator wurde das Gemisch von *Hinton*<sup>5)</sup> verwendet.

$$\begin{aligned} \text{Dekarboxylierung: } & 0,0960 \text{ g CO}_2 = 0,3840 \text{ g Pektinsäure} \\ \text{Verseifung: } & 14,75 \text{ cm}^3 \text{ n/10 NaOH} = y \\ \text{mg Pektin} & = \text{mg Pektinsäure} + y \cdot 14,0 \cdot 10^{-1} = 404,6 \text{ mg} \\ \% \text{ OHC}_3 & = \frac{y \cdot 31,0 \cdot 10^{-1}}{\text{mg Pektin}} \cdot 100 = 11,29 \% \\ & \quad (14,0 = \text{Äquiv.-Gew. CH}_2, \\ & \quad \quad 31,0 = \text{Äquiv.-Gew. OCH}_3) \end{aligned}$$

Das Pektinpräparat enthält also 66,3 % Pektinsäure oder 69,8 % Pektin mit 11,29 OCH<sub>3</sub>.

*Alginat:* 1,3382 g wurden, wie beim Pektin beschrieben, behandelt und ergaben an 100 cm<sup>3</sup> Lösung nach

$$\begin{aligned} \text{Dekarboxylierung: } & 0,0819 \text{ g CO}_2 = 0,3278 \text{ g Alginsäure.} \\ \text{Das Alginatpräparat enthält also } & 61,25 \% \text{ Alginsäure.} \end{aligned}$$

*Pektinase-Extrakt:* 20 g Pektinol A der Firma Rohm & Haas, USA, wurden bei 25° C während 2 Stunden mit 100 cm<sup>3</sup> Wasser geschüttelt und filtiert. 100 cm<sup>3</sup> 0,5 %iger Alginatlösung wurden mit 10 cm<sup>3</sup> des Extraktes gemischt, das pH auf 4,5 eingestellt (Johnson Indikatorpapier) und über Nacht stehen gelassen.

Die Viskosität, ausgedrückt in der Auslaufzeit aus einer Ostwaldpipette in Sekunden bei 25° C (Wasserwert 48 sek.), betrug:

direkt nach Mischen	296 sek.
nach 12 Stunden	283 sek.

Alginat wird vom Enzym nicht angegriffen.

Eine gleiche Mischung wurde mit einer 0,5 %igen Pektinlösung hergestellt. Hierbei wurde zusätzlich auf Alkoholfällbarkeit geprüft:

direkt nach Mischen	70 sek.	— Alkoholfällung positiv
nach 12 Stunden	52 sek.	— Alkoholfällung negativ

12 Stunden Einwirkungszeit genügen also für ähnliche Konzentrationen, um Pektin in erwünschter Weise abzubauen.

Das *Testgemisch* der beiden Präparate wurde in 500 cm<sup>3</sup> Wasser gelöst und mit einigen Tropfen 1-n. HCl auf pH 4,5 eingestellt (Johnson Indikatorpapier). Zweimal 100 cm<sup>3</sup> wurden zur Dekarboxylierung und zur Bestimmung des Veresterungsgrades mit der doppelten Menge Alkohol gefällt. 200 cm<sup>3</sup> wurden mit 20 cm<sup>3</sup> Enzymextrakt über Nacht stehen gelassen und dann wie beschrieben gefällt und dekarboxyliert. Die nachstehende Tabelle zeigt die Brauchbarkeit der Methode an Hand der erhaltenen Resultate:

Einwaage 2,4767 g Pektin + 2,5713 g Alginat	= 5,0480 g Gemisch
Berechnet aus Einzelanalysen 1,6430 g Pektinsäure + 1,5745 g Alginsäure	= 3,2175 g Uronsäuren
Dekarboxylierung des Gemisches	= 3,1800 g Uronsäuren
Dekarboxylierung des Gemisches nach Enzymeinwirkung	= 1,5648 g Alginsäure
Pektinsäure als Differenz	= 1,6152 g

Zur Verseifung von Pektin, aus 100 cm<sup>3</sup> Lösung gefällt, wurde verbraucht:

$$12,7 \text{ cm}^3 \text{ n/10 NaOH} = y$$

$$\text{Für } 500 \text{ cm}^3 \text{ (Gesamtmenge)} : y = 63,5 \text{ cm}^3 \text{ n/10 NaOH}$$

$$\text{mg Pektin} = \text{mg Pektinsäure} + y \cdot 14,0 \cdot 10^{-1} = 1704,1 \text{ mg}$$

$$\% \text{ OCH}_3 = \frac{y \cdot 31,0 \cdot 10^{-1}}{\text{mg Pektin}} \cdot 100 = 11,55 \% \text{ (Einzelbestimmung } 11,29 \% \text{)}$$

Diese Methode eignet sich auch für rein qualitative Teste, z. B. um festzustellen, ob ein vorliegendes Präparat Pektinstoffe oder Alginat enthält. Reine Pektinase baut spezifisch nur Pektin ab, die Viskosität einer Alginatlösung würde sich daher nicht verändern. Andererseits würde eine Viskositätsabnahme sofort auf Pektin schliessen lassen. Eine Fällung mit Alkohol trotz starker Vis-



kositätsabnahme weist auf eine weitere Komponente in der Mischung hin. Inwieweit es sich dabei um Alginat handelt, kann nur die oben beschriebene quantitative Uronsäurebestimmung zeigen.

### *Zusammenfassung*

Es wurde eine Methode beschrieben, welche erlaubt, Pektinstoffe und Alginat nebeneinander zu bestimmen. Die Methode beruht darauf, dass in einer Lösung des Gemisches Pektin oder Pektate spezifisch durch kommerzielle Pektinase-Präparate abgebaut werden können. Dadurch kann mit organischen Lösungsmitteln sowohl Pektin und Alginat zusammen, als auch Alginat allein aus der Lösung ausgefällt werden. Die Komponenten werden durch Dekarboxylierung bestimmt.

### *Résumé*

On décrit une méthode qui permet le dosage des matières pectiques et des alginates dans des mélanges de ces corps. Cette méthode repose sur la dégradation spécifique de la pectine par des préparations commerciales de pectinase. Dans une solution qui contient des pectines et des alginates, ces derniers peuvent être précipités avec les pectines ou bien seuls. Les constituants du mélange peuvent être alors dosés séparément par décarboxylation.

### *Summary*

A method is described which permits to determine pectic substances and alginates in mixture. It is based on the fact that pectin can be specifically degraded by commercial pectinase preparations. In a solution of both alginate can thus be precipitated together with pectin or alone. The single constituents can then be determined by decarboxylation.

### *Literatur*

- 1) O. Wyler, diese Mitt. **41**, 46 (1950).
- 2) E. Anderson und L. Sands, *Advances in Carbohydrate Chem.* **1**, 329 (1945).
- 3) H. Deuel, diese Mitt. **34**, 41 (1943).
- 4) Th. von Fellenberg, *Biochem. Z.* **85**, 45 (1918).
- 5) C. L. Hinton, *Fruit Pectins*, London (1939).