

Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 132 (1990)

Heft: 2

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)


Download PDF: 16.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Klinische Euterentzündungen während der Laktation

**RASCH HANDELN !
ENTSCHEIDEND HANDELN !**

- Eine wirksame Therapie **erster Wahl**, um die symptomatische und bakteriologische Heilung ohne Risiko zur Chronizität zu sichern.
- Eine Cloxacillin-Colistin-Kombination, um auf **alle** für Mastitiden verantwortlichen Erreger einzuwirken, einschliesslich der penicillinresistenten Staphylokokken und E-Coli.
- Eine rasche und vollständige Diffusion der Wirkstoffe im Euter für eine Tiefenbehandlung.



Cloxa-Coli-Mastitisinjektor für Kühe
Suspension

4 x 10 ml

Cloxa-Coli-Injecteur pour vaches
(mastite) Suspension

4 x 10 ml

cloxa-coli



Abgabe nur durch
den Tierarzt
Delivré par
le vétérinaire

Hersteller /
Fabricant :
VIRBAC
06516 Carros, FRANCE

Vertrieb für die Schweiz/
Distributeur pour la Suisse:
Virbac AG
8702 Zollikon

Zusammensetzung
Cloxacilium (natrium monohydratum) 458 mg
Colistinum sulfonium 1 Mio I.E.
Conserve: Antiox. E.320. Alcohol benzylicus
Excep. ad suspens. oleos. pro vase 10 ml

Art der Anwendung
Die erkrankten Eutererzel von der Behandlung grund-
lich ausmischen, die Striche säubern und desinfizieren.
Den Inhalt eines Injektors pro erkranktes Eutererzel
durch zwei Strichkanäle ins Eutererzel einbringen.
Wartezeiten (Müch)
Während der Behandlung und 5 Tage darüber hinaus
(Schweiz: Milchregulat)
Nicht über 15 °C lagern. Gebrauchsschuttem
Ch.-B. virbac bis

Composition
Cloxaciline (sel sodium monohydrate) 458 mg
Sulfate de colistine 1 million I.E.
Conserv. Antiox. E.320. alcool benzyle
Excep. ad suspens. oleos. q.s. ad 10 ml

Mode d'emploi
Après avoir soigneusement vidé le quartier malade, nettoyer
et désinfecter le trayon. Introduire le contenu d'un injec-
teur dans le canal du trayon de chaque quartier à traiter.
Temps d'attente (lait)
Pendant le traitement et 5 jours après (selon le règle-
ment Suisse des résidus de lait).
Ne pas entreposer au-dessus de 15 °C. Apiter avant
emploi.
R.S. Nr. 42 270316 - OCM Nr. 42 270316

virbac

virbac

Mammities cliniques pendant la lactation

**FRAPPEZ VITE !
FRAPPEZ FORT !**

- Un traitement efficace de **1er choix** pour assurer une guérison symptomatique et bactériologique sans passage à la chronicité.
- Une association cloxacilline-colistine pour agir sur **tous** les germes responsables de mammities, même sur les staphylocoques résistants à la pénicilline et sur E-Coli.
- Une diffusion rapide et complète des principes actifs dans la mamelle pour un traitement en profondeur.

VIRBAC A.G., OBERWACHTSTRASSE 2, 8700 KÜSNACHT

virbac

GENTASEPTIN®

ermöglicht dank seiner
spezifischen pharmazeutischen Formulierungen
eine hochwirksame

Mastitis-Retardtherapie

gegen das **gesamte Erregerspektrum** bei
sehr hoher Heilungsrate:

subklinische Mastitiden	92%
klinische Mastitiden	87%
bei S. aureus/Streptokokken sp.	91%
andere Str. (Str. uberis und dysgal.)	87%
Gramnegative (E. coli/Ps. aerug.)	95%
[E. Kleinschroth und J. Deneke 1987]	

OP: GENTASEPTIN Eutersuspension
Injektor à 10 ml
Flasche à 80 ml

Therapie resistenter Endometritiden:

bei A. pyogenes-Endometritis nach **einmaliger**
intrauteriner Applikation im klinischen Test
vollständige Heilung mit **normaler Fertilität**

OP: GENTASEPTIN Metritisinjektor à 150 ml



Chassot

☎ 031 - 53 39 11

Wir informieren Sie gerne!

® Totocillin Der neue 20 ml Injektor

Zur Therapie akuter und chronischer
Euter- und Uterusentzündungen



Besonders Uterusentzündungen sind meistens Mischinfektionen, die bei unbekanntem Erregerspektrum sofortige Behandlung verlangen.

Notwendig ist ein breites Wirkungsspektrum, das grampositive und -negative Keime erfasst. Das Mittel der Wahl: Totocillin im neuen 20-ml-Injektor, im 10-ml-Injektor oder in der 100-ml-Flasche.

Totocillin ist penicillinasefest, hat eine kurze Wartezeit, kann

zur Uterusbehandlung 12 bis 24 Stunden nach dem Besamen (Aströmsche Methode) eingesetzt werden.

Zusammensetzung: 1 ml Suspension enthält 23,1 mg Ampicillin 3 H₂O, entsprechend 20 mg Ampicillin und 44 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolcarboxamido)penicillansäure, Natriumsalz 1 H₂O, entsprechend 40 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolcarboxamido)penicillansäure (Oxacillin).

Handelsformen:

- Sch. mit 10 Inj. zu je 20 ml
- Sch. mit 10 Inj. zu je 10 ml
- Flaschen zu 100 ml

Bayer



Generalvertretung Schweiz:

provet  Vet.-med.
Center

3421 Lyssach bei Burgdorf