

**Zeitschrift:** Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire  
ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

**Herausgeber:** Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

**Band:** 132 (1990)

**Heft:** 10

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 01.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Gentapen<sup>®</sup> ad us. vet.

## Suspension und Injektoren zur Euterbehandlung

### Kombination Gentamicin / Penicillin

- umfassendes Wirkungsspektrum
  - kaum Resistenzen
  - hohe Dosierung
  - hervorragende Euterverträglichkeit
- bessere Erfolge bei der Behandlung akuter Mastitiden!

#### ■ **Gentapen<sup>®</sup>-Suspension** zur Initialbehandlung:

- 1 Dosis (25 ml) = 5 Mio. Penicillin + 500 mg Gentamicin
- konzentrierte wässrige Suspension
- rasch hohe Wirkstoffspiegel im Euter
- mit allen gängigen Lösungsmitteln verdünnbar
- Durchstechflaschen zu 100 ml und Flaschen mit Luer-Verschluss zu 200 ml

#### ■ **Gentapen<sup>®</sup>-Euterinjektoren** zur Nachbehandlung:

- 1 Injektor (10 g) = 2,5 Mio. Penicillin + 250 mg Gentamicin
- konzentrierte wässrige Salbe
- rasche Wirkung ohne verzögerte Ausscheidung und Hemmstoffprobleme
- Packungen mit 4 und 100 Injektoren



**Gentapen<sup>®</sup>-Suspension und -Injektoren = zwei wirksamere Präparate!**

# CONTRACTON

... das zuverlässige  
Uterustonicum post partum

- 1 ml Lösung enthält:  
Oxytocinum 5 IE  
Ergometrinium maleinicum 0,5 mg
- sofortiger Wirkungseintritt (1–3 Minuten) durch Oxytocin
- anhaltende uterustonisierende Wirkung durch Ergometrin
- vermindert oder stoppt Uterusblutungen
- beschleunigt den vollständigen Abgang der Nachgeburt

## ... der Tip aus der Praxis:

Bei schweren Uterus-Atonien mit massiver Schädigung der Uteruswand sind die Rezeptoren am Uterus häufig mit keiner Medikation stimulierbar. In diesen Fällen kann der Uterus mit einer intrauterinen Infusion von 2 Litern gesättigter Kochsalz-Lösung für CONTRACTON sensibilisiert werden.


Ein Versuch lohnt sich!

Ampullenflaschen mit 10 ml und 50 ml

IKS-Nr. 46244

The logo for G. Streuli & Co. AG, featuring the name 'Streuli' in a stylized, cursive script font. The logo is positioned on the left side of a decorative horizontal bar that spans the width of the advertisement. The bar has a gradient from dark grey to light grey and is accented with diagonal stripes.

G. Streuli & Co. AG – 8730 Uznach  
Pharmazeutica  
Telefon 055 - 71 11 01  
Telefax 055 - 72 46 45



# ® Totocillin

## Erfolg ist meßbar

Entscheidend für Ihren Erfolg mit Totocillin sind:

1. Der **Synergismus** von Oxacillin und Ampicillin = schnelle Wirkung gegen ein breites Erregerspektrum.
2. Die **spezielle Zubereitung** (Formulierung) = ausgezeichnete Verteilung in Euter und Uterus.
3. Die **praxisgerechten Abpackungen** = 10 ml Injektor, 20 ml Injektor, 100 ml Flasche.

**Zusammensetzung:** 1 ml Suspension enthält 23,1 mg Ampicillin  $3H_2O$ , entsprechend 20 mg Ampicillin und 44 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolcarboxamido)penicillansäure. Natriumsalz  $1 H_2O$ , entsprechend 40 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolcarboxamido)penicillansäure (Oxacillin).

**Anwendungsgebiete:** Behandlung akuter und chronischer Euterentzündungen während der Laktation sowie akuter und chronischer Uterusentzündungen.

**Wartezeiten:** Eßbares Gewebe 3 Tage, Milch nach Anwendung: intrazisternal 5 Tage, intrauterin 3 Tage, intraabdominal 3 Tage.

Generalvertretung Schweiz:

**provet**  **Vet-med. Center**  
3421 Lyssach bei Burgdorf

® = eingetr. Warenzeichen der Bayer AG

**Bayer** 