

Zeitschrift: Schweizer entomologischer Anzeiger : Monatsschrift für allgemeine Insektenkunde, Schädlingsbekämpfung, Insektenhandel, Tausch, Literatur = Journal entomologique suisse

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 1 (1922)

Heft: 2

Rubrik: Kleinere Mitteilungen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

C'est aussi une question d'entomologie appliquée que traite le Dr. O. Morgenthaler (Berne), en faisant connaître les Acariens que l'on peut trouver dans les ruchers (*Ueber Milben im Bienenstock*). Il donna surtout des renseignements illustrés de photographies intéressantes, sur la maladie des abeilles connues en Angleterre sous le nom de „Wight disease“ et occasionnées par de petits acariens, *Tarsonemus Woodi*, qui vivent dans les trachées des abeilles.

Enfin, pour terminer, le Dr. Th. Steck (Berne), parla de „*seltene schweizerische Hymenopteren*“, et montra toute une série d'espèces fort rares, qu'il eut l'occasion de récolter pendant ses excursions entomologiques autour de Berne, dans le Valais et au Tessin.

De nombreuses discussions entre conférenciers et auditeurs montrèrent l'intérêt que suscitèrent toutes les questions traitées. Après une matinée, si bien remplie, un diner réunit encore les entomologistes dans une atmosphère de bonne amitié confraternelle.

Signalons aussi les belles expositions de Coléoptères du Dr. Böschenstein et de Lépidoptères de Mons. Pfaehler, pharmacien, qui purent être admirées par tous les participants à l'assemblée de Schaffhouse.

Ch. F.

Kleinere Mitteilungen.

Vernichtung eines Cincindelen-Bestandes durch Hochwasser. Ich kannte seit einigen Jahren in einem sehr lichten Lärchenwäldchen oberhalb Zermeiggern, zuhinterst im Saastal (Oberwallis) in ca. 1800 m. ü. M. eine Stelle wo die *Cincindela gallica* Brull. häufig vorkam. Beim Hochwasser vom 23.-24. September 1920 wurde diese Stelle durch die Visp überschwemmt und verwüstet. Ich habe das ganze Gebiet im Jahre 1921 oft und eingehend abgesehen, es war aber kein Stück mehr dieses Sandlaufkäfers zu sehen. Ich erwähne den Fall, weil hier ein Naturereignis und nicht etwa der Mensch das Vernichtungswerk geleistet hat.

A. Hess. Bern

Es liegt im Interesse jedes Lesers den Anzeiger in seinem Bekanntenkreise zu empfehlen; denn nur wenn wir sehr viele Abonnenten haben, können wir den äußerst billigen Abonnementspreis für die folgenden Jahre aufrecht erhalten. Auch wird es nur dann möglich sein, den Anzeiger im Sommer alle 14 Tage (zwischen 2 Nummern ein Extrablatt) für Angebot und Nachfrage von Zuchtmaterial erscheinen zu lassen. Deshalb helfe ein Jeder am Ausbau unserer Sache!

Ia. Schmetterlinge!

Aus der Liquidation der Prof. Standfuss'schen Sammlung sind folgende Tagfalter abzugeben: *Papilio podalirius* ♂ -30, ♀ -30; *smyrnensis* 2.50, 5.-; *miegii* ♂ 2.50; *feisthameli* 1.25, 2.-; *alexanor* div. Localf. 1.50, 2.-; *hospiton* 2.50, 2.50; *machaon* -30, -30; *bianor* 2.50, 5.-; *mayalis* 3.- 6.-; *maakii* 3.10, 6.-; *raddei* 5.-, 8.50; *hippocrates* 1.50 3.-; *xuthus* 1.50, 3.-; *xutulus* 2.50, 4.-; *Sericinus telamon* 2.50, 5.-; *koreana* 3.50, 6.50; *amurensis* 3.50, 6.50; *telemachus* 5.- 9.-. *Luehdorfia puziloi* 5.-, 6.20; *japonica* 3.-, 5.-; *Thais cerysii* 1.-, 1.25; *ochracea* ♀ 2.-; *déyrollei* -80, 1.20; *albidor* ♀ 1.50; *obscurior* ♀ 1.50; *ex Jerusalem*, *Schipkapass*, *Beyrut*, *Amasia*, *Aintab*, *Caucasian* 1.-, 1.25; *polyxena* -35, -35; *ochracea* ♀ 1.20; *rumina ex Madrid*, *Lissabon*, *Tanger* -80, -80; *canteneri* 5.- 4.-; *medesicaste* -80, 1.20. *Hypermnestra helios* 3.75, 5.-; *ochromaculata* 5.-; 7.-; *maxima* 2.50, 5.50. *Dor. apollinus* 1.20, 1.30; *amasina* 1.20, 1.30; *krystallina* 1.20, 1.50; *apollinaris* 3.-, 4.-; *martina* 2.-, 3.-; *rubra* 1.50, 7.-; *bellargus* 1.50 2.-. *Parnassius apollo* div. Localf. -30, -60; *hesebolus* 2.50, 5.-; *virgo* 2.50, 5.-; *nominulus* 3.50, 7.-; *discobulus* 1.-, 1.50; *minor* 1.50, 3.50; *apollinus* 1.50, 2.50; *alpinus* 2.50, 3.50; *honrathi* 10.-, 17.-; *bremeri* 2.50, 7.50; *delius-phoebus* -30, 1.-; *actius* u. var. *caesar* 3.50, 6.-; *actinobulus* 6.-, 8.-; *thibetanus* 20.- 40.-; *epaphus* 6.-, 11.-; *poeta* 6.-, 12.-; *oberthüri* 6.-, 12.-; *delphius* 2.50, 4.-; *illustris* 5.-; 6.-; *charltonius* 10.-, 15.-; *imperator* 10.-, 15.-; *szechenyi* 20.- 40.-; *groumi* 12.-, 15.-; *clarius* 12.-, 15.-; *dentata* 12.50, 25.-; *nordmanni* 10.-, 20.-; *mnemosyne* -30, -50; *div.* Localf. 1.-, 3.-. *Aporia crataegi* -30 -30. *Pieris brassicae* -30, -30; *rapae* -30, -30; *manni* -60, 1.-; *ergane* -50, 1.-; *napi* -30, -30; *napaeae* -30 -40. *Belenois mesentina* -80, 1.-. *Synchlloe callidice* -30, -70. *Leucochlloe daplidice* -30, -30; *glauconome* ♂ 4.50. *Euchlloe falloui* ♂ 5.-; *belia* -50, -70; *uralensis* -65, 1.25 *simplonia* -60, 1.20; *pechi* 17.-, 31.-; *tagis* 1.50, 2.-; *pyrothoe* ♂ 6.-. *Anthocharis charltonia* 2.-, 4.-; *decorata*

6.50, 20.-; *cardamines* -30 -30; *gruneri* 2.-, 8.-; *damone* 1.50, 5.-; *eupheno* -50, 1.-; *euphenoides* -50, 1.-. *Midea scolymus* 1.-, 2.10. *Zegris eupheme* 1.10, 1.50; *menestho* 1.50, 2.50; *meridionalis* 2.-, 3.-; *fausti* 4.-, 11.-. *Teracolus fausta* 1.-, 1.25; *nouna* 4.-, 6.50. *Gonepteryx cleobula* 2.50, 5.-. *Colias europomene* -50, 1.15; *nastes* 4.-, 6.-; *werdandi* 1.-, 1.20; *radlata* 1.50, 2.-; *phicomone* -30 -50; *sieversi* 10.-, 20.-; *hyale* -30, -40; *polygraphus* -75, 1.25; *erate* -50, 1.-; *sareptensis* ♂ -75; *chrysdona* 2.50, 5.-; *pallida* ♀ 1.20; *regia* 6.-, 18.-; *hecla* 3.50, 7.50; *chrysotheme* -40, -80; *sibirica* 1.-, 2.-; *fieldii* 1.25, 2.50; *hurleyi* ♀ 2.-; *edusa* -30, -40; *myrmidone* -30, -50; *balcanica* 2.-, 4.-; *rebeli* ♀ 6.-; *caucasica-olga* 6.-, 10.-; *olga-alba* ♀ 10.-; *aurora* 4.-, 12.-; *aurorina* 5.-, 8.-; *heldreichi* 4.-, 8.-; *taurica* 6.25, 10.-; *sagartia* 3.50, 8.-; *wiskotti* 15.-, 25.-; *Limnitis populi* -40, -80. *Neptis lucilla* -30, -40. *Pyrameis atalanta* -30, -30; *klymene* 3.-, 4.-; *vulcanica* 2.-, 2.-; *cardui* -30, -30; *virginensis* 1.25, 2.-. *Vanessa jo* -30, -30; *urticae* -30, -30; *ichnusa* -65, -65; *l. album* 1.20 1.50; *xanthomelas* -50, -50; *polychloros* -30, -30; *antiopa* -30, -30; *hygiaea* 5.-, 5.-; *canace* 1.50, 2.-. *Melitaea desfontainii* 1.25, 2.-; *fergana* 2.50, 4.-; *didyma* -30 -40; *occidentalis* -30, -50. *Argynnis pales* -30, -40; *diva* 5.- 7.-. *Melanargia galathea* -30, -40; *proclia* -50 -80; *titea* 1.- 2.-; *titania* 1.25, 2.50; *japygia* -50, -80; *parce* 1.-, 2.-; *larissa* -70, 1.-; *hertha* -75, 1.50; *pherusa* 1.80, 2.50; *ines* -70, 1.50; *arge* 2.-, 3.-. *Oeneis norna* 1.-, 2.-, *bore* 3.-, 5.-. *Satyrus bris.* var. *fergana* -50, 1.-; *prieuri* 1.25, 2.-; *neomiris* -70, 1.50; *geyeri* -60, 1.-; *regeli* 2.20, 2.50; *abramovi* 1.50, 2.-; *huebneri* 3.-, 4.-; *telephassa* 1.-, 1.50; *statilinus* -30, -40; *fidia* -70, 1.-; *parisatis* 1.50, 2.50; *abdelkader* 6.-, 7.50; *actaea* -50, 1.-. Die Preise verstehen sich für Ia-Qualität in Frankenwährung. II. Qual. entsprechend billiger. Teilweise sind die angeführten Tiere nur in 1-2 Stücken vorhanden. Sich zu wenden an

Trudpert Locher, „Iris“, Erstfeld (Uri).