

**Zeitschrift:** Schweizer entomologischer Anzeiger : Monatsschrift für allgemeine Insektenkunde, Schädlingsbekämpfung, Insektenhandel, Tausch, Literatur = Journal entomologique suisse

**Herausgeber:** Schweizerische Entomologische Gesellschaft

**Band:** 3 (1924)

**Heft:** 4

  

**Artikel:** Die Schmetterlinge des Tößstockschongebietes

**Autor:** Weber, Paul

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-762879>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 02.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Die Schmetterlinge des Töbstockschongebietes.

(2. Nachtrag.)

Im Jahre 1923 verbrachte ich die Zeit vom 4.—15. August im Schongebiet am Töbstock. Die Hauptaufmerksamkeit widmete ich diesmal dem Sammeln bei Nacht mit dem Lichtfangapparat. Der erste Faktor, der dabei in Betracht kommt, nämlich dunkle Nächte, wurde bei Festsetzung der Zeit berücksichtigt, der Neumond fiel auf den 12. August. Wenn die Ausbeute trotzdem nicht besonders groß war, so liegt der Grund hiefür einerseits in den sternhellen, kühlen, oft auch windigen Nächten, anderseits darin, daß die Herbststelen noch nicht flogen. Die in den früheren Berichten nicht erwähnten oder selteneren Spezies seien hiemit verzeichnet:

## Lycaenidae.

*Thecla ilicis* Esp. 1 ♂ a. d. Vord. Töbsschlucht bei Punkt 963.

## Drepanidae.

*Drepana lacertinaria* L. 1 ♂ unterhalb der Nagelfluhfelsen beim Bärloch, a. Licht.

## Noctuidae.

*Acronycta alni* L. 1 ausgewachs. Raupe bei Pension Hint. Strahlegg.

*Craniophora ligustri* F. 1 ♂ bei Pens. Hint. Strahlegg a. Licht.

*Agrotis strigula* Scholen. 1 ♂ auf der Warte (1207 m) a. Licht.

„ *baja* F. 2 ♂ auf der Warte (1207 m) a. Licht.

„ *brunnea* F. Je 1 ♂ auf der Warte u. b. Bärloch a. Licht.

„ *depuncta* L. 1 ♂ bei Hint. Strahlegg a. Licht.

„ *decora* Hb. 1 ♂ beim Bärloch a. Licht.

*Bombycia viminalis* F. Ziemlich häufig bei Hint. Strahlegg u. b. Bärloch a. Licht.

*Hadena scolopacina* Esp. 1 ♂ b. Hint. Strahlegg a. Licht.

*Hydroecia nictitans* Bkh. 1 ♂ b. Bärloch a. Licht.

*Leucania lithargyrea* Esp. 1 ♂ b. Hint. Strahlegg a. Licht.

*Caradrina taraxaci* Hb. 1 ♂ südwestlich Tierhag (ca. 1100 m) a. Licht.

*Calymnia trapezina* L. 1 ♂ do.

*Cosmia paleacea* Esp. 1 ♂ do.

**Cymatophoridae.** *Thyatira batis* L. 8 Raupen —  $\frac{3}{5}$  bis  $\frac{4}{5}$  erw. — auf der Schindelbergerhöhe an Brombeere.

## Geometridae.

*Acidalia bisetata* Huf. 1 ♂ am Südhang der Wartenhöhe (ca. 1150 m) a. Licht.

„ *aversata* L. 1 ♂ südwestl. Tierhag (ca. 1100 m) a. Licht.

*Lygris reticulata* S. V. 1 ♂ in der Vord. Töbsschlucht bei Punkt 963.

„ *prunata* L. 1 ♂ b. Hint. Strahlegg a. Licht.

*Larentia cognata* Sebaldt. 2 ♂ a. d. Warte (1207 m) a. Licht.

*Tephroclystia sobrinata* Hb. Häufig b. Hint. Strahlegg, a. Südhang der Wartenhöhe, auf d. Warte, b. Bärloch u. auf d. Schindelbergerhöhe a. Licht.

*Crocallis elinguaris* L. 1 ♀ auf der Warte (1207 m) a. Licht.

## Arctiidae.

*Lithosia complana* L. 1 ♂ am Südhang der Wartenhöhe a. Licht.

*Arctia caja* L. 1 ♂ beim Bärloch a. Licht.

## Pyralidae.

*Crambus tristella-paleella* Hb. 1 ♂ südwestl. Tierhag a. Licht.

„ *myellus* Hb. 1 ♂ auf d. Warte a. Licht.

*Hypochalcia ahenella* Hb. 1 ♂ b. Bärloch a. Licht.

*Scoparia truncicolella* Stt. 1 ♂ im Wald zwischen Vord. Strahlegg u. Bärloch.

## Tortricidae.

*Cacoecia aeriferana* H. S. 1 ♂ dieses seltenen Falterchens auf d. Warte a. Licht.

*Pandemis cinnamomeana* Tr. Häufig bei Hint. Strahlegg u. b. Bärloch a. Licht.  
*Notocelia incarnatana* Hb. 2 ♂ auf der Warte u. 1 ♂ a. d. Schindelbergerhöhe a. Licht.  
*Epiblema cana* Hw. 1 ♂ b. Pens. Hint. Strahlegg a. Licht.  
 „ *nisella-decorana* Hb. 1 ♂ dieser selt. Form b. Bärloch a. Licht.

**Orneodidae.**

*Orneodes desmodactyla* Z. 1 ♂ b. Bärloch a. Licht.

**Gelechiidae.**

*Hypercallia citrinalis* Sc. 1 ♂ am Südhang der Wartenhöhe.  
*Gelechia electella* Z. 1 ♂ auf der Warte aus Wacholdergebüsch geklopft.

**Gracilariidae.**

*Lithocolletis salictella* Z. 1 Stck. in d. Vord. Tößschlucht (Punkt 963).

**Lyonetiidae.**

*Lyonetia clerkella* L. Westl. Pens. Hint. Strahlegg häufig aus Gebüsch geklopft.  
 „ *clerkella-aereella* Tr. do.

**Elachistidae.**

*Eladista monticola* Hein. Wck. 1 ♂ bei Pens. Hint. Strahlegg aus Gebüsch geklopft.  
 „ *nigrella* Hw. 1 ♂ am Südhang der Wartenhöhe.  
 „ *humilis* Z. 1 ♂ auf d. Schindelbergerhöhe a. Licht.

**Hyponomeutidae.**

*Prays curtisellus* Dup. Vord. Tößschlucht b. Punkt 963, 1 ♂.  
*Hyponomeuta cognatellus* Hb. 2 ♂ unterhalb Tierhag a. Licht.  
*Argyresthia fundella* F. R. 1 Stck. am Westhang der Schindelbergerhöhe.  
*Cerostoma parenthesella-paricostella* Fuchs. 1 ♀ westl. Pens. Hint. Strahlegg aus Gebüsch geklopft.

**Nepticulidae.**

*Nepticula basalella* H. S. 1 Stck. in der Vord. Tößschlucht (P. 963).

In den Jahren 1920—23 wurden im Schongebiet am Tößstock festgestellt:

	Arten	Formen		Arten	Formen
Papilionidae	1		Pyralidae	29	2
Pieridae	8	2	Tortricidae	49	5
Nymphalidae	28	5	Glyphipterigidae	1	
Erycinidae	1		Pterophoridae	7	
Lycaenidae	11		Orneodidae	1	
Hesperidae	8		Gelechiidae	14	
Sphingidae	4		Coleophoridae	6	
Notodontidae	7		Gracilariidae	5	1
Drepanidae	2		Lyonetiidae	1	1
Saturniidae	2		Elachistidae	4	
Lasiocampidae	2		Scytrididae	2	
Lymantriidae	2		Hyponomeutidae	16	2
Noctuidae	47	1	Tineidae	2	
Cymatophoridae	2		Incurvariidae	7	
Geometridae	94	4	Nepticulidae	1	
Arctiidae	7	1	Micropterygidae	2	
Zygaenidae	6	3	Hepialidae	2	
Psychidae	1			<hr/>	
				382	27

Paul Weber, Zürich.