

Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss
Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 1 (1862-1865)

Heft: 6

Artikel: Uebersicht der in Europa und den angränzenden Ländern
einheimischen Arten der Gattung *Simonius*

Autor: Stierlin

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-400187>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 19.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Uebersicht der in Europa und den angränzenden Ländern einheimischen Arten der Gattung *Simonius*.

Aus Candez Monographie der *Elateriden* ausgezogen und ins Deutsche
übertragen.

Von Dr. Stierlin.

- I. Seitennäthe des prosternum vorn als Furche ausgehöhlt.
- a) Oberseite blau oder roth oder zweifarbig.
- b) dunkelblau *violaceus* Müll. Mittel- u. Süd-
Deutschland, Lg. 9-11 mm.
- bb) röthlich *rufus* Dj. Spanien, Länge 12
millimeter.
- bbb) zweifarbig, Flügeldecken zweifarbig,
Halsschild roth *suturalis* Gbl. Süd-Russland,
Sibirien, Länge 8-9 mm.
- aa) Oberseite schwarz oder bronzen, einfarbig.
- b) Drittes Fühlerglied fast so lang als das
vierte und deutlich länger als das zweite.
- c) Beine dunkel.
- d) Flügeldecken der Nath entlang flachgedrückt *nigripes* Gyll
Deutschland, Lg. 9-11 mm.
- dd) „ in die Quere gewölbt *cylindricus* Pk. Mittel- u.
Nord-Europa. Lg. 9-11 mm.
- cc) Flügeldecken roth *tardus* Cand. Südfrankreich
Länge 8 millimeter.
- bb) Drittes Fühlerglied nicht grösser oder noch
kleiner als das zweite.
- c) Oberseite erzfarbig, Klauen in der Mitte gezähnt *minutus* L.
Europa, besonders im Norden
Länge 6 mm.
- cc) „ „ „ einfach *parvulus* Pz. Europa.
Länge 7-8 mm.
- II. Seitennäthe des prosternum vorn nicht gefurcht *Bructeri* F. Nord-
und Mittel-Europa.
Länge 6-7 mm.