

**Zeitschrift:** Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =  
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss  
Entomological Society

**Herausgeber:** Schweizerische Entomologische Gesellschaft

**Band:** 17 (1937-1939)

**Heft:** 11

  

**Artikel:** Chasses de nuit au Vallon de la Versoix

**Autor:** Méroz, A.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-400887>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 15.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Chasses de nuit au Vallon de la Versoix

par

A. MÉROZ.

Cette vallée, située à proximité de Genève, se prête admirablement bien pour la chasse des Hétérocères.

De nuit, dès la sortie de la gare de Versoix, en direction Les Villars, Richelien La Bâtie, les rares réverbères attirent de nombreux papillons surtout durant les nuits sombres ou les soirs d'orages. La chasse autour de ces réverbères est cependant peu fructueuse car, étant donné la hauteur des lumières, les papillons échappent souvent aux filets. Il est donc préférable de se munir de lanternes que l'on fixe dans des lieux choisis. Le résultat de la chasse est généralement bon. Mais, l'endroit le mieux situé est, sans aucun doute, le Restaurant Sick à Richelien. Le bâtiment, placé sur la hauteur, domine toute la contrée, sa grande façade vitrée et bien éclairée, attire les insectes mieux que toute autre lumière. Les captures que l'on peut faire contre les vitres de la salle sont nombreuses et souvent intéressantes ainsi qu'en témoigne la liste ci-dessous :

- Endromis versicolora* L. — 11. IV. 39, 1 exempl.  
*Gastropacha rimicola* Hb. — 29. X. 38, 1 exempl.  
*Stauropus fagi* L. — Juillet 1937, plusieurs exempl.  
*Notodonta trepida* Esp. — 14. V. 37, 1 exempl.  
*Notodonta chaonia* Hb. — 20. IV. 39, 1 exempl.  
*Notodonta querna* F. — 14. V. 38, 1 exempl.  
*Notodonta trimacula* Esp. — 5. VI. 37, 1 exempl.  
*Drynobia velitaris* Rott. — 28. VII. 37, 1 exempl.  
*Gluphisia glyphida* H.-S. *crenata* Esp. — 6. VI. 37, 2 exempl.  
*Pygaera clostera* Stph. *anachoreta* F. — 29. IV. 38, 1 exempl.  
*Asphalia diluta* F. — Juillet, août et septembre 1936 et 1937, plusieurs exempl.  
*Gonophora derasa* L. — 7. VII. 37, 1 exempl.  
*Acronycta tridens* Schiff. — 18. I. 37, 1 exempl.  
*Triphaena fimbria* L. — 7. VII. 37, 1 exempl.  
*Laria* L. *nigrum* Mill. — 19. VI. 37, 1 exempl.  
*Psilura monacha* L. — Juillet 1937, plusieurs exempl.  
*Agrotis praecox* L. — 26. IX. 28, 1 exempl.  
*Dianthoecia nana* Rott. — 24. VI. 38, 1 exempl.  
*Apama testacea* Hb. — 25. IX. 36, 2 exempl.  
*Hadena rubricena* Tr. var. *Hercyniae* Str. — 21. IX. 36, 2 exempl.  
*Hadena srubwei*. — 16. VII. 38, 1 exempl.  
*Calimnia diffinis* L. — 7. VII. 37, 1 exempl.  
*Orthosia helvola* L. — 1. X. 38, 1 exempl.  
*Xanthia fulvago* L. var. *flavesens*. — 25. IX. 36, 1 exempl.  
*Xylocampa areola* Esp. — 2. IV. 39, 1 exempl.

*Plusia bractea* F. — 20. IX. 36, 1 exempl.

*Plusia illustris* F. — 23. VII. 38, 1 exempl.

*Erastria venustula* Hb. — 10. VI. 37, 1 exempl.

*Biston hispidarius* F. — 21. III. 37, 5. III. 38, 26. II. 39, 11. III. 39,  
4 exempl.

*Boarmia cinctaria* Schiff. — 10. IV. 38, 1 exempl.

*Cidaria-Larentia corylata* Th. — 19. VI. 37, 1 exempl.

*Enomos fuscantaria* Hn. — 5. IX. 36, 1 exempl.

## A propos de

### «Chasses printanières aux Lépidoptères au Maroc»

(voir Bull. Soc. Lépid. Genève, vol. VII, p. 246—265, 1938)

par

D<sup>r</sup> G. E. AUDEOUD

M. Ch. BOURSIN après avoir eu en mains notre article, a eu l'amabilité de contrôler nos *Autophila* cités sous chiffres 124 et 125 de notre liste des espèces. Il m'a fait remarquer que l'appellation *Aut. cataphanes* ab. *roseata* Rtsch. n'est pas exacte. Ce papillon n'est pas considéré comme une aberration de *cataphanes* ; il s'appelle *maura* Stgr. (syn. *roseata* Rtsch.) bona sp.

Quant à *rosea* Stgr. ce n'est pas non plus une variété de *dilucida*, mais elle aussi une bona sp.

Les 2 exemplaires sus-mentionnées sont des ♀.

Il résulte de ces rectifications que le No. 124 doit être rédigé ainsi : *Autophila maura* Stgr. 1 ♀ à Beni-Ounif

et le No. 125 : *Autophila rosea* Stgr. 1 ♀ à l'Oued Juif.

Pour être complet, je dois ajouter à notre liste deux espèces que j'ai omises :

No. 14bis *Gonepteryx rhamni* L. 2 ♂ à Ras el Ma, 29. III. 1923.

No. 51bis *Adopaea hamza* Obth. 1 ♀ à St-Hubert.

Ce qui porte le total de nos espèces à 261.