

**Zeitschrift:** SuchtMagazin  
**Herausgeber:** Infodrog  
**Band:** 27 (2001)  
**Heft:** 3

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 29.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

info set  
direct

Information und Kommunikation  
im Drogen- und Suchtbereich

## Die Schweizer Suchtarbeit auf dem Internet

<http://www.infoset.ch>

## Drug-Screen

Jetzt noch einfacher und  
kostengünstiger...

Einfache Handhabung.  
Ergebnis nach 3-8 Minuten.

### Einzeltests

Kostengünstig in der  
neuen Runddose!

Tests auch als  
Multi-Test-Cards  
in fünf Kombina-  
tionen lieferbar,  
z.B. **Multi-5M**:

### Insgesamt 10 Parameter:

Amphetamin, Barbiturate, Benzodiazepine, Methadon,  
Methamphetamin, Kokain, Opiate, PCP, TCA, THC

von minden GmbH




Carl-Peschken-Strasse 9 · 47441 Moers/Germany  
Fon: +49 (0) 28 41/13 51 · Fax: +49 (0) 28 41/2 16 37  
Internet: [www.vonminden.de](http://www.vonminden.de) · E-mail: [info@vonminden.de](mailto:info@vonminden.de)

## Drogenmissbrauch?

Triage®

**Nachweis von MTD BZO  
COC AMP THC OPI BAR  
und TCA**



**8 Ergebnisse in  
10 Minuten**

- Unzweideutige Interpretation auch im Cut-Off-Bereich
- Eingebaute Positiv- und Negativ-Reaktionskontrollen
- Hochspezifisches und sensitives Screening aller wichtigen Drogenmissbrauchsklassen, inklusive TCA

Weitere Informationen unter:

**MEDIM Schweiz GmbH**  
Medical Diagnostic Products

Postfach 247, CH-6374 Buochs

Tel. 041 622 10 40 Fax 041 622 10 43 Internet: [www.medim.ch](http://www.medim.ch)

Suchen Sie ein idyllisch gelegenes Haus in familiärer  
Atmosphäre um Ihre  
**Tagungen, Retraïten, Seminare**  
oder ähnliches durchzuführen?

Dann ist unser

## Haus Antares


in Kienberg (SO)

35 km von Basel entfernt genau das Richtige!



Max. 17 Plätze und gut erreichbar. Halb-, Vollpension oder Selbstversorgung möglich. Alles vorhanden, um in einem besonderen Ambiente Ihre Tagungen durchzuführen.

Rufen Sie uns an oder verlangen Sie die Unterlagen:  
Stiftung für Sucht- und Jugendprobleme, SSJ  
Holbeinstrasse 48, 4051 Basel  
Tel. 061/ 271 49 59, Fax 061/ 271 46 54  
E-Mail: [admin@ssj-basel.ch](mailto:admin@ssj-basel.ch)



**Angsterkrankungen**

- Sozialphobie
- Panik
- Zwang

**Depression**

Paroxetinum <sup>TM</sup>  
**Deroxat**

Echte Hilfe bei Depression  
 und Angsterkrankungen



GlaxoSmithKline

SmithKline Beecham AG  
 Brunnmattstrasse 13  
 CH - 3174 Thörishaus

Tel. +41 (0)31 888 21 11  
 Fax. +41 (0)31 888 21 22

**Darreichungsformen:** Filmtabletten zu 20 mg Paroxetin, Suspension 20 mg/10 ml. **Indikationen:** Depressive Erkrankungen, Panikstörungen, Zwangsstörungen, jeweils akute Therapie und Langzeitbehandlung; Sozialphobie, akute Therapie. **Dosierung:** Depressionen und Sozialphobie: Anfangs- und Standarddosierung: 20 mg pro Tag als morgendliche Einnahme. Falls nötig Erhöhung auf 30 oder 40 mg, bei Sozialphobie bis 50 mg. **Panikstörungen:** Anfangsdosierung: 10 mg pro Tag, Erhöhung in wöchentlichen 10 mg-Schritten bis zur Standard-Tagesdosis von 40 mg. Erhöhung bis maximal 60 mg möglich. **Zwangsstörungen:** Anfangsdosierung: 20 mg pro Tag, Erhöhung in wöchentlichen 10 mg-Schritten bis zur Standard-Tagesdosis von 40 mg. Erhöhung bis maximal 60 mg möglich. **Spezielle Dosierungsanweisungen:** Höchststos bei älteren Patienten - 20 mg/Tag. Bei schwerer Nieren- oder Leberinsuffizienz unteren Dosierungsbereich wählen. **Kontraindikationen:** Bekannte Deroxat-Überempfindlichkeit. Keine gleichzeitige Anwendung von MAO-Hemmern oder Typtophan. Vor und nach Therapie mit MAO-Hemmern Intervall von 2 Wochen einhalten. **Vorsichtsmassnahmen:** Vorsicht bei Patienten mit Epilepsie, manischen Episoden, Engwinkelglaukom, Bluthochdruck oder kardialen Problemen. Elektrolytstörungen, bei Krampfanfällen absetzen. Vorsicht bei gleichzeitiger Anwendung von Anticholinergika, Antidepressiva, Antipsychotika, Anästhetika, Berberis, Chinidin, Digoxin, Lithium, Narkotika, Sulfonamiden, Theophyllin, Trizolam, Valproat, Zidovudine. **Unerwünschte Wirkungen:** Am häufigsten beobachtet: Übelkeit, Schläfrigkeit, Schwinden, Tinnitus, Schwächezustände, Mundtrockenheit, Schlafstörungen, sexuelle Störungen. **Packungen/Preise:** Packungen zu 14\* (Fr. 51.55), 28\* (Fr. 90.70) und 98\* Filmtabletten (Fr. 295.95), Suspension 150 ml\* (Fr. 51.55). **Verkaufskategorie:** B. \*Massezusatz