

**Zeitschrift:** SuchtMagazin  
**Herausgeber:** Infodrog  
**Band:** 28 (2002)  
**Heft:** [1]

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)


### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 14.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

**Darreichungsformen:** Filmtabletten zu 20 mg Paroxetin, Suspension 20 mg/10 ml. **Indikationen:** Depressive Erkrankungen, generalisierte Angststörungen, Zwangsstörungen, jeweils akute Therapie und Langzeitbehandlung; Sozialphobie, posttraumatische Belastungsstörungen (ab 18 Jahren), akute Therapie. **Dosierung:** Depressoren: Anfangsdosierung: 20 mg pro Tag als morgendliche Einmalgabe, bis zur Erhöhung auf 30 oder 40 mg. **Sozialphobie, generalisierte Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen:** Anfangs- und Standarddosierung: 20 mg pro Tag. Falls nötig Erhöhung in wöchentlichen 10-mg-Schritten bis maximal 50 mg. **Panikstörungen:** Anfangsdosierung: 10 mg pro Tag, Erhöhung in wöchentlichen 10-mg-Schritten bis maximal 60 mg möglich. **Zwangsstörungen:** Anfangsdosierung: 20 mg pro Tag, Erhöhung in wöchentlichen 10-mg-Schritten bis zur Standard-Tagesdosis von 40 mg. Erhöhung bis maximal 60 mg möglich. **Spezielle Dosierungsanweisungen:** Hochstosidosis bei älteren Patienten 20 mg/Tag. Bei schwerer Nieren- oder Leberinsuffizienz unteren Dosierungsbereich wählen. **Kontraindikationen:** Überempfindlichkeit gegenüber Inaktivsstoff. Keine gleichzeitige Anwendung von MAO-Hemmern oder Thioridazin. Vor und nach Therapie mit MAO-Hemmern Intervall von 2 Wochen einhalten. **Vorsichtsmaßnahmen:** Vorsicht bei Patienten mit Epilepsie, manischen oder hypomanischen Episoden, Engwinkelglaukom, Bluthochdruck oder kardialen Problemen, erhöhtem Blutungsrisiko, Elektroshocktherapie. Bei Krampfanfällen absetzen. Vorsicht bei gleichzeitiger Gabe von trizyklischen Antidepressiva, Tryptophan, Neuroleptika vom Phenothiazin-Typ, TC-Antiarhythmika, Metoprolol, Codein, Cimetidin, Phenytoin, oralen Antikoagulantien sowie Abhängigkeit von Alkohol, Zigaretten, Drogen. Vorsicht bei Kindern anwenden; langsam und schrittweise absetzen. **Unerwünschte Wirkungen:** Am häufigsten beobachtet: Übelkeit, Schläfrigkeit, Müdigkeit, Schwindel, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Stomatitis, Verstopfung. **Packungen:** Packungen zu 14-, 28- und 98 Filmtabletten, Suspension 150 ml. **Verkaufskategorie:** b. **kasenzulässig.** Ausführliche Angaben entnehmen Sie bitte dem Arzneimittelkompendium der Schweiz. (www.documed.ch, Fast Online)



**Angsterkrankungen**

- Sozialphobie
- Panik
- Zwang

**Depression**

**Neu:**

- Generalisierte Angst
- Posttraumatische Belastungsstörung



GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline AG  
 Talstrasse 3-5  
 CH - 3053 Münchenbuchsee  
 Tel. +41(0)31 862 2111  
 Fax. +41(0)31 862 2200

Paroxetinum <sup>TM</sup>  
**Deroxat**

Echte Hilfe bei Depression  
 und Angsterkrankungen