

**Zeitschrift:** SuchtMagazin  
**Herausgeber:** Infodrog  
**Band:** 42 (2016)  
**Heft:** 4

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 29.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Alkoholkonsum erfolgreich reduzieren<sup>1</sup>

Ich habe  
wieder die  
Kontrolle!<sup>1</sup>



Selincro® - 1 Tablette an jedem Tag mit Risiko für Alkoholkonsum in Verbindung mit psychosozialer Unterstützung.<sup>2</sup>

Selincro® (Nalmefen). I: Zur Reduktion des Alkoholkonsums auf hohem Risiko-Niveau bei erwachsenen Patienten mit Alkoholabhängigkeit ohne körperliche Entzugerscheinungen und für die keine sofortige Entgiftung erforderlich ist. Durch geeignet qualifizierten Arzt mit Erfahrung in der Therapie von Alkoholabhängigen und nur in Verbindung mit kontinuierlicher psychosozialer Unterstützung mit Ziel der Therapieadhärenz und Reduktion des Alkoholkonsums. D: 18mg nach Bedarf möglichst 1-2 Stunden vor einem bevorstehendem Alkoholkonsum oder so schnell als möglich nach dem Konsum. Maximale Tagesdosis 1 Tablette/Tag. KI: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen Hilfsstoff, Opioid-Entzugssyndrom, -Abhängigkeit oder -Missbrauch. Schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörung. Alkoholentzugerscheinungen. Kinder und Jugendliche <18 Jahren. VM: In Notfallsituationen, falls Opiode erforderlich, möglicherweise Dosiserhöhung mit enger Überwachung bezüglich Atemdepression oder anderer Symptome erforderlich. Selincro ist nicht empfohlen bei Galaktose-Intoleranz, Lapp-Laktase-Mangel oder Glukose-Galaktose-Malabsorption. Vorsicht bei psychiatrischen Begleiterkrankungen, vormaligen Krampfanfällen, Nieren- oder Leberfunktionsstörungen, erhöhten Leberwerten. IA: Eventuell herabgesetzte Wirkung von Opiat-Agonisten (Hustenmittel, Antidiarrhoika und Opiat-Analgetika). Keine Interaktion mit Alkohol. SS/S: nicht empfohlen. UAW: *sehr häufig*: Schlaflosigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Nausea; *häufig*: verminderter Appetit, Schlafstörungen, Verwirrtheit, Ruhelosigkeit, Libidoverminderung (inklusive Libidoverlust), Schläfrigkeit, Zittern, Aufmerksamkeitsstörung, Parästhesien, Hypoästhesie, Tachykardie, Palpitationen, Erbrechen, Mundtrockenheit, Hyperhidrosis, Muskelspasmen, Müdigkeit, Asthenie, Unwohlsein, ungewöhnliches Empfinden, Gewichtsabnahme. UD: Beobachtung und symptomatische Behandlung. P: Filmtabletten zu 18mg: 14, 28 und 42 [B]. Kassenzulässig. Die vollständige Fachinformation ist unter [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch) publiziert. Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg, [www.lundbeck.ch](http://www.lundbeck.ch). 03042014FI 1. Van den Brink et al. J Psychopharmacol 2014. 28;8:733-744. 2. Fachinformation Arzneimittel-Kompodium der Schweiz, [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch)



Für weiterführende Informationen  
zum Thema Alkoholreduktion  
besuchen Sie: [www.redalc.ch](http://www.redalc.ch)

