

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen = Swiss forestry journal = Journal forestier suisse

**Herausgeber:** Schweizerischer Forstverein

**Band:** 99 (1948)

**Heft:** 1-2

  

**Artikel:** Versuch einer Schätzung der Produktionsfähigkeit des Schweizer Waldareals bei natürlicher Bestockung

**Autor:** Locher, A.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-766377>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 30.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

zugleich zur Qualitätsförderung der Stämme des Hauptbestandes beiträgt.

Obwohl der Jura nicht ein Lärchengebiet darstellt, vermag die Lärche auf manchen Standorten des erwähnten Gebietes Wertvolles zu leisten. Entscheidender für den Erfolg des Anbaues sind weniger ganz bestimmte Standortsfaktoren, als vielmehr eine hinreichende Begünstigung vor andern Holzarten und volle Kronenfreiheit von früher Jugend an.

### Résumé

Bien que le Jura ne constitue pas une région nettement propice à la culture du mélèze, cette essence est capable de produire un rendement de valeur dans bien des stations. Le succès ne dépend que dans une certaine mesure des facteurs de station; les soins culturaux qui favorisent le mélèze et lui assurent une avance sur les autres essences, jouent un rôle décisif.

Dans le Jura bâlois, le traitement sylvicole doit viser à fournir au mélèze une lumière suffisante en dégageant les cimes à tous les stades de la vie de l'arbre. Il doit protéger efficacement les jeunes peuplements contre le gibier et veiller au maintien d'un peuplement secondaire composé des essences spontanées qui assurent la pérennité de la fertilité du sol et contribuent à favoriser la qualité des tiges de l'étage dominant.

R. Karschon.

## Versuch einer Schätzung der Produktionsfähigkeit des Schweizer Waldareals bei natürlicher Bestockung<sup>1</sup>

Von Forstingenieur A. Locher, Fontainemelon.

### Einleitung

Bis zum vergangenen Krieg wurden jährlich einige 100 000 t Holz in die Schweiz eingeführt. Inzwischen hat sich jedoch die Lage auf dem internationalen Holzmarkt völlig verändert, wie besonders aus dem Bericht von Herrn Oberforstinspektor Dr. Heß über die FAO hervorgeht (SZF 2/47). Mit Holzimporten im Umfange der Vorkriegszeit wird kaum je mehr zu rechnen sein. Also muß in Zukunft, wie in den vergangenen Kriegsjahren, der Holzkonsum vorwiegend aus der eigenen Produktion gedeckt werden. Da aber eine Vergrößerung der vorhandenen Waldfläche zur Erzeugung der fehlenden Holzmenge nicht in Frage kommt, bleibt nur die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Wälder zu heben. Daß in bezug auf die Steigerung der Produktionskraft unserer Wälder noch Bedeutendes erreicht werden kann, zeigen einige bereits intensiv nach den Grundsätzen des neuzeitlichen Waldbaues und den heutigen Einrichtungsmethoden bewirtschaftete Wälder. Um dabei nicht nur zeitlich beschränkte Leistungssteigerungen zu bewirken, sondern den *nachhaltig* höchsten Wertzuwachs zu

<sup>1</sup>Nach einer im Jahre 1946 an der ETH ausgeführten Semesterarbeit im Waldbau.

erhalten, müssen die Lehren der Pflanzensoziologie weitgehend beachtet werden. Die Umwandlung der standortswidrigen Fichtenforste stellt daher zurzeit eine wesentliche forstliche Aufgabe dar.

Dadurch findet aber in Zukunft eine starke und wirtschaftlich bedeutende Verschiebung des Anteils der produzierten Holzarten statt. Andererseits können im Wirtschaftswald innerhalb gewisser Grenzen Veränderungen der natürlichen Holzartenzusammensetzung stattfinden, ohne die Nachhaltigkeit zu gefährden. Die Entscheidung, wieweit es wirtschaftlich und vom Standpunkt der Eigenversorgung wünschbar ist, von der naturgemäßen Holzartenkombination abzuweichen, setzt eine ausführliche Kenntnis des Vorrates und des nutzbaren Zuwachses bei naturgemäßer Bestockung und intensiver Wirtschaft voraus.

In diesem Bereich vermag jedoch die Forststatistik zurzeit nur ungenügend Auskunft zu geben. Daher wird in dieser Arbeit versucht, den Vorrat, den Zuwachs, die Nutzungen und Sortimente des Schweizer Waldes bei natürlicher Bestockung zu schätzen.

Der nur schätzungsmäßige Charakter der Untersuchung ist durch das Fehlen der wesentlichen Voraussetzungen für eine genaue Berechnung bedingt.

### I. Die Grundlagen

Als Grundlagen dienten :

- die nach Kantonen ausgeschiedene Waldfläche der Schweiz;
- die « Vegetationskarte der Schweiz » im Maßstab 1:200 000 von Emil Schmid;
- an der ETH gehaltene Vorlesungen über Waldbau, Forsteinrichtung und Forstpolitik, sowie verschiedene Publikationen;
- mündliche Ausführungen, wofür ich besonders den Herren Prof. Dr. Leibundgut, Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Schmid und Dr. Etter zu Dank verpflichtet bin.

Die Angaben über die totale Waldfläche von 1 025 540 ha stammen aus dem Forstkalender 1945. Der geringe Rückgang der Fläche um ungefähr 3000 ha in der Zwischenzeit fällt nicht ins Gewicht, zumal auch die vorgesehenen Ersatzaufforstungen einen Ausgleich schaffen werden. Die Verwendung der gesamten Waldfläche als Grundlage der Schätzung würde zu hohe Resultate ergeben, da darin sowohl landwirtschaftlich benützter wie unproduktiver Boden enthalten ist. Eine genaue Ausscheidung in die verschiedenen Produktionskategorien ist jedoch nur für die öffentlichen Waldungen vorhanden. Daher wurde vorerst, um die Berechnung klar und einfach zu gestalten, die totale Waldfläche kantonsweise zur Ausscheidung von 7 Waldzonen verwendet. Erst nachher erfolgten Abzüge für unproduktiven Boden. Der zurzeit landwirtschaftlich benutzte Waldboden wurde mitberücksichtigt, da er nach Gesetz bestimmt ist, der Holzproduktion zu dienen.

Wertvolle Dienste leistete die « Vegetationskarte der Schweiz », bearbeitet von Emil Schmid. Sie ist ein Kurvenkartenwerk in 4 Blättern im Maßstab 1:200 000, worin in verschiedenen Farbtönen die Vegetationsgürtel im Sinne der pflanzengeographisch-historischen Richtung von Prof. E. Schmid aufgetragen sind. Da bis heute erst zwei Blätter, die Nummern 2 und 4 (NE- und SE-Schweiz), herausgegeben wurden, bin ich Herrn Prof. Schmid besonders dankbar, daß er es mir ermöglichte, an Hand der nahezu fertigen Grundlagen der zwei andern Blätter die Arbeit zu beenden. Obwohl die Karte inhaltlich in einzelnen Teilen von den Ansichten der forstlichen Pflanzensoziologie, wie sie an der ETH gelehrt wird (Schule Zürich-Montpellier), abweicht, eignet sie sich durch ihre klare, einfache Darstellung doch vorzüglich für diese Untersuchung mit vorwiegend pflanzensoziologisch-geographischem Charakter. Auf die genaue Verwendung der Karte und die einzelnen Abweichungen wird im nächsten Abschnitt näher eingegangen.

## II. Der Berechnungsvorgang

### 1. Die Ausscheidung der Waldfläche auf 7 Zonen

Zunächst wurde die totale Waldfläche in Anlehnung an die Waldgürteleinteilung der Vegetationskarte in 7 Teilflächen eingeteilt, die wir aus praktischen Gründen kurz « Waldzonen » nennen wollen.

Die « Waldzonen » unterscheiden sich von der Waldgürteleinteilung der Vegetationskarte in erster Linie durch die Grenzverschiebung zwischen Buchen-Tannen-Wald und Eichen-Laubmisch-Wald und durch die Vereinfachung der Bezeichnungen. Nach der Vegetationskarte wird ein großer Teil des Mittellandes noch zum Buchen-Tannen-Waldgürtel gezählt, während nach Untersuchungen von E t t e r das Areal des Eichen-Hainbuchen-Waldes viel weiter gegen die Voralpen hin vorstößt. Danach verläuft die Grenze zwischen beiden Gebieten, wie sie der vorliegenden Untersuchung als Grundlage diente, ungefähr von Rorschach über S-Winterthur - N-Rapperswil - Uznach - (Fagetum-Exklave Pfannenstiel) - Lachen - Uetliberg - Zug - N-Lindenberg - Sursee - Bern - Fribourg - Lausanne nach Montreux. Die Jura-Grenze wurde noch nicht genau festgelegt, sie dürfte aber nach E t t e r dem SE-Hang des Juras entlang auf ca. 700 m Höhe anzunehmen sein, mit einer größeren Quer-ceto-Carpinetum-Exklave im Delsberger Becken.

Die Verwendung der uns sonst vertrauten systematischen Begriffe der Schule Zürich-Montpellier würde die Übersicht der Berechnung erschweren, ohne wesentlich genauere Werte zu liefern.

In der folgenden Darstellung wird der für diese Untersuchung verwendete Begriff der « Waldzone » durch Vergleich mit der Systematik der Auffassung Zürich-Montpellier und der Waldgürteleinteilung der Vegetationskarte klargelegt<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Die Angabe der Assoziationen ist nicht vollständig.

Waldzone	Syst. Begriffe Zürich-Montpellier	Waldgürteleinteilung der Vegetationskarte
Eichen-Laubmischwald Eichen-Birkenwald	Verband Fraxino - Carpinion	Eichen-, Linden-, Ahorn-, Laubmischwald-Gürtel mit Grenzverschiebung nach Beschreibung S. 57
	Verband Quercionrobori sessiliflorae	Quercus - Robur/Calluna-Gürtel ohne Kastanienwald
Kastanienwald	Assoz. Querceto - Betuletum ?	Kastanienwald des Quercus - Robur/Calluna-Gürtel
Buchen - Tannenwald	Verband Fagion	Buchen-Tannen-Gürtel mit Grenzverschiebung nach Beschreibung Seite 57
Fichtenwald	U'Verband Abieto-Piceion Assoz. Piceetum montanum Piceetum transalpinum U'Verband Rhod.-Vaccinon Assoz. Piceetum subalpinum Listera cordata - Hylocomium umbratum	
Arven-Bergföhren-Lärchenwald	Verband Mugeto - Ericion Assoz. Mugeto - Ericetum Mugeto - Rhodoretum hirsuti U'Verband Rhodoreto-Vaccinon Assoz. Rhodoreto-Vaccinietum	Lärchen-Arven-Gürtel
Föhrenwald	Verband Pinion silvestris Assoz. Cariceto humilis-Pinetum Ericeto - Pinetum Moliniето litoralis - Pinetum Pyroleto - Pinetum Pionier - Föhrenwälder	Pulsatilla - Waldsteppen-Gürtel

Zur Begründung der Bildung einer besondern Kastanienwaldzone sei angeführt, daß vermutlich die starke Ausdehnung der Edelkastanie im Kanton Tessin anthropogen bedingt ist. Doch ist sie jedenfalls standortsgemäß und wird auch in Zukunft ihren Platz als Fruchtbaum und ertragreiche Holzart behaupten. Eine besondere Kastanienzone wurde auch gebildet, um die Holzartenberechnung zu erleichtern.

Nach der Festlegung der 7 Waldzonen konnte an Hand der Vegetationskarte der prozentuale Anteil der Waldfläche eines jeden Kantons an den einzelnen Zonen geschätzt werden. Durch Verrechnung mit der Fläche habe ich alsdann den flächenmäßigen Anteil kantonsweise und durch Summierung die Ausdehnung jeder Waldzone in der Schweiz erhalten.

Die Berechnung nach Kantonen ist in Tabelle 1 durchgeführt. Für das Waldgebiet der Schweiz weisen die einzelnen Zonen folgende Flächen auf :

Waldzonen	Totale Waldfläche		Unproduktiv		Produktiv	
	%	ha	%*	ha	%*	ha
Eichen-Laubmischwald . .	22,5	231 162	1	2 162	99	229 000
Eichen-Birkenwald . . .	1,2	11,813	3	313	97	11 500
Kastanienwald . . . . .	1,5	16 406	5	806	95	15 600
Buchen-Tannenwald . . .	35,2	361 290	5	18 590	95	342 700
Fichtenwald . . . . .	19,7	200 306	20	40 106	80	160 200
Arven-Bergföhren-Lärchen- wald . . . . .	14,7	150 125	30	50 125	70	100 000
Föhrenwald . . . . .	5,2	54 438	8	4 438	92	50 000
	100	1 025 540	12	116 540	88	909 000

\* Prozente auf-, bzw. abgerundet.

Von der totalen Waldfläche wurden zonenweise, in Anlehnung an das Verhältnis in den öffentlichen Waldungen, 1 bis 30 % als unproduktiv abgezogen. Der auf diese Weise berechnete produktive Waldboden von 909 000 ha oder 88 % der Totalfläche dürfte der Wirklichkeit bei guter Erschließung und intensiver Bewirtschaftung der Wälder annähernd entsprechen.

### 2. Schätzung des optimalen Holzvorrates

Nach der Aufteilung der Fläche auf die Waldzonen wurde durch Vervielfachung mit dem gutachtlich angenommenen optimalen mittleren Hektarevorrat jeder Zone der anzustrebende stehende Vorrat berechnet. Die Ansetzung der verschiedenen Vorratswerte pro Hektar erfolgte soweit möglich nach Maßgabe pflanzensoziologisch typischer und nach modernen Grundsätzen ideal aufgebauter Wälder. Wo es anging, wurde



**Flächenausscheidung nach Waldzonen**

*Tabelle 1*

Kanton	Totale Waldfläche		Eichen-Laub- mischwald		Eichen- Birkenwald		Kastanien- wald		Buchen- Tannenwald		Fichtenwald		Arven- Bergföhren- Laurehenwald		Föhrenwald	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Zürich	47 696	75,0	35 772	1,0	477				9 539	20	37 860	20	14 197	4,0	1 908	4,0
Bern	189 298	20,0	37 860					94 649	50	8 363	23	727	14 197	2,5	4 732	2,5
Luzern	36 362	5,0	1 818					25 454	70	5 885	40	2 942	2,0	1 471	10,0	1 471
Uri	14 712	5,0	736					3 678	25	9 260	40	2 315	20,0	1 157	5,0	1 157
Schwyz	23 149	5,0	1 157					9 260	40	7 561	40	7 562	10,0	420	2,5	420
Obwalden	16 803	2,5	420					2 717	45	3 056	45	340	5,0	340	5,0	340
Nidwalden	6 793	5,0	340					4 337	40	3 794	35	2 710	25,0	106	2,0	106
Glarus	10 841							2 909	55	15 116	45					
Zug	5 289	33,0	1 745					13 435	40							
Freiburg	33 589	15,0	5 038					11 942	40							
Solothurn	29 855	55,0	16 420													
Basel-Stadt	1 003	100,0	1 003													
Basel-Land	14 797	10,0	1 480													
Schaffhausen	12 350	65,0	8 027													
Appenzell A.-Rh.	5 700															
Appenzell I.-Rh.	3 980															
St. Gallen	49 271	10,0	4 927													
Graubünden	158 705	5,0	7 935													
Aargau	47 436	80,0	37 948													
Thurgau	19 098	50,0	9 549													
Tessin	82 029	10,0	8 203													
Vaud	89 640	43,0	38 545													
Wallis	98 894	5,0	4 945													
Neuchâtel	24 771	15,0	4 715													
Genève	2 445	100,0	2 445													
Lehrerrevier	168	80,0	134													
SBB	866															
<b>Total</b>	<b>1 025 540</b>	<b>22,5</b>	<b>231 162</b>	<b>1,2</b>	<b>11 813</b>	<b>1,5</b>	<b>16 406</b>	<b>35,2</b>	<b>361 290</b>	<b>19,7</b>	<b>200 306</b>	<b>14,7</b>	<b>150 125</b>	<b>5,2</b>	<b>54 438</b>	<b>5,2</b>

auch die Ertragstafel ( mit den nötigen Abzügen!) zu Vergleichszwecken herangezogen.

Die Vorräte beziehen sich auf Derbholz der Bäume mit über 16 cm Brusthöhendurchmesser. Es ergaben sich dabei folgende Vorratsverhältnisse :

Waldzonen	Produktive Waldfläche	Angenommener Vorrat pro ha	Gesamtvorrat der Zone	
	ha	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>
Eichen-Laubmischwald . . .	229 000	350	29,0	80 000 000
Eichen-Birkenwald . . . . .	11 500	200	0,8	2 300 000
Kastanienwald . . . . .	15 600	250	1,4	4 000 000
Buchen-Tannenwald . . . . .	342 700	350	43,7	120 000 000
Fichtenwald . . . . .	160 200	300	17,9	48 000 000
Arven-Bergföhren- Lärchenwald . . . . .	100 000	100	3,6	10 000 000
Föhrenwald . . . . .	50 000	200	3,6	10 000 000
Total	909 000	302	100,0	274 300 000

Im Vergleich mit den heutigen mittleren Vorräten pro Hektar mögen die angenommenen Werte hoch erscheinen. Bekanntlich vermögen aber bei den gegenwärtigen Vorratsverhältnissen große Teile unseres Waldareals nicht den dauernd höchstmöglichen Zuwachs zu leisten.

Daher dürften die angenommenen Vorräte bei den im allgemeinen nährstoffreichen Böden und dem weitgehend feuchten Klima eher bescheiden erscheinen. Dies trifft besonders für die fruchtbaren Gebiete des Mittellandes zu. Aber auch in der Buchen-Tannenwaldzone ist der Vorrat mit 350 m<sup>3</sup> nicht zu hoch gegriffen (Plenterwaldgebiet). In der Fichtenwaldzone wurde der Vorrat trotz der großen Massenleistung der Fichte in den Optimalgebieten nicht über 300 m<sup>3</sup> pro Hektar angenommen, da in dieser Zone auch die aufgelockerten Bestände der höhern Lagen einbezogen sind.

Der totale optimale Vorrat wurde auf 274 300 000 m<sup>3</sup> geschätzt.

Die Vorratsverteilung nach Holzarten, die wir durch Verrechnung mit dem Anteil jeder Art nach Prozenten erhalten, ergibt einen gesamten Vorrat von rund 60% oder über 155 Millionen m<sup>3</sup> Laubholz gegenüber 40% oder ungefähr 120 Millionen m<sup>3</sup> Nadelholz. Dabei weist die Buche mit 27% den größten Anteil auf. Fichte und Tanne ergeben zusammen 35%. Im einzelnen sind die verschiedenen Holzarten folgendermaßen vertreten:



	%	m <sup>3</sup>		%	m <sup>3</sup>
Fichte . . . . .	21,9	60 000 000	Buche . . . . .	27,0	74 000 000
Tanne . . . . .	13,2	36 000 000	Eiche . . . . .	10,6	29 100 000
Föhre . . . . .	3,8	10 500 000	Ahorn und Esche . . . . .	9,1	25 000 000
Bergföhre . . . . .	0,7	2 000 000	Hagebuche . . . . .	3,0	8 200 000
Lärche . . . . .	2,5	7 000 000	Katanie . . . . .	1,1	3 200 000
Arve . . . . .	1,1	3 000 000	Andere Laubhölzer . . . . .	6,0	16 500 000
<u>Nadelholz . . . . .</u>	<u>43,2</u>	<u>118 500 000</u>	<u>Laubholz . . . . .</u>	<u>56,8</u>	<u>155 800 000</u>

### 3. Schätzung des erreichbaren Zuwachses

In ähnlicher Weise wie die Festlegung des Vorrates pro Hektar erfolgte die Schätzung des Zuwachsprozentes für jede Waldzone. Sie wurde, wie aus der nächsten Zusammenstellung hervorgeht, zwischen 0,8 und 2,5 % angenommen. Auf dieser Grundlage wurde der mittlere Zuwachs pro Hektar und für die gesamte Fläche bestimmt.

Von der Überlegung ausgehend, daß es im Gebirge Waldungen gibt, die zwar noch produktionsfähig sind, infolge ungenügender Aufschließung aber in gewöhnlichen Zeiten nicht genutzt werden können, wurden in drei Zonen weitere Abzüge gemacht. So erhalten wir schließlich einen nutzbaren Jahreszuwachs von 5 600 000 m<sup>3</sup>, der sich wie folgt auf die einzelnen Zonen verteilt:

Waldzone	Zuwachs			Nutzung unwirtschaftlich m <sup>3</sup>	Nutzbarer Zuwachs m <sup>3</sup>
	%	pro ha m <sup>3</sup>	im gesamten m <sup>3</sup>		
Eichen-Laubmischwald . . . . .	2,5	8,75	2 000 000		2 000 000
Eichen-Birkenwald . . . . .	1,8	3,60	40 000		40 000
Kastanienwald . . . . .	1,8	4,50	70 000		70 000
Buchen-Tannenwald . . . . .	2,2	7,70	2 650 000	70 000	2 580 000
Fichtenwald . . . . .	1,8	5,40	860 000	110 000	750 000
Arven-Bergföhren-Lärchenwald . . . . .	0,8	0,80	80 000	20 000	60 000
Föhrenwald . . . . .	1,0	2,00	100 000		100 000
<b>Ganzer Zuwachs . . . . .</b>	<b>2,1</b>	<b>6,40</b>	<b>5 800 000</b>	<b>200 000</b>	<b>5 600 000</b>

Interessant sind der Anteil und die Menge der verschiedenen Holzarten, welche in den einzelnen Waldzonen produziert werden können. Tabelle 2 gibt darüber Auskunft. Im gesamten verteilt sich der optimale Zuwachs bei rein natürlicher Bestockung wie folgt auf die einzelnen Holzarten:

**Zuwachsschätzung nach Holzarten**

*Table 2*

Holzart	Eichen-Laubmischwald		Eichen-Birkenwald		Kastanienwald		Buchen-Tannenwald		Fichtenwald		Arven-Bergföhren-Lärchenwald		Föhrenwald		Total
	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	
Fichte . . . . .							10	258 000	100	750 000					1 008 000
Tanne . . . . .							30	774 000						80 000	774 000
Föhre . . . . .	2,5	50 000	20	8 000											138 000
Bergföhre . . . . .											20	12 000			12 000
Lärche . . . . .	2,5	50 000									50	30 000			80 000
Arve . . . . .											30	18 000			18 000
Nadelholz . . . . .	5	100 000	20	8 000			40	1 032 000	100	750 000	100	60 000	80	80 000	2 030 000
Buche . . . . .	10	200 000					55	1 419 000							1 619 000
Eiche . . . . .	35	700 000	40	16 000			4	103 200							716 000
Ahorn/Esche . . . . .	25	500 000													603 200
Hagebuche . . . . .	10	200 000													200 000
Kastanie . . . . .					80	56 000									56 000
Anderes Laubholz	15	300 000	40	16 000	20	14 000	1	25 800					20	20 000	375 800
Laubholz . . . . .	95	1 900 000	80	32 000	100	70 000	60	1 548 000					20	20 000	3 570 000
Total	100	2 000 000	100	40 000	100	70 000	100	2 580 000	100	750 000	100	60 000	100	100 000	5 600 000

	%	m <sup>3</sup>		%	m <sup>3</sup>
Fichte . . . . .	18,0	1 008 000	Buche . . . . .	28,9	1 619 000
Tanne . . . . .	13,8	774 000	Eiche . . . . .	12,8	716 000
Föhre . . . . .	2,5	138 000	Ahorn und Esche . . . . .	10,8	603 000
Bergföhre . . . . .	0,2	12 000	Hagebuche . . . . .	3,6	200 000
Lärche . . . . .	1,4	80 000	Kastanie . . . . .	1,0	56 000
Arve . . . . .	0,3	18 000	Andere Laubhölzer . . . . .	6,7	375 000
<b>Nadelholz . . . . .</b>	<b>36,2</b>	<b>2 030 000</b>	<b>Laubholz . . . . .</b>	<b>63,8</b>	<b>3 570 000</b>

#### 4. Die Sortimente

Im natürlich aufgebauten Wald, der sich, auf großen Flächen betrachtet, im Gleichgewichtszustand befinden sollte, dürfen wir die Nutzungen dem Zuwachs gleichsetzen. Nach der vorliegenden Berechnung ergibt sich daher eine jährliche Gesamtnutzung von 5 600 000 m<sup>3</sup>, wovon 3 600 000 m<sup>3</sup> auf Laubholz und 2 000 000 m<sup>3</sup> auf Nadelholz entfallen. Die Aufteilung in Sortimente wurde für jede Holzart in Tabelle 3 durchgeführt. Einfach war dabei die Schätzung des Nutzholzprozentages beim Nadelholz, das je nach Holzart zwischen 50 bis 70% angenommen wurde und einen Mittelwert von 68% aufweist. Schwieriger gestaltete sich die Ausscheidung dagegen beim Laubholz. Die meisten gut aus-

Tabelle 3: Sortimentsberechnung

Holzart	Ganze Nutzung		Nutzholz		Brennholz	
	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%
Fichte . . . . .	1 008 000	70	705 600	30	302 400	30
Tanne . . . . .	774 000	70	541 800	30	232 200	30
Föhre . . . . .	138 000	50	69 000	50	69 000	50
Bergföhre . . . . .	12 000	50	6 000	50	6 000	50
Lärche . . . . .	80 000	70	56 000	30	24 000	30
Arve . . . . .	18 000	60	10 800	40	7 200	40
<b>Nadelholz . . . . .</b>	<b>2 030 000</b>	<b>68</b>	<b>1 389 200</b>	<b>32</b>	<b>640 800</b>	<b>32</b>
Buche . . . . .	1 619 000	45	728 550	55	890 450	55
Eiche . . . . .	716 000	45	322 200	55	393 800	55
Ahorn und Esche . . . . .	603 200	50	301 600	50	301 600	50
Hagebuche . . . . .	200 000	45	90 000	55	110 000	55
Kastanie . . . . .	56 000	40	22 400	60	33 600	60
Andere Laubhölzer . . . . .	375 800	45	169 110	55	206 690	55
<b>Laubholz . . . . .</b>	<b>3 570 000</b>	<b>46</b>	<b>1 633 860</b>	<b>54</b>	<b>1 936 140</b>	<b>54</b>
<b>Total</b>	<b>5 600 000</b>	<b>54</b>	<b>3 023 060</b>	<b>46</b>	<b>2 576 940</b>	<b>46</b>

geschiedenen Nutzungen aus den heutigen Laubholzbeständen weisen selten mehr als 20% Nutzholz auf. Einzelne Wälder und die seit geraumer Zeit begonnenen Untersuchungen berechtigen jedoch zur Annahme, daß durch eine zielstrebige Durchführung des Auslese- und Veredlungsbetriebes nach Schädelin der Nutzholzanteil bedeutend gesteigert werden kann. Außerdem dürfte sich durch sorgfältigere Sortimentbildung der Nutzholzanteil noch stark verbessern. Unter den angeführten Voraussetzungen ist daher zu erwarten, daß Nutzholzansätze von 40 bis 50% durchaus möglich sein werden.

Für die gesamte Holzproduktion der Schweiz wurde mit diesen Grundlagen ein Anteil von rund 55% Nutzholz gegenüber 45% Brennholz errechnet, wobei anzunehmen ist, daß sich die Begriffe «Nutzholz» und «Brennholz» im Laufe der Zeit entscheidend ändern werden.

### III. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Holzproduktion bei naturgemäßer Bestockung

#### 1. Vergleich der Holzproduktion und des heutigen Verbrauchs

Einen Hinweis auf die mutmaßlichen Auswirkungen der Produktion bei ausschließlich naturgemäßer Bestockung gibt der Vergleich mit den gegenwärtigen Verbrauchsverhältnissen. Als Vergleichsbasen wurden die Jahre 1938 und 1942, teilweise auch 1945 gewählt. Der Holzverbrauch im Jahr 1938 dürfte mehr oder weniger normal sein, während jener von 1942 ein Höchstmaß darstellt, wobei Holz aber auch andere, damals fehlende Rohstoffe zu ersetzen hatte. Die verwendeten Angaben sind der eidg. Forststatistik entnommen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß im angeführten Holzverbrauch die Einfuhr an Zellulose, die jährlich noch mindestens 30 000 Tonnen beträgt, was ungefähr 140 000 m<sup>3</sup> Holz ausmacht, nicht inbegriffen ist.

Nutzung und Verbrauch der erwähnten Vergleichsbasen weisen folgende Größen auf:

	1938			1942			Produktion bei Naturbestockung	
	Nutzung		Verbrauch m <sup>3</sup>	Nutzung		Verbrauch m <sup>3</sup>	pro ha m <sup>3</sup>	Total m <sup>3</sup>
	pro ha m <sup>3</sup>	Total m <sup>3</sup>		pro ha m <sup>3</sup>	Total m <sup>3</sup>			
Nutzholz .	1,7	1 530 000	1 790 000	2,6	2 330 000	2 495 000	3,3	3 023 000
Brennholz .	1,9	1 695 000	1 915 000	3,3	2 950 000	2 970 000	2,8	2 577 000
Total	3,6	3 225 000	3 705 000	5,9	5 280 000	5 465 000	6,1	5 600 000
Mehreinfuhr		480 000			185 000			

Der angestellte Vergleich zeigt, daß die mögliche jährliche Holzproduktion unseres Waldareals bei naturgemäßer Bestockung und den weiter vorn dargestellten Vorratsverhältnissen ungefähr dem Höchstverbrauch an Holz im Jahre 1942 entspricht. Wesentlich ist indessen die Zusammensetzung der Nutzung nach Holzarten und Sortimenten.

Gegenwärtig setzt sich die Nutzung aus ungefähr 70% Nadelholz und nur 30% Laubholz zusammen. Bei der Mehreinfuhr lag der Nadelholzanteil im allgemeinen nur wenig über 50%. Demnach betrug der gesamte Nadelholzverbrauch im Jahre 1938 ungefähr 2 500 000 m<sup>3</sup> und 1942 annähernd 3 800 000 m<sup>3</sup>. Dagegen ergab die Schätzung des Nadelholzanteils bei Naturbestockung 36% oder 2 030 000 m<sup>3</sup>. Der Laubholzverbrauch machte 1938 1 205 000 m<sup>3</sup> und 1942 ungefähr 1 660 000 m<sup>3</sup> aus, wogegen bei Naturbestockung rund 64% oder 3 570 000 m<sup>3</sup> anfallen würden.

Der Nutzholzkonsum betrug 1938 1 790 000 m<sup>3</sup> oder 48% des ganzen Holzverbrauchs und 1942 2 495 000 m<sup>3</sup> oder 46%. Die Schätzung des Nutzholzanteils bei Naturbestockung ergab 54% der ganzen Nutzung oder rund 3 000 000 m<sup>3</sup>.

Zurzeit entfallen aber fast 90% des Nutzholzes auf Nadelholz, was für das Jahr 1938 rund 1 600 000 m<sup>3</sup> und für das Jahr 1942 2 245 000 m<sup>3</sup> ausmachte. Bei naturgemäßer Bestockung würden jedoch nur 1 400 000 Kubikmeter oder 46% des Nutzholzes auf Nadelholz entfallen, was also im Vergleich zum Verbrauch von 1938 eine Mindererzeugung von rund 200 000 m<sup>3</sup> und zu jenem von 1942 eine solche von 850 000 m<sup>3</sup> bedeuten müßte.

Der Laubnutzholzkonsum betrug 1938 180 000 m<sup>3</sup>, 1942 250 000 m<sup>3</sup>, wogegen bei natürlicher Bestockung jährlich 1 600 000 m<sup>3</sup> produziert würden oder mehr als 1 300 000 m<sup>3</sup> über den Bedarf.

Der Brennholzbedarf stieg von 1 915 000 m<sup>3</sup> oder 52% des Holzverbrauchs im Jahre 1938 auf 2 970 000 m<sup>3</sup> oder 54% des totalen Verbrauchs 1942 und auf 3 280 000 m<sup>3</sup> oder 61% im Jahr 1945. Bei Naturbestockung würden jährlich 2 600 000 m<sup>3</sup> oder 46% Brennholz anfallen, wovon annähernd 2 000 000 m<sup>3</sup> auf hochwertiges Laubbrennholz und nur zirka 650 000 m<sup>3</sup> auf Nadelbrennholz entfallen. In bezug auf 1938 ergibt sich dabei ein Brennholzüberschuß von fast 700 000 m<sup>3</sup>, während zum Verbrauch von 1945 rund 700 000 m<sup>3</sup> fehlen würden (vorausgesetzt, daß kein Nutzholz zu Brenn Zwecken aufgearbeitet würde).

Aufschlußreich wäre es, einen Vergleich über die Produktionsmöglichkeiten und den gegenwärtigen Verbrauch der einzelnen Holzarten anzustellen, was zurzeit infolge mangelnder Verbrauchsangaben jedoch unmöglich ist.

## 2. Folgerungen

Die starke Erhöhung des Laubholzanteils bei rein naturgemäßer Bestockung würde, trotz der bedeutenden Vergrößerung der Holzproduktion, einen Mangel an Nadelnutzholz hervorrufen. Bezogen auf den Nadelnutzholzverbrauch von 1938 beträgt er ungefähr 200 000 m<sup>3</sup> und im Vergleich zu 1942 850 000 m<sup>3</sup>. Da auch in Zukunft die Nachfrage nach Nadelnutzholz kaum zurückgehen wird, erscheint die Erhaltung eines Nadelholzanteiles über das rein naturgemäße Verbreitungsgebiet hinaus vom wirtschaftlichen Standpunkt aus notwendig.

Wenn wir nun den Nadelholzanteil sowohl in der Laubmischwald- als auch in der Buchen-Tannenwaldzone um je 10% erhöhen, ergibt dies eine jährliche Produktionsvermehrung von zirka 300 000 m<sup>3</sup> Nadelnutzholz. Eine Erhöhung um je 20% in den erwähnten zwei Zonen vermehrt die Nadelnutzholzproduktion um 600 000 m<sup>3</sup>. Im letzten Fall würde der Nadelholzanteil in der Laubmischwaldzone von 5 auf 25% und in der Buchen-Tannenwaldzone von 40 auf 60% ansteigen. Diese Abweichung von der natürlichen Holzartenkombination würde voraussichtlich vollständig genügen, um die Versorgung mit Nadelholz sicherzustellen und standörtlich noch tragbar sein. Der Anfall an Laubbrennholz würde dabei um etwa 350 000 m<sup>3</sup> geringer, jener an Nadelholz um 200 000 m<sup>3</sup> größer. Auf diese Weise dürfte bei geeigneter Sortierung der anfallenden rund 850 000 m<sup>3</sup> Nadelbrennholz auch die Nachfrage nach Zelluloseholz zu befriedigen sein. Im übrigen ist die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, verschiedene Laubweichhölzer (Linde, Pappel), die bei Naturbestockung in größerer Menge anfallen, dazu in vermehrtem Maße zu verwenden. In Anbetracht des dauernd steigenden Zellulosebedarfs einerseits und der Tatsache, daß Laubbrennholz immer begehrt ist, dürfte derart der Brenn- und Papierholzabsatz im eigenen Lande weitgehend gesichert sein.

Daneben würden, trotz der Abweichung der Holzartenkombination von der naturgemäßen Bestockung zugunsten des Nadelholzes, jährlich noch mehr als 500 000 m<sup>3</sup> Laubnutzholz über den heutigen Eigenbedarf anfallen, welche für unser rohstoffarmes Land als erwünschter Exportartikel im Holzangelraum Europa leicht ausländische Devisen beschaffen könnten.

### Zusammenfassung

1. Die Schätzung der Produktionsfähigkeit des Schweizer Waldareals bei naturgemäßer Bestockung und geeigneten Vorratsverhältnissen weist mit einer jährlichen Leistung von mindestens 5 600 000 m<sup>3</sup> auf eine mögliche



Erhöhung des Holzertrages um 70 % im Vergleich zu den Nutzungen des « Normaljahres » 1938 hin. Die jährliche Holzproduktion würde genügen, um selbst der stark erhöhten Holznachfrage in Notzeiten nachzukommen.

2. Bei rein natürlicher Bestockung vermag jedoch die Nadelholzproduktion den Eigenbedarf an Nadelnutzholz nicht zu decken.
3. Ein Nadelholzanteil von etwa 25 % in der Laubmischwaldzone und von etwa 60 % in der Buchen-Tannenwaldzone ist jedenfalls standörtlich zu verantworten und genügt zur Eigenversorgung.

### Résumé

1. La capacité de production annuelle de l'aire boisée de la Suisse est estimée à au moins 5,6 millions de mètres cubes, à condition que la composition des forêts soit conforme aux conditions naturelles et que le volume puisse atteindre un niveau approprié. La production pourra donc être augmentée de 70 % par rapport à l'exploitation d'une année normale, par exemple 1938. La production annuelle de bois serait susceptible de couvrir même la demande accrue des années de disette.
2. Lorsqu'une végétation entièrement conforme à la station aura été établie partout, la production des forêts résineuses ne sera pas à même de couvrir les besoins de bois de service résineux.
3. Une proportion de résineux de 25 % dans la zone des forêts mixtes feuillues, et de 60 % dans la zone des forêts mélangées de sapin et hêtre, sera à même de répondre entièrement à la demande.

R. K.

MITTEILUNGEN · COMMUNICATIONS
-------------------------------

## Zum 25 jährigen Dozenten-Jubiläum von Prof. Dr. Hermann Knuchel

Die Studentenschaft der Abteilung für Forstwirtschaft feierte am 13. Dezember 1947 im Kreis des Akademischen Forstvereins, zahlreicher ehemaliger Schüler und der Dozenten das 25jährige Jubiläum von Herrn Prof. Dr. *Hermann Knuchel*. Der Vorstand der Forstabteilung, Herr Prof. *Ch. Gonet*, sprach im Namen der Dozenten, Herr Forstmeister Dr. *E. Krebs* für die ehemaligen Studierenden. Er überreichte Herrn Prof. *Hermann Knuchel* zum Zeichen der Dankbarkeit ein Geschenk.

Die Verdienste von Herrn Prof. Dr. *Hermann Knuchel* für unsere Forstschule und die ganze schweizerische Forstwirtschaft könnten nicht besser gewürdigt werden als durch die beiden erwähnten Ansprachen.