

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 11 (1933)
Heft: 1

Artikel: Hydnum (Pleurodon) pusillus Brot.
Autor: Benzoni, Carlo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-934567>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Coll' età il velo generale si lacera alla sommità apicale in lobi, e ne sorte il corpo fruttifero propriamente detto.

Cappello carnoso, emisferico-espanso, 9 a 18 cm di diametro, la cui cute è bianca farinosa, non striata e senza traccia di residui del velo generale; invecchiando diventa levigata, morbida come pelle di guanto ed assume leggera tinta paglierino-pallida; il margine è introflesso e, nell' età giovanile, fimbriato di candidi squamoli fioccolosi-farinosi che poi svaniscono.

Lamelle di colore bianco-acquoso, fittissime, ineguali, ventricose, posteriormente libere e agli spigoli quasi dentellate, ma senza cistidi.

Stipite solido, alto 9—14 cm, quasi fles-

suoso, bianco, all' apice attenuato e farinoso, all' ingiù più o meno ingrossato e ricoperto di squamoli fioccolosi concolore, svanescenti coll'età, alla base grosso 3,5—4 cm, bulboso e immerso radicato nella terra.

Anello tenue, bianco, tomentoso-farinoso tosto svanescente.

Volva dapprima bianca, poi gialliccia, tenace, persistente, quasi lassa, più o meno cuculliforme.

Carne compatta, bianca, di odore poco marcato e sapore gradevole. Commestibile.

Basidi 4 — sterimmati, claviformi, misuranti $36-42 \times 9-11 \mu$.

Spore ovoidi, sotto microscopio ialine, $9-11 \times 7-8 \mu$.

Hydnum (Pleurodon) pusillus Brot.

Di Carlo Benzoni, Chiasso.

Fungillo elegante, esile, assai raro. Nuovo nel Ticino. Trovai diversi esemplari in un bosco di Pedrinato (3 agosto 1931), su steli morti di *Pteris aquilina*.

Descrizione dei miei esemplari.

Cappello di consistenza submembranacea, esilissimo, tenace, largo 8—22 mm, al margine sottilissimo, irregolarmente e minutamente crenelato-dentato, di forma svariatissima: crateriforme, imbutiforme bi-tri-lobato, spatolato obliquo, spatolato-dimidiato, ligulato, ecc. (un esemplare imbutiforme profondamente trilobato e fornito internamente di un'appendice circolare concava, per la sua forma bizzarra ricorda un piccolo fiore di *Galanthus nivalis*; un altro ha l'abito di una piccolissima samara di *Acer campestre*); nell' età giovanile è bianchissimo, quasi sericeo, con tracce di screziature rossigne che lo rendono subzonato, invecchiando diventa levigato; le screziature

svaniscono ed acquista una tinta unicolore oroleuca.

Aculei minutamente filiformi, lunghi circa 1—2 mm, appuntiti, molto fitti, decorrenti attenuati sul pedicello, anteriormente verso l'estremità periferica sono rari e quasi impercettibili (sub lente ben marcati), allo stato fresco bianchi, disseccati assumono un colore fulvo pallido.

Stipite (Pedicello) cortissimo, lungo 2 a 12 mm e 1—8 mm, grosso, centrale, eccentrico o laterale, concolore degli aculei.

Spore sotto microscopio ialine, subglobose con episporio granuloso, misurano $5 \times 4 \mu$ di diametro.

Una bellissima varietà gracilissima, tutta candida, spatolata-obovata, al margine setiforme cigliata, quasi sessile; pedicello lungo 2 mm; pileo lungo 13 mm. L'ho trovata nei pressi di Vico-Morcote su steli morti di *Osmunda regalis*.