

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 59 (1981)
Heft: 8

Artikel: Amanita eliae QuéL.
Autor: Wilhelm, Markus
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-937197>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

- *L. rickenii* ne figure plus dans le nouveau Michael Hennig (mais y était dans l'ancienne édition);
- dans la description de *L. luscina*, Moser renvoie au numéro 599 de Cetto, qui pourtant concerne *L. rickenii*.

Précisons encore les quelques données suivantes à propos du groupe *L. gilva*:

- Trois espèces sont en général considérées: *gilva*, *inversa* et *flaccida* (le plus souvent classées dans le genre *Clitocybe*);
- Moser signale les trois espèces, mais écrit *flaccida* en petits caractères et le place dans le genre *Clitocybe*;
- deux espèces, *gilva* et *inversa*, sont habituellement mentionnées dans la plupart des ouvrages; *L. flaccida* n'est souvent considéré que comme forme de vieillesse ou forme des feuillus;
- Hennig signale *L. flaccida*, *L. inversa* n'en étant qu'un synonyme.
- Singer mentionne deux *flaccida*; le premier est un véritable *Clitocybe*, le second n'est qu'un synonyme de *L. gilva* et ne correspond pas aux autres formes de *flaccida*;
- les Planches Suisses considèrent *L. inversa* et *L. flaccida* comme formes de vieillesse ou formes influencées par le milieu de *L. gilva*.

H. Baumgartner, Wettsteinallee 147, 4058 Bâle (Traduction: Jean Keller)

Amanita eliae Quél.

J'aimerais brièvement décrire un champignon que je récolte fréquemment mais qui est méconnu de bien des mycologues.

A. eliae est un champignon grêle, du moins dans nos latitudes. Il est souvent difficile à déterminer parce qu'il varie considérablement de couleurs. De plus, les caractéristiques typiques ne sont pas toujours présentes. Seul le stipe profondément enfoui dans le sol constitue un critère constant.

Chapeau: 3–7 cm, d'abord convexe, puis rapidement aplati. Surface recouverte des restes d'un voile fugace plus ou moins blanchâtres ou, parfois, totalement absents. La couleur est le plus souvent saumon à isabelle, à l'occasion aussi, jaunâtre à blanc. Marge en général striée.

Lames: comme pour la plupart des Amanites, souvent distinctement libres et blanches.

Pied: très long par rapport au diamètre du chapeau et blanc. Les $\frac{2}{3}$ sont enfouis dans le sol. En-dessus de l'anneau, il est chiné et blanc. L'anneau est fugace et faiblement strié ou non. La base est faiblement clavée et pourvue des restes fugaces du voile.

Chaire: Elle est blanche, douce et généralement sans odeur (parfois légère odeur de terre). La valeur gastronomique de cette espèce est inconnue.

Habitat: Je récolte ce champignon le plus souvent en Alsace (Sundgau), en divers endroits, mais le plus souvent isolé, jamais grégaire. Tous les indices font penser qu'il s'agit d'une espèce thermophile et on la trouve en lisière, dans les clairières, sur les plus exposés au soleil et dans les forêts de feuillus. Ceci est peut-être dû à son apparition précoce, puisqu'il vient déjà de mai à juin.

Confusions possibles: Il est possible de la confondre avec *Amanita citrina* et *A. gemmata*. *A. citrina* se distingue cependant par son odeur forte de pomme-de-terre et son apparition plutôt tardive. *A. gemmata* est plus imposant, non strié dans la jeunesse et avec des restes de voile sur le chapeau; la volve est plus distinctement marginée et le pied jamais aussi profondément enfoui. De plus, elle est souvent grégaire et vient en cercles.

Si l'on découvre donc une petite Amanite de couleurs particulières et qui casse facilement même si on la «dévisse» avec précaution, il peut s'agir d'une *A. eliae*.

Markus Wilhelm, Lettenweg 126, 4123 Allschwil (Übersetzung: Jean Keller)