

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie  
**Herausgeber:** Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde  
**Band:** 60 (1982)  
**Heft:** 9/10

**Artikel:** Geopyxis carbonaria (A. + S. ex Fr.) Sacc., Kohlenbecherling = Pézize des charbonnières  
**Autor:** Kobler, B.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-937248>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 15.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## **Geopyxis carbonaria (A. + S. ex Fr.) Sacc., Kohlenbecherling**

Fam.: *Humariaceae*

*Fruchtkörper:* regelmässig schüssel- bis napfförmig, 5–20 mm, mit oft im Substrat eingesenktem kleinen Stiel. Fruchtschicht ockerbraun bis rötlichbraun. Aussenseite gleichfarbig, Rand weisslich flockig gekerbt.

*Sporen:* elliptisch, glatt, hyalin, 12–15 × 6–8 µm.

*Standort:* Auf Brandstellen, einzeln bis gesellig, Mai bis Oktober.

B. Kobler

## **Geopyxis carbonaria (A. + S. ex Fr.) Sacc., Pézize des charbonnières**

Fam.: *Humariacées*

*Fructification:* régulièrement acétabulée ou en coupe, diamètre 5–20 mm, souvent munie d'un pied court enfoui dans le substrat. Surface hyméniale brun ocre à brun rougeâtre. Surface externe concolore, à marge crénelée de flocons blanchâtres.

*Spores:* elliptiques, lisses, hyalines, 12–15 × 6–8 µm.

*Habitat:* sur places à feu, isolée ou en groupe, de mai à octobre. (Trad.: F. Brunelli)

## **Geopyxis carbonaria (A. + S. ex Fr.) Sacc.**

Fam.: *Humariaceae*

*Ricettacolo:* da regolarmente ciatiforme fino a forma di scodella, 5–20 mm, sovente con un piccolo gambo immerso nel substrato. Imenoforo da bruno ocre a bruno rossiccio. Superficie esterna concolore, orlo con fiocchi biancastri-intagliato.

*Spore:* ellittiche, lisce, ialine, 12–15 × 6–8 µm.

*Habitat:* in luoghi bruciati, isolata o gregaria, da maggio a ottobre. (Trad.: E. Zenone)



*Geopyxis carbonaria* (A & S ex Fr.) Sacc., Kohlenbecherling  
Foto: F. Waldvogel, Uetikon a.S.