

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 63 (1985)
Heft: 12

Artikel: Hygrophorus russula (Schff. ex Fr.) Quél. Geflecktblättriger Purpurschneckling : Fam. Hygrophoraceae = Hygrophorus russula (Schff. ex Fr.) Quél., Hygrophore russule : Fam.: Hygrophoraceae = Hygrophorus russula (Schff. ex Fr.) Quél., Lardaiolo rosso : Fa...

Autor: Kobler, B.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-936906>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 14.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Hygrophorus russula (Schff. ex Fr.) Quél. **Geflecktblättriger Purpurschneckling** Fam. Hygrophoraceae

<i>Hut:</i>	6–14 cm Ø, fleischpurpur bis weinrosa, dunkler purpurrosa fleckig. Hutmitte mit feinen dunkleren Schüppchen. Rand lange eingerollt, oft wellig, weisslich gesäumt und leicht verfärbend. Feucht etwas klebrig, trocken glänzend.
<i>Lamellen:</i>	Dicklich, leicht entfernt, ausgebuchtet angewachsen bis leicht herablaufend, weiss, dann purpurrot fleckig.
<i>Stiel:</i>	Weisslich, schmutzig weinrötlich kleig überlaufen bis fleckig, derb und faserfleischig.
<i>Fleisch:</i>	Weiss, fest, fahlrötlich durchzogen, an Druckstellen etwas weinbräunlich anlaufend. Geschmack mild. Geruch süßlich bis schwach rettichartig.
<i>Sporenstaub:</i>	Weiss, Sporen kurzelliptisch, 6–8×4–6 µm.
<i>Standort:</i>	Auf Kalk, besonders bei Eichen, seltener bei Buchen, auf wärmeren Böden.
<i>Bemerkungen:</i>	Diese kräftige Art mit Tricholoma- oder Russula-Habitus wird oft mit <i>Hygrophorus erubescens</i> Fr. verwechselt, welcher aber graziler im Habitus erscheint, einen mehr oder weniger gelblich fleckenden Hut und gilbendes, bitteres Fleisch besitzt und im Nadelwald vorkommt.

B. Kobler

Hygrophorus russula (Schff. ex Fr.) Quél., **Hygrophore russule**

Fam.: Hygrophoraceae

<i>Chapeau:</i>	6–14 cm de diamètre, de couleur pourpre carné à rose vineux, avec des taches plus foncées rose pourpre. Disque orné de fines squames plus foncées. Marge longtemps enroulée, se décolorant légèrement, souvent ondulée, marginelle blanchâtre.
<i>Lames:</i>	Assez épaisses, relativement espacées, émarginées à légèrement décurrentes, blanches puis tachées de rouge pourpre.
<i>Pied:</i>	Blanchâtre, lavé d'une pruine rougeâtre vineux sale, voire taché par plages, robuste, à chair fibreuse.
<i>Chair:</i>	Blanche, ferme, lavée de rougeâtre terne, passant un peu au brunâtre vineux à la pression. Saveur douce. Odeur douceâtre à faiblement raphanoïde.
<i>Sporée:</i>	Blanche.
<i>Spores:</i>	Courtement ellipsoïdales, 6–8×4–6 µm.
<i>Habitat:</i>	Sur sol calcaire, surtout sous les chênes, plus rarement sous les hêtres, stations plutôt exposées et chaudes.
<i>Remarques:</i>	Cette robuste espèce à silhouette tricholomoïde ou russuloïde est souvent confondue avec <i>Hygrophorus erubescens</i> Fr. Cette dernière est d'aspect plus gracile (pas toujours! N. d. t.), son chapeau se tache plus ou moins de jaune (il est parfois presque entièrement jaune, par temps sec. N. d. t.), sa chair est amère et elle jaunit; de plus, <i>H. erubescens</i> vient sous conifères. (Trad.: F. Brunelli)

Hygrophorus russula (Schff. ex Fr.) Quél., **Lardaiolo rosso**

Fam. Hygrophoraceae

<i>Cappello:</i>	6–14 cm, da porpora carnicino a vinoso rosato, con macchie più scure rosa porpora. Al disco con fine squamette più scure. Orlo a lungo involuto, sovente ondulato, bordato di biancastro e con lieve viraggio. Umido un poco viscido, asciutto brillante.
<i>Lamelle:</i>	Spesse, poco spaziate, da uncinate adnate a leggermente decorrenti, bianche, poi si macchiano di rosso porpora.
<i>Gombo:</i>	Biancastro, con forfora rosso vinosa sporca o anche macchiato, sodo e fibroso.
<i>Carne:</i>	Bianca, soda, percorsa da fibrille rossiccie poco vistose, al tocco vira leggermente al brunastro vinoso. Sapore mite, odore da dolciastro a un poco rafanoide.
<i>Sporata:</i>	Bianca, spore brevemente ellittiche, 6–8×4–6 µm.
<i>Habitat:</i>	Su terreno caldo e calcareo, specialmente con querce, più raro con faggi.
<i>Osservazioni:</i>	Questa specie robusta, dal portamento simile a Tricholoma o a Russula, è spesso confusa con l' <i>Hygrophorus erubescens</i> Fr., il quale però ha portamente più gracile, con cappello che si macchia più o meno di giallo pallido, carne amara e cresce in boschi di conifere. (Trad.: E. Zenone)



Hygrophorus russula (Schiff. ex Fr.) Quél.
Aquarelle de Charles Poluzzi