

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 64 (1986)
Heft: 2

Artikel: Lycoperdon mammaeforme Pers., Flockenstäubling : Fam. Lycoperdaceae = Lycoperdon mammaeforme Pers., Lycoperdon séniforme : Fam.: Lycoperdaceae
Autor: Kobler, B.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-936916>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 26.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Lycoperdon mammaeforme Pers., Flockenstäubling

Fam. Lycoperdaceae

- Fruchtkörper:* Kreisel- bis birnförmig, 2–7 cm Ø, bisweilen undeutlich gestielt, von einem dicken Velum überwachsen, welches in groben Flocken abschülfert. Exoperidie mit sehr feinen, kurzen und brüchigen Stacheln besetzt. Endoperidie bräunlich, etwas glänzend. Der sterile basale Teil (Subgleba) ist bei Reife olivbraun bis braunviolett und gekammert. Capillitium ist dunkelbraun und mehr oder weniger brüchig, mit wenigen unregelmässigen Poren.
- Sporen:* Warzig, rundlich, 4,1–5,1 µm. Der Sporenstaub ist mit abgefallenen Sterigmen vermischt.
- Standort:* Auf Kalk oder Lössboden, vorwiegend in Laubwäldern, in warmen Lagen.
- Bemerkung:* Diese Art ist von andern Stäublingen durch die groben, dicken Velumflocken, die den Fruchtkörper umkleiden, gut zu unterscheiden. B. Kobler

Lycoperdon mammaeforme Pers., Lycoperdon séniforme

Fam.: Lycoperdaceae

- Fructification:* Diamètre 2–7 cm, en forme de sphère ou de poire, parfois vaguement stipitée, recouverte d'un voile abondant qui se desquame en flocons grossiers. Exopéridie décorée d'aiguillons très fins, courts et fragiles. Endopéridie brunâtre, un peu brillante. La subgléba — base stérile — est brun olive à brun violet à maturité, divisée en logettes. Capillitium brun foncé, plus ou moins fragile, avec des pores rares et irréguliers.
- Spores:* Presque sphériques, verruqueuses, 4,1–5,1 µm. On trouve, dans une sporée, des stérigmates brisés.
- Habitat:* Surtout dans les bois de feuillus, sur des stations ensoleillées, sur sol calcaire ou loessique.
- Remarques:* Espèce facile à séparer des autres Lycoperdons par les flocons grossiers et épais du velum qui habillent toute la fructification. (trad.: F. Brunelli)

Lycoperdon mammaeforme Pers.

Fam. Lycoperdaceae

- Carpoforo:* 2–7 cm di diametro, a forma di trottola o di pera rovesciata, talvolta con gambo indistinto ricoperto da un spesso velo che si rompe in fiocchi grossolani. L'esoperidio ha aculei corti e molto fini e fragili. L'endoperidio è brunastro e un poco brillante. La parte basale sterile (subgleba) è cavernosa e a maturità va dal bruno oliva al bruno violetto. Capillizio bruno scuro, più o meno fragile, con pochi pori irregolari.
- Spore:* Verrucose e sferiche, 4,1–5,1 µm. Nella sporata vi sono frammenti di sterigmi.
- Habitat:* Preferisce i boschi di latifoglie termofile, su terreno calcareo.
- Osservazioni:* Questa specie si distingue bene dalle altre vescie per le plachette di velo che rivestono il carpoforo. (trad.: E. Zenone)

Foto: Fred Waldvogel, Uetikon am See

