

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie

Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde

Band: 68 (1990)

Heft: 12

Artikel: Lepiota fulvella Rea

Autor: Patanè, Franco

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-936428>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Lepiota fulvella Rea

<i>Cappello:</i>	Da piuttosto piccolo a mediano, fino a 3,5(5) cm, leggermente umbonato, dapprima quasi liscio, ma presto alquando fibrilloso, squamuloso, con squame appressedate, colore fulvo fino a brunastro camoscio, pallido giallastro verso l'orlo.
<i>Lamelle:</i>	Biancastre, taglio talvolta leggermente orlato dal colore del cappello.
<i>Gumbo:</i>	Circa 4–5,5 cm per 4–6 mm, leggermente tomentoso fino a fioccoso, sotto l'anello fugace più pallido dell'orlo del cappello.
<i>Microscopia:</i>	Spore a forma di proettile, 8–9×3,5 µm, cistidi ovati claviformi, circa 19–20×5–10 µm, contenuto ialino o leggermente colorato.
<i>Habitat:</i>	Boschi umiferi e umidi, sovente gregaria, ma non comune.
<i>Note:</i>	Spesso viene scambiata con <i>Lepiota castanea</i> Quél. che è di taglio più piccolo e colore castagno, oppure baio fulvo, più pallida all'orlo, al centro con minute squamule granulose e pellicola presto dissociata, lamelle biancastre come <i>Lepiota fulvella</i> , ma che presto diventano più o meno fulve come il cappello, il gambo coll'età e lo stropicciamento; anello sovente rudimentale, gambo attenuato verso l'alto, con base bianca subbulbosa, squamette fulvo brunastro fino alla zona pseudoanulare. Habitat in certi posti dei boschi di latifoglie e conifere. Spore a forma di proettile da 9–13×3,7–5 µm.

Foto, testo, schizzi: Franco Patanè, Im Baurenacker 19, 8902 Urdorf

Lepiota fulvella Rea

<i>Hut:</i>	Klein bis mittelgross, bis 3,5(5) cm, leicht gebuckelt, zuerst fast glatt, aber rasch etwas faserig-schuppig mit angedrückten Schuppen, fuchsig- bis gamsbraun, hellgelblich gegen den Rand.
<i>Lamellen:</i>	Weisslich, Schneide manchmal in der Hutfarbe gesäumt.
<i>Stiel:</i>	Etwa 4–5,5 cm lang, 4–6 mm breit, leicht filzig bis flockig, unter dem flüchtigen Ring heller als der Hutrund.
<i>Mikroskopie:</i>	Sporen projektilförmig, 8–9×3,5 µm, Zystiden eiförmig, breit keulig, etwa 19–20×5–10 µm, Inhalt hyalin oder leicht gefärbt.
<i>Standort:</i>	Feuchte Wälder, oft gesellig, aber nicht häufig.
<i>Bemerkungen:</i>	Diese Art wird gerne mit <i>Lepiota castanea</i> Quél. verwechselt, welche kleiner ist, kastanienbraun oder rotbraun-fuchsig, mit hellerem Rand, in der Hutmitte in kleinste körnige Schüppchen zerrissen. Die Lamellen sind weisslich wie bei <i>L. fulvella</i> , werden aber rasch mehr oder weniger fuchsig wie der Hut. Der Stiel besitzt im Alter einen körnig-stoppelartigen Überzug. Der Stiel hat oft eine undeutliche Ringzone, ist gegen oben verjüngt und mit einer fast knolligen weissen Basis und fuchsig brauen Schüppchen bis zur Ringzone versehen. Vorkommen im Laub- und Nadelwald. Die ebenfalls projektilförmigen Sporen messen aber 9–13×3,7–5 µm.


Foto, Text und Skizzen: Franco Patanè, Im Baurenacker 19, 8902 Urdorf

Übersetzung: B. Kobler

Lepiota fulvella Rea

<i>Chapeau:</i>	De taille petite à moyenne, jusqu'à 3,5(5) cm, faiblement mamelonné, d'abord presque lisse mais vite quelque peu fibrilleux-méchuleux, à mèches apprimées; brun roux à brun chamois, graduellement jaunâtre clair vers la marge.
<i>Lames:</i>	Blanchâtres, arête parfois bordée de la couleur du chapeau.





1 : Cheilocystiden/cheilocistidi/cheilocystides

2 : Epikutis/epicutis/épicutis

3 : Sporen/spore/spores $\times 1400$

4 : Basidien/basidi/basides

Pied:

Longueur 4—5,5 cm environ, diamètre 4—6 mm, un peu feutré à floconneux, plus clair que la marge du chapeau au-dessous de l'anneau fugace.

Microscopie:

Spores éperonnées, $8—9 \times 3,5 \mu\text{m}$; cystides ovoïdes, largement clavées, env. $19—20 \times 5—10 \mu\text{m}$, à contenu hyalin à légèrement coloré.

Habitat:

Dans les forêts humides, souvent grégaires, mais peu fréquents.

Remarques:

Cette espèce est souvent confondue avec *Lepiota castanea* Quél., espèce de plus petite taille, de couleur brun châtain ou brun rouge à rousse, à marge plus claire, à cuticule déchirée au disque en très petites méchules granuleuses. Les lames sont blanches comme celles de *L. fulvella*, mais elles deviennent rapidement ± rousses comme le chapeau. Avec l'âge, le pied s'orne d'un revêtement granuleux-méchuleux; il montre souvent une zone annulaire indistincte, il est atténué vers le haut, sa base est blanche et presque clavée, entre deux les squamules sont fauve brunâtre. On trouve cette espèce sous bois de feuillus et de résineux et ses spores sont aussi éperonnées, mais elles mesurent $9—13 \times 3,7—5 \mu\text{m}$.

Photo, texte et dessins: Franco Patanè, Im Baurenacker 19, 8902 Urdorf

Traduction:

F. Brunelli