

Zeitschrift: Wasser- und Energiewirtschaft = Cours d'eau et énergie
Herausgeber: Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband
Band: 47 (1955)
Heft: 5-7

Artikel: Niederschlag und Abfluss im Rhonegebiet oberhalb des Genfersees
Autor: Walser, E.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-921946>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Niederschlag und Abfluß im Rhonegebiet oberhalb des Genfersees

Von dipl. Ing. E. Walser, Chef der Sektion Hydrographie im Eidg. Amt für Wasserwirtschaft, Bern

DK 551.48

1. Einleitung

Die Rhone entwässert von ihren Quellen bis zur Mündung in den Genfersee ein Gebiet, das sich durch starke Gegensätze auszeichnet und hierdurch, wie auch durch seine Geschlossenheit, auf den Reisenden nachhaltige Eindrücke ausübt. Es ist ein Land eigener Prägung.

Man fährt durch weite Ebenen und sieht dieselben doch begrenzt durch wilde Felswände; der Hauptfluß durchströmt das Tal auf der Strecke zwischen Brig und dem Genfersee mit einem Gefälle, das streckenweise dasjenige der Aare im Mittelland oder des Rheins beim Durchbruch durch den Jura nicht übertrifft, das aber in Zwischenstrecken demjenigen der Linth, der Simme oder der unteren Maggia gleichkommt; mittelmäßig geneigten südlichen Seitentälern stehen nördliche von außerordentlicher Steilheit gegenüber (Tab. 1) [1]¹. In der Sonnenglut des Haupttales fällt einem die Vorstellung nicht leicht, sich in einem relativ stark vergletscherten Fluß-

¹ Die in [...] gesetzten Zahlen verweisen auf die Literaturangaben am Schluß des Aufsatzes.

gebiet zu befinden.² Bei solcher Gegensätzlichkeit ist es nicht verwunderlich, daß auch hinsichtlich der Niederschläge Extreme auftreten: die Niederschlagskarte der Schweiz [4] zeigt in, bzw. an unserem Gebiete die zwei Meßstellen mit der größten (Mönchsgrat 414 cm) und der kleinsten (Staldenried 53 cm) in der Schweiz gemessenen jährlichen Niederschlagsmenge, wobei die genannten zwei Punkte in der Luftlinie keine 40 km voneinander entfernt sind.

Horizontale und vertikale Gliederung unseres Gebietes legen eine Dreiteilung nahe: das östliche Gebiet bis Brig (O), das mittlere Gebiet zwischen Brig und Branson (M) und das westliche Gebiet zwischen Branson und

² Durchschnittliche Zahl der «heiteren» Tage pro Jahr seit 1940 in Sitten 92, in Genf 75, Basel 65, Zürich 42 und in Lugano 100; Vergletscherung des Rhonegebietes bis Genfersee 16,2 %, des Aaregebietes bis Thun 10,9 %, des Reußgebietes bis Luzern 5,0 %, des Linthgebietes bis zum Walensee 5,3 %, des Rheingebietes bis zum Bodensee 2,1 %, des Tessingebietes bis Bellinzona 1,1 % und des Inngebietes bis Martinsbruck 5,4 %, nach neuer Landeskarte [3].

Abb. 1 Rhonegebiet oberhalb des Genfersees. Übersichtskarte. Flußsystem und Hauptwasserscheiden. Teilgebiete O, M und W. Wassermeßstationen. Die mit Nummern bezeichneten Orte entsprechen den Streckengrenzen in Tabelle 1.




Tabelle 1 Vergleichende Übersicht über Gefällsverhältnisse

| Fluß | Hauptstrecke | | | Nebenflüsse | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|
| | Begrenzung | Länge km | mittleres Gefälle ‰ | Bezeichnung | Strecke | Länge km | mittleres Gefälle ‰ |
| Rhone | Gletsch(1)–Oberwald(2) | 3,4 | 112 | | | | |
| | Oberwald(2)–Naters(3) | 36,9 | 19,7 | Binna | Binn–Mündung | 6,9 | 61,0 |
| | | | | Massa | Gebidem–Mündung | 4,5 | 144 |
| | Naters(3)–Leuk(4) | 31,1 | 1,2 | Mattervispa | Kote 1500–Kote 800 | 20,9 | 33 |
| | Leuk(4)–Siders(5) | 6,6 | 11,1 | Lonza | Kote 1500–Kote 800 | 11,9 | 59 |
| | | | | Navisence | Kote 1500–Kote 600 | 13,9 | 65 |
| | | | | Lienne | Kote 1500–Kote 600 | 9,2 | 98 |
| | Siders(5)–Collonges(6) | 53,6 | 1,7 | Borgne | Kote 1500–Kote 600 | 17,7 | 51 |
| | | | | Morge | Kote 1500–Kote 600 | 7,4 | 121 |
| | Collonges(6)–St. Maurice(7) | 5,9 | 6,9 | Drance de Bagnes | Kote 1500–Kote 500 | 24,8 | 20 |
| St. Maurice(7)–Genfersee | 24,5 | 1,2 | Vièze | Kote 1500–Kote 500 | 15,5 | 32 | |
| | | | Grande Eau | Kote 1500–Kote 500 | 18,5 | 27 | |
| Rhein | Surrhein–Reichenau | 42,6 | 9,5 | Valserrhein–Glenner | Kote 1500–Kote 750 | 20,2 | 37 |
| | Reichenau–Kriesseren | 74,2 | 2,3 | Landquart | Kote 1500–Kote 600 | 32,4 | 28 |
| | Waldshut–Basel | 62,0 | 1,2 | | | | |
| Aare | Handegg–Meiringen | 17,5 | 45 | Simme | Lenk–Mündung | 48,1 | 12 |
| | Thun–Bern | 29,9 | 1,8 | | | | |
| | Olten–Felsenau | 55,4 | 1,3 | | | | |
| Reuß | Göschenen–Amsteg | 14,1 | 39 | Kärstelenbach | Kote 1500–Mündung | 12,3 | 80 |
| Linth | Durnagelbach–Walensee | 27,2 | 8,2 | | | | |
| Ticino | Airolo–Biasca | 34,0 | 23 | | | | |
| | Biasca–Riazzino | 32,2 | 3,1 | Moësa | Kote 1500–Kote 500 | 11,5 | 87 |
| Maggia | Fusio–Bignasco | 15,0 | 56 | Bavona | Kote 1500–San Carlo | 2,9 | 206 |
| | Bignasco–Langensee | 29,5 | 8,1 | | San Carlo–Bignasco | 11,0 | 42 |
| Inn | Celerina–S-chanf | 15,9 | 3,9 | Berninabach | Lago Nero–Pontresina | 13,0 | 36 |
| | S-chanf–Tarasp | 39,2 | 11,9 | Spöl | Ova del Fuorn–Zerne | 8,8 | 20 |
| | Tarasp–Martinsbruck | 20,9 | 7,3 | Schergenbach | Samnaun–Mündung | 11,5 | 71 |

Die in (...) gesetzten Zahlen entsprechen den Ortsbezeichnungen in Abb. 1

dem Genfersee (W), wobei wir beim letzteren die Grande Eau, welche Wasser aus dem Aaregebiet zugeleitet erhält, ausnehmen (Abb. 1 und 2).

2. Niederschlag

Unterlage für die nachfolgenden Angaben über die Niederschläge bildet zur Hauptsache das im Literaturverzeichnis unter [4] aufgeführte Werk. Damit gelten auch die einschränkenden Bemerkungen hinsichtlich der Genauigkeit, die der Verfasser jenes Werkes auf dessen Seiten 2 und 3 gemacht hat. Während wir bei einer früheren Arbeit über das Rheingebiet [5] annehmen konnten, daß die Unsicherheiten bei der Größe jenes Gebietes und der Zahl der in Frage kommenden Stationen




Abb. 2 Rhonegebiet oberhalb des Genfersees (ohne Grande Eau). Hypsographische Kurven für ganzes Gebiet und für Teilgebiete O, M und W gemäß Abb. 1.

Tabelle 2

Relative jährliche Niederschlagshöhen verschiedener, nach Meereshöhe abgestufter Zonen, der drei Teilgebiete gemäß Abb. 1, bestimmt mittels der Niederschlagskarte (4), bezogen auf das Mittel des Totalgebietes = 1,00

| Höhenzonen | Teilgebiete | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| | oberhalb Brig O | | | zwischen Brig und Branson M | | | zwischen Branson und dem Genfersee (ohne Grande Eau) W | | |
| | Fläche km ² | Anzahl Regenmeßstationen | Relative jährliche Niederschlagshöhe | Fläche km ² | Anzahl Regenmeßstationen | Relative jährliche Niederschlagshöhe | Fläche km ² | Anzahl Regenmeßstationen | Relative jährliche Niederschlagshöhe |
| über 3000 m | 162 | 3 | 1,84 | 452 | 6 | 1,70 | 107 | 1 | 1,61 |
| zwischen 3000 und 2400 m | 265 | 5 | 1,29 | 829 | 8 | 1,11 | 271 | 7 | 1,37 |
| zwischen 2400 und 1800 m | 232 | 3 | 0,89 | 724 | 5 | 0,76 | 360 | 10 | 1,06 |
| zwischen 1800 und 1200 m | 131 | 4 | 0,69 | 459 | 13 | 0,56 | 373 | 3 | 0,89 |
| zwischen 1200 und 900 m | 24 | 1 | 0,53 | 154 | 1 | 0,45 | 113 | 5 | 0,71 |
| zwischen 900 und 600 m | 11 | 1 | 0,46 | 145 | 4 | 0,41 | 79 | 1 | 0,64 |
| unter 600 m | 0 | — | — | 75 | 4 | 0,38 | 108 | 7 | 0,57 |
| Summe | 825 | 17 | | 2838 | 41 | | 1411 | 34 | |

nicht sehr ins Gewicht fallen, wagen wir diese Annahme im vorliegenden Fall nicht mehr zu treffen. Wir werden deshalb weder die Angaben über Niederschlagsmengen bestimmter Teilgebiete, noch die Abfließkoeffizienten (Abfluß in % des Niederschlages) ihrer absoluten Größe nach bringen. Die vorhandenen Unterlagen geben jedoch gleichwohl wertvolle Einsichten in die örtlichen Variationen der Niederschlagsmengen. Um diese trotzdem darstellen zu können, berechnen wir Relativwerte in bezug auf den durchschnittlichen Jahresniederschlag 1901–1940 des ganzen Gebietes, den wir gleich 1,0 setzen. In diesem Sinne wurde in Tabelle 2, deren Ergebnisse in Abb. 3 dargestellt sind, ein Vergleich zwischen Niederschlagsmengen in Funktion der Meereshöhe der drei Teilgebiete angestellt. Tabelle 2 enthält zugleich die flächenmäßige Aufteilung nach Höhenzonen (topographische Einzugsgebiete), also die Unterlagen für die hypsographischen Kurven in Abb. 2 [6].




Abb. 3 Rhonegebiet oberhalb des Genfersees (ohne Grande Eau). Relative jährliche Niederschlagshöhen verschiedener, nach Meereshöhe abgestufter Zonen der drei Teilgebiete O, M und W gemäß Abb. 1, Werte aus Tab. 2.

Die Abb. 3 zeigt zunächst die allgemein bekannte Zunahme der jährlichen Niederschlagsmengen mit der Meereshöhe. Es treten aber auch Unterschiede zwischen den drei Teilgebieten hervor: das westliche als niederschlagsreichstes, das mittlere im Gegensatz dazu mit Mengen, die zwischen 600 und 1800 m Meereshöhe nur 63 bis 64% derjenigen des westlichen Gebietes ausmachen. Das östliche Gebiet weist Niederschlagsmengen auf, die größer sind als diejenigen des mittleren, aber nicht die Werte des westlichen erreichen. In großen Höhen treten die Unterschiede zurück.

Die jahreszeitlichen Unterschiede (Abb. 4) sind, was die Niederschläge betrifft, bedeutend geringer als im Rheingebiet [5]. Während im Rheingebiet die Monate Juli und August gegen das Zweifache an Niederschlägen der Monate Januar und Februar erhalten, und zwar, mehr oder weniger in allen Höhenzonen, erhalten wir für die entsprechende Verhältniszahl im Rhonegebiet in Höhen unter 600 m 1,5, zwischen 600 und 1800 m 1,3; in Höhen oberhalb 1800 m ergeben die vorhandenen Unterlagen im Hochsommer weniger Niederschläge als in den beiden ersten Kalendermonaten, so daß dort auf eine Verhältniszahl von 0,7 zu schließen wäre. Außerdem ergeben die meisten Walliser Stationen große Niederschläge im Vorwinter.

3. Abfluß

Ein ganz anderes Bild als die jahreszeitliche Niederschlagsverteilung ergibt die entsprechende Verteilung des Abflusses (Abb. 4). In der Porte du Scex, wo das ganze betrachtete Gebiet entwässert wird, beträgt der Abfluß in

Tabelle 3

Abflüßmengen der Rhone in der Porte du Scex

Monatsmittel längerer Jahresreihen

| Jahresreihe | Im Mittel der Jahresreihe vorhandener nutzbarer Stauinhalt | Abflüßmengen, Monatsfrachten in % der Jahresfracht, für Einheitsmonate von 30,44 Tagen berechnet | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| 1914—34 | 28 Mio m ³ | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 4,1 | 10,5 | 17,6 | 19,9 | 17,3 | 10,9 | 5,6 | 3,8 | 3,0 |
| 1935—53 | 99 Mio m ³ | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 4,8 | 9,1 | 18,1 | 20,0 | 16,6 | 10,8 | 5,4 | 4,1 | 3,0 |




Abb. 4 Rhonegebiet oberhalb des Genfersees (ohne Grande Eau). Jahresreihe 1901—1940. Mittlerer Monatsniederschlag in Prozent des mittleren Jahresniederschlags. Arithmetische Mittel der Stationswerte, auf Einheitsmonate von $365,24 : 12 = 30,44$ Tagen umgerechnet, für die Höhenzonen: unter 600 m, 600—1800 m, über 1800 m sowie für die Station Furka-Galenhütten separat (2406 m). Abflüßmengen der Rhone in der Porte du Scex (abzüglich Grande Eau), Monatsdurchschnitte 1935—1953.

kommt. Diese Abflüßverschiebung und -konzentration auf die Sommermonate sucht man bekanntlich durch Erstellen künstlicher Seen, welche eine Aufbewahrung des Wassers in flüssigem Aggregatzustand und damit eine nochmalige Verschiebung des Abflusses auf den folgenden Winter erlauben, teilweise auszugleichen. Daß dies bis jetzt, im Verhältnis zum Ganzen gesehen, noch in kleinem Ausmaß geschieht, zeigt Tabelle 3.

Das Abschmelzen in den Sommermonaten erfolgt nicht gleichmäßig, sondern, da ja die Temperatur einen ausgesprochenen Tagesrhythmus aufweist, in täglichen Schwankungen. Dabei spielt auch die Sonnenstrahlung eine bedeutende Rolle. An Tagen mit bedecktem Himmel sind die Tagesschwankungen kleiner oder bleiben ganz aus (Abb. 5). An sonnigen Tagen jedoch treten sie an jedem Gletscherabflüß auf, pflanzen sich flüßabwärts fort, geben dem Tagesregime des Hauptflusses das

den Monaten Juli und August das 7,4fache desjenigen der Monate Januar und Februar. Diese Verhältniszahl wird noch größer, wenn man die weiter oben gelegenen Stationen betrachtet: für Sitten (Vergletscherung des Gebiets auf Grund der neuen Landeskarte $G = 21,4\%$) ergibt sich 11,0, für Brig ($G = 29,0\%$) 14,6; in den Seitentälern: Borgne in La Luette ($G = 25,0\%$) 14,6, Drance de Bagnes in Châble ($G = 31,6\%$) 22,5, Vispa in Visp ($G = 32,7\%$) 21,4, Saaser Vispa in Zermeigern ($G = 41,5\%$) 45,5 und Massa in Massaboden ($G = 67,6\%$) 130. Dieser große Unterschied zwischen Niederschlags- und Abflüßregime weist darauf hin, daß der Abflüßvorgang neben dem Niederschlag durch einen weiteren Faktor entscheidend beeinflusst wird; bekanntlich ist dies die Temperatur. Weil bei einer Temperatur unter null Grad das Wasser in den festen Aggregatzustand übergeht und damit sein Fließvermögen verliert, bleibt den Winter über ein Großteil des Niederschlags liegen. Einem ungeheuren Reservoir von einem Inhalt der Größenordnung 2000 Mio m³ ähnlich, speichert unser Gebiet im Winter Wasser in fester Form auf, das im Sommer, sobald es die Wärmezufuhr erlaubt, zum Abflüß

Schmelzabflüß und Meteorologie

Oberes Rhonegebiet 6.-12. August 1947




Abb. 5 Schmelzabflüß und Meteorologie, oberes Rhonegebiet 6. bis 12. August 1947. Sonnenscheindauer, Temperatur, Niederschlag, Abflüß.

Gepräge, wobei sich eine zeitliche Verschiebung, der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Anschwellungen im Fluß entsprechend, einstellt. Unmittelbar am Gletscher tritt das Abflußmaximum kurz nach Mittag auf, in Brig bzw, Visp um 18 bis 19 Uhr, in Sitten um etwa 22 Uhr, bei Branson um etwa 1 Uhr nachts und bei der Mündung in den Genfersee um 3 bis 4 Uhr morgens (Abb. 6).

Mitunter wird beim Gletscher das Wasser durch Moränen oder Eisbarrieren zurückgestaut, die dann, wenn der Wasserdruck bzw. das Abschmelzen einen kritischen Punkt erreicht hat, bersten und verheerenden Fluten den Weg ins Tal plötzlich freigeben. [6, S. 16, 26, 50 und 64], ferner [7], [8] und [9].

Solche Anschwellungen übertreffen dann oft die «ordentlichen», durch Niederschläge verursachten Hochwasser bei weitem. So erreichte die Flutwelle der Borgne am 4. August 1952 bei Les Haudères eine Maximalabflußmenge von 250 m³/s, während sonst die größte bisher an jener Stelle beobachtete Abflußmenge 38 m³/s (605 l/s km² bei einem Einzugsgebiet von 62,9 km²) beträgt; bis La Luette, 12 km weiter flußabwärts, war der Wellenberg auf 150 m³/s zurückgegangen; er betrug dort immer noch das 2¹/₂fache der größten sonst an jener Stelle aufgetretenen Abflußmenge.

Je weiter flußabwärts der betrachtete Punkt im Gewässersystem liegt, um so mehr treten solche lokale Ereignisse in ihrer Bedeutung gegenüber den durch Niederschläge verursachten Hochwassern zurück. So trat das größte seit dem Jahre 1914 an der Rhone bei der Porte du Scex beobachtete Hochwasser im September 1948 als Folge ausgiebiger Niederschläge auf; es wurde damals bei Sitten — auch für diese Station die größte in der mit dem Jahre 1916 beginnenden Beobachtungsreihe — eine Abflußmenge von 870—950 m³/s oder 265—290 l/s km² bei einem Einzugsgebiet von rund 3300 km² festgestellt. Die Spitze bei der Porte du Scex betrug 1010 bis 1090 m³/s; sie wäre höher gewesen, wenn nicht oberhalb Branson ein Dammbbruch erfolgt wäre.

4. Niederschlag und Abfluß

Unter den geschilderten Umständen treten unmittelbare Beziehungen zwischen Niederschlag und Abfluß sichtbar in Erscheinung, vor allem bei lokalen, gewitterigen Niederschlägen oder Landregen im tieferen Teil des Gebietes einerseits oder beim Vergleich von Mittelwerten größerer Zeitabschnitte andererseits. Bei der Betrachtung der letzteren muß der Reservenänderung in den Gletschern Rechnung getragen werden, ein Umstand, zu dessen Berücksichtigung wir für die vorliegende Arbeit die Zahlenunterlagen der Abteilung Hydrologie der




Abb. 6 Rhonegebiet. Ganglinien der Pegelstände an verschiedenen Stationen, Tagesschwankungen infolge Abschmelzens. 1.—4. August 1947.

Versuchsanstalt für Wasserbau und Erdbau an der ETH verdanken. Es hat sich gezeigt, daß in der Jahresreihe 1941—1953 rund 12% der gesamten bei der Porte du Scex abgeflossenen Wasserfracht dem Gletscherrückgang zuzuschreiben sind, in den Jahren 1923—1940 war dieser Anteil rund 5%.

Wir haben Berechnungen angestellt zwecks Ermittlung des prozentualen Anteils der Abflüßmengen (unter Ausschluß des dem Gletscherrückgang zuzuschreibenden Teiles) an den Niederschlagsmengen (Abflüßkoeffizienten). Dabei machen sich indessen, wie schon im Abschnitt 2 erwähnt, die Unsicherheiten der Niederschlagsbestimmung geltend. Um das Wesentliche der gefundenen Resultate trotzdem mitteilen zu können, setzen wir den Abflüßkoeffizienten für das gesamte Gebiet und für die Jahresreihe 1941—1953 gleich $1,0 \cdot \psi$. Im Verhältnis hiezu ergeben sich folgende Werte:

ganzes Gebiet der Rhone oberhalb des Genfersees (ohne Grande Eau):

Jahresreihe 1904—1922 : $0,98 \cdot \psi$
 Jahresreihe 1923—1940 : $1,04 \cdot \psi$
 Jahresreihe 1941—1953 : $1,00 \cdot \psi$

Rhonegebiet oberh. Brig (O), Jahre 1941—1953: $1,28 \cdot \psi$
 zwischen Brig und Branson (M),
 Jahre 1941—1953 $0,90 \cdot \psi$
 zwischen Branson und dem
 Genfersee (W) (ohne Grande
 Eau), Jahre 1941—1953: $0,99 \cdot \psi$

Als Abflüß wurde hierbei das effektiv aus dem Gebiet herausgeflossene Wasser gerechnet. Wasser, das wohl innerhalb des Gebietes zum Abflüß gelangte, aber dort für Bewässerungszwecke dem Wasserlauf entnommen wurde, figuriert in der Rechnung nicht als abgeflossen, sondern als verdunstet. Hieraus erklärt sich wohl zum großen Teil der verhältnismäßig niedrige Abflüßkoeffizient des mittleren Teilgebietes M.

Literatur

- [1] Eidg. Amt für Wasserwirtschaft (bzw. damals: Abteilung für Wasserwirtschaft): Die Wasserkräfte der Schweiz (Band 3), I. Teil: Die Wasserverhältnisse, C. Die Längenprofile, Bern, 1916.
- [2] Schweiz. Meteorologische Zentralanstalt in Zürich: Annalen.
- [3] Eidg. Amt für Wasserwirtschaft in Bern: Hydrographisches Jahrbuch der Schweiz.
- [4] Schweiz. Meteorologische Zentralanstalt: Die Niederschlagsmengen in der Schweiz 1901 bis 1940, von H. Uttinger, mit Niederschlagskarte der Schweiz 1 : 500 000, herausgegeben vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband, Zürich, 1949.
- [5] Walser E.: Die Niederschlags- und Abflüßverhältnisse im Einzugsgebiet des Rheins oberhalb Basel. «Wasser- und Energiewirtschaft», Nr. 5—7, 1954, Zürich.
- [6] Eidg. Amt für Wasserwirtschaft (bzw. damals: Hydrometrische Abteilung des eidg. Oberbauinspektorates): Die Flächeninhalte der Einzugsgebiete, Rhonegebiet von den Quellen bis zum Genfersee, Bern, 1898.
- [7] Lütshg O.: Der Märjelensee und seine Abflüßverhältnisse. Annalen der schweizerischen Landeshydrographie, Band I.
- [8] Mercanton P.-L.: La débâcle glaciaire du Giétroz au Val de Bagnes, 16 juin 1818. «La Famille», 5. Juni 1918, Lausanne.
- [9] Service fédéral des eaux, E. Walser: La crue de la Borgne le 4 août 1952. «Wasser- und Energiewirtschaft», 1952, Nr. 9, Zürich.



Märjelensee am Großen Aletschgletscher (Photo E. Gyger, Adelboden)